

менности наблюдаются: эклампсія, хорей и эпилепсія. Психическія разстройства во время беременности можно раздѣлить на три отдѣла. Къ первому, къ элементарнымъ разстройствамъ, относятся обычныя причуды, антипатіи и симпатіи беременныхъ, а также клептоманія, не менѣе семи случаевъ которой извѣстны автору. Второй отдѣлъ составляютъ психозы, *вызываемые* собственно беременностью (формальные психозы). Наичаще здѣсь наблюдается аменція (въ меланхолической формѣ), затѣмъ идетъ меланхолія, манія и т. д. Психозы, начавшіеся съ зачатіемъ, прекращаются съ концомъ беременности; начавшіеся позже къ концу беременности усиливаются и продолжаются послѣ родовъ. Менструальные психозы иногда излѣчиваются беременностью (но не замужествомъ, какъ думаютъ нѣкоторые). Психозы, существовавшіе до беременности, во время послѣдней въ большинствѣ случаевъ ухудшаются. Такіе психозы отнесены авторомъ къ третьему отдѣлу. Почти всегда беременность у душевно-больныхъ протекаетъ благопріятно.

*Н. Какушкинъ.*

**70. Проф. П. И. Ковалевскій. Душевные заболѣванія періода кормленія.** (Арх. Психіатріи и проч., 1894 г., № 2).

Въ періодъ кормленія, непосредственно продолжающемъ періодъ пуэрперальный, женщина не успѣваетъ оправиться отъ понесенныхъ ею физическихъ и душевныхъ потрясеній; кромѣ того, кормленіе какъ моментъ истощающій, само по себѣ способствуетъ неустойчивости нервной системы кормилицъ. Обычно психозы этого періода наступаютъ во второй половинѣ его. По числу заболѣваній кормленіе занимаетъ средину между послѣродовымъ періодомъ и беременностью. Иногда внезапное прекращеніе кормленія вызываетъ споропреходящее душевное разстройство (избытокъ крови). Преобладаютъ меланхоліи. Предсказаніе, повидимому, благопріятное. Теченіе продолжительное. Лѣченіе состоитъ въ прекращеніи кормленія и въ укрѣпленіи организма; при плеторѣ—отвлекающія.

*Н. Какушкинъ.*