

мѣста. Автору пришлось добыть себѣ вѣтвями крѣпкихъ щипцовъ доступъ въ верхнее отверстіе и тогда только удалось удалить пессарій изъ половыхъ частей. Оказалось, что вся влагалищная часть матки была ущемлена въ полости пессарія и вышла вмѣстѣ съ нимъ. Костяными щипцами шарообразный пессарій былъ расколотъ на двѣ равныя части по меридіану, тонкая деревянная оболочка распалась на двое, и обнажила омертвѣвшую, крайне набухшую ущемленную *portionem vaginalem*, сѣро-пенельнаго цвѣта и чрезвычайно зловоннаго запаха. Была произведена тщательная дезинфекція влагалища, назначены обеззараживающія прополаскиванія, и послѣ 4 недѣльнаго пребыванія въ кровати больная выздоровѣла. Шарообразный, деревянный пессарій принадлежитъ къ тому старинному типу влагалищныхъ пессаріевъ, который теперь уже вышелъ изъ употребленія. Но и при новѣйшихъ пессаріяхъ наблюдались подобные случаи, тщательно собранные въ работѣ Fr. Neugebauer'a: „*Opasnosti otъ влагалищныхъ пессаріевъ*“.

В. Каплянскій.

80. I. A. Sprengle. Симфизеотомія въ Америкѣ. (The New-York Medical Journal, 1893, Vol. LVII, № 2).

Первый случай *симфизеотоміи* въ Канадѣ, и 4-й по счету во всей Америкѣ, выпалъ на долю д-ра I. A. Sprengle'a, который спасъ этимъ хирургическимъ пособіемъ и мать и ребенка. Роженица *primipara*, ирландка. Показаніемъ къ хирургическому вмѣшательству послужило сильное суженіе таза и громадная сравнительно головка плода. Расширеніе и сглаживаніе маточной шейки, было полное, между тѣмъ какъ головка не вступила еще въ тазовой входъ. Попытка наложенія щипцовъ ни къ чему не повела. Какъ д-ръ Sprengle, такъ и его ассистенты д-ра Lockhart и Kenneth Cameran увѣряютъ, что они явственно слышали крикъ ребенка *in utero!* Въ виду безнадежности положенія какъ матери, такъ и ребенка, авторъ рѣшился на серьезную операцію, но предпочелъ симфизеотомію касарскому сѣченію. Когда лонное соединеніе было расщелено (причемъ обращено было особенное вниманіе на то, чтобы въ разрѣзъ не попала уретра), лобковыя кости широко разошлись, оставивъ свободный промежутокъ въ 3 сантиметра. Затѣмъ щипцы были вторично наложены, и роды быстро и благополучно окончились. Родился живой, доношенный младенецъ, не потерпѣвшій никакого ущерба ни отъ двукратнаго наложенія щипцовъ, ни отъ самой операціи. Послѣродовой періодъ прошелъ нормально, не оставивъ никакихъ слѣдовъ, рана отъ разрѣза скоро

зажила. Изъ всѣхъ 4 операций *симфизеотоміи*, сдѣланныхъ въ Америкѣ, осталось въ живыхъ 4 матери, и 3 младенца, да и 4-й ребенокъ, по мнѣнію автора, былъ бы спасенъ, если бы приступили къ операціи нѣсколькими часами раньше. Такимъ образомъ процентъ смертности отъ симфизеотоміи въ Америкѣ=0.

*В. Каплянскій.*