

у другихъ возвращеніе къ нормѣ вообще замедляется и азотоотери болѣе обильны. Причину различія авторъ затрудняется опредѣлить. Къ восстановленію вѣса тѣла родильницъ также имѣются соотвѣтствующія азотообмѣну различія. У первой категоріи родильницъ количество усвоеннаго азота въ *лохіяхъ* колеблется въ предѣлахъ 7—20%, у второй категоріи въ предѣлахъ 48—94%. Количество азота въ молокѣ не превышаетъ 8—9% всего удаляемаго азота. Мочою теряется 33—100% всего азота. Предыдущіе роды и кратковременное повышеніе t° тѣла не выше 39° не вліяютъ на ходъ азотообмѣна. Вѣсъ водъ у перворождающихъ въ среднемъ былъ 2094 грм., у повторнорождающихъ 1408 грм. Вѣсъ этотъ обратно пропорціоналенъ вѣсу плода. Вѣсъ лохій въ первые три дня послѣ родовъ былъ въ среднемъ 857 грм., въ слѣдующіе 8 дней 379 грм. У первородившихъ количество лохій меньше. Количество молока въ первые 11 дней послѣ родовъ въ среднемъ было 3130,3 грм.; у первородившихъ меньше, чѣмъ у многорожавшихъ.

Н. Какушкинъ.

87. **E. Ries. Ueber die innere Untersuchung Kreissender durch den Mastdarm.** (Centralbl. f. Gynäk., 1894 г., № 17). **О внутреннемъ изслѣдованіи роженицъ черезъ прямую кишку.**

Съ начала нынѣшняго года въ Страсбургской клиникѣ примѣняется изслѣдованіе роженицъ черезъ прямую кишку: кишка опорожняется клистиромъ, промежность тщательно вымывается мыломъ, изслѣдующій палецъ смазывается смѣсью салоля, ланолина и вазелина. Авторъ, благодаря цѣлому ряду опытовъ, считаетъ этотъ способъ замѣняющимъ влагалищное изслѣдованіе и болѣе безопаснымъ, чѣмъ послѣднее. Въ своихъ положеніяхъ онъ говоритъ о необходимости въ нормально протекающихъ родахъ производить только прямо-кишечное изслѣдованіе, которое должно быть единственнымъ, въ особенности для повивальныхъ бабокъ.

Н. Какушкинъ.

88. **E. Rossa. Zwei Fälle von Gynatresien.** (Centralbl. f. Gynaekol., 1894 г., № 18, с. 422). **Два случая зарощенія полового канала.**

1) Женщина 58 лѣтъ—рожала правильно 5 разъ. 12—15 лѣтъ назадъ начался климактерій. Заболѣла 3 мѣсяца назадъ. На 1 см. выше входа имѣется зарощеніе влагалища, повлекшее за собой *ruocolpos* и *ruometra*. Чревосоѣченіе (*explorativa?*). Зарощенное мѣсто влагалища проткнуто троакаромъ. Посмертное вскрытіе обнаружило: *uterus bicornis unicolis, carcinoma cervicis uteri, de-*

fectus renis sin., hydronephrosis dextra.—2) Женщина 35 лѣтъ, не менструировавшая, имѣетъ періодическія боли внизу живота, за послѣдніе 4 года замѣтила узлы въ животѣ. Опредѣлена atresia partis superioris vaginae et cervicis uteri congenita. Чревосѣченіе съ удаленіемъ растянутой матки, трубъ и кистовидно-перерожденныхъ яичниковъ. Посмертное вскрытіе обнаружило еще hydronephrosis dextra congenita. Приобрѣтенное зарощеніе влагалища въ первомъ случаѣ авторъ считаетъ результатомъ старческой инволюціи.

Н. Какушкинъ.