

отъ нефрита, развившагося у нея, по всей вѣроятности, послѣ операціи нефропексіи.

Въ виду всего изложеннаго д-ръ *M. Jacobs* полагаетъ, что *hysteropexia vaginalis duplex* по *Saenger*'у менѣе опасна и можетъ быть предпринимаема съ такимъ же успѣхомъ, почему и совѣтуетъ предпочитатъ ее—*hysteropexiae abdominalis*.

А. К. Мазуркевичъ.

90. Charles. Débridement de la vulve pour éviter la déchirure du périnée. (Journal d'Accouchements, декабрь 1893, № 29). **О насѣчкахъ на губахъ для предупрежденія разрывовъ промежности.**

Авторъ возвращается вновь къ вопросу о предупрежденіи разрывовъ промежности, совѣтуя производить насѣчки на губахъ. При появившихся показаніяхъ, врачъ не долженъ смущаться дѣлать надрѣзы и ограничиваться, какъ многіе предлагаютъ, однимъ или двумя незначительными надрѣзами, такъ какъ съ одной стороны такими надрѣзами не предупреждается разрывъ, а съ другой—задняя спайка, отдѣленная надрѣзомъ съ двухъ сторонъ, сокращается кзади, дѣлается менѣе устойчивою и соединеніе ея становится болѣе затруднительнымъ. Въ виду изложеннаго предпочтительнѣе дѣлать одинъ большой въ 2, 3, даже въ 4 сант. надрѣзъ, который по наложеніи швовъ, легко срастается. Изъ этого явствуетъ, что два разрѣза по 1½ сантиметра не представляютъ того значенія какъ одинъ надрѣзъ въ 3 сантиметра. Многочисленные же надрѣзы, которыхъ придерживаются немногіе, должны быть совершенно оставлены. Однако-же и злоупотребленія въ надрѣзахъ также слѣдуетъ избѣгать и не переступать должныхъ границъ, при чемъ авторъ указываетъ на случай *Dürhssen*'а, гдѣ надрѣзъ доходилъ до 5, 6 сантиметровъ и произвелъ глубокое раненіе *levatoris ani*.

Исходя изъ того положенія, что три четверти разрывовъ промежности зависятъ отъ быстрого прорѣзыванія или выведенія головки, авторъ полагаетъ, что предупредить разрывы при данныхъ обстоятельствахъ всецѣло зависитъ отъ искусства и ловкости оперирующаго.

Маленькія головки, по мнѣнію его, производятъ чаще разрывы, чѣмъ большія, такъ какъ онѣ значительно быстрѣе прорѣзываются.

А. К. Мазуркевичъ.