

щение“ придатковъ на мѣсто послѣ такого лѣченія было, какъ сказано въ статьѣ, неполнымъ. Въ брюшной ранѣ образовалась грыжа и при лѣченіи ея нѣсколькими шрамы, пришлось прихватить и ткань яичника. Въ теченіе 4 мѣсяцевъ послѣ операціи у больной развились въ яичникѣ 7 кистъ, величиной каждая въ орѣхъ, которыя и были удалены вмѣстѣ съ яичникомъ. Они были съ серознымъ содержимымъ и со стѣнкой, содержащей въ себѣ кожный мальпигіевъ слой и кожныя сосочки. Образование такихъ кистъ авторы ставятъ въ зависимость отъ раздраженія яичника микробами.

Н. Какушкинъ.

95. R. Condamin et G. Levrat. De l'hystéropexie par le procédé de Laroyenne. Manuel opératoire. Indications. 22 observations. (Arch. de Chirurgie, 1894 г., № 2, стр. 65). Гистеропексія по способу Laroyenne'а. Техника. Показанія. 22 наблюденія.

Способъ *Laroyenne*'а, имѣющій цѣлью совершенно избѣжать манипуляцій внутри брюшной полости, состоитъ въ томъ, что, послѣ тщательнаго обеззараживанія брюшной стѣнки и влагалища и расширенія шеечнаго канала, въ полость матки вводится особый толстый (№ 30 расширителей по *Hegar*'у) зондъ (*hystéromètre*) съ закругленнымъ концемъ, которымъ матка приподнимается и подводится дномъ до соприкосновенія съ брюшной стѣнкой. Последняя вскрывается, соотвѣтственно дну матки, на пространствѣ 6—8 см., причемъ брюшина разрѣзается единственно съ цѣлью убѣдиться, что между маткой и стѣнкой нѣтъ другихъ органовъ (кишки). Затѣмъ чрезъ ткань матки проводятся три погружныя лигатуры, захватывающія апоневрозъ стѣнки живота. Заканчивается операція обычно. Показаніями къ операціи, кромѣ обыкновенныхъ выпаденій и наклоненій назадъ, *Laroyenne* ставитъ выпаденія, рядомъ съ которыми имѣются тяжелыя явленія отъ воспалительныхъ процессовъ въ придаткахъ, сосѣдней клѣтчаткѣ, связкахъ и проч., и такіе случаи, гдѣ при чревосѣченіи (по другому поводу), констатировано то или другое смѣщеніе матки. По этимъ показаніямъ произведены 22 операціи, которыя подробно описаны.

Н. Какушкинъ.

96. S. Pozzi. De l'hystérectomie comme traitement du prolapsus génital complet. (Annales de gynécologie et d'obstetrique, Мартъ, 1894). Лѣченіе полныхъ выпаденій матки влагалищнымъ вырѣзываніемъ ея.

Въ сообщеніи, сдѣланномъ *Pozzi* подъ этимъ названіемъ въ Парижскомъ „Société de chirurgie“, онъ указалъ, что показанія и