- 3) Вдуваніе порошкообразныхъ веществъ изъ каломеля, висмута, іодоформа и др.
- 4) Средства дѣйствующія мѣстно, какъ прижигающія карандаши (crayons à demeure) изъ іодоформа, азотнокислаго серебра, салоля.

Rollet устроилъ металлическій зондъ для ирригаціи канала уретры и также зондъ изъ каучука, который представляетъ видо-изм'вненія sonde à demeure Pezzer'a.

A. Лапина.

98. Richelot. Traitement chirurgical du prolapsus uterin. (L'union medicale, Janvier, 1894, № 2). Хирургическое лѣченіе выпаденія матки.

Richelot съ 1886 г. началъ примѣнять влагалищное вырѣзываніе матки при выпаденіи ея. На основаніи своихъ наблюденій (6 случаевъ), онъ высказываетъ слѣдующее мнѣніе: операція эта наиболѣе примѣнима у женщинъ послѣ менапаузы, когда "матка становится безполезной", техника операціи довольно легка. Влагалищное вырѣзываніе матки не предотвращаетъ выпаденія влагалища, почему надо имѣть ввиду вторичную дополнительную операцію—colporrhaphiam.

Показаніемъ къ влагалищной гистеректоміи можетъ служить крайняя вялость тазоваго дна, когда трудно разсчитывать на успѣхъ другихъ операцій, а также при осложненіи выпаденія матки фибромами. Въ большинствѣ случаевъ, при выпаденіи матки, Richelot примѣняетъ colporrhaphi'ю по способу Hegar'a и признаетъ ее за самую дѣйствительную и основную операцію.

А. Лапина.

99. P. Segond. Traitement chirurgical du prolapsus utérin. (Gazette de gynécologie, 1 Janvier 1894). Хирургическое лѣченіе выпаденія матки.

Segond, въ своей лекціи, говорить о различныхъ операціяхъ, которыя примѣняются при выпаденіи матки.

- а) Colporrhaphia и colpoperineorrhaphia.
- b) Colporrhaphia mediana (cloisonnement du vagin Lefort'a или срединное сшиваніе стънокъ влагалища).
 - с) Укороченіе круглыхъ связокъ (операція d'Alquié-Alexander'a).
- d) Пришиваніе матки къ передней брюшной стінкі (hysteropexie abdominale).
 - е) Влагалищное выръзывание матки (hysterectomie vaginale).

Въ заключеніе лекціи Segond высказываетъ свое мнѣніе при какихъ случаяхъ выпаденія матки, напр., при осложненіи разрывами промежности, злокачественными новообразованіями или гипертрофією надвлагалищной части, наиболѣе примѣнима та или другая изъ вышеупомянутыхъ операцій.

А. Лапина.

Редакторы: { Д. Оттъ. Д. Личкусъ.