

газа не обследовано: endocolitis vetularum съ обильными, кровоточивыми сращениями. Распознавание: или кисты яичника, или эхинококк. Чревосечение въ области грыжевого мѣшка. Въ полости брюшины небольшое количество желто-соломенной жидкости. Подъ кишечными петлями находилась киста лѣваго яичника, а за ней, отдѣленная кишечными петлями, киста праваго. Обѣ удалены, а также часть сальника, приросшаго къ краю пупочнаго кольца и удерживавшаго кишки впереди опухоли, мѣшая имъ подниматься вверхъ. Послѣоперационный періодъ прошелъ вполне гладко. Интересъ случая, по автору,—затруднительный діагнозъ, вслѣдствіе положенія кишекъ впереди опухолей.

*Н. Какушкинъ.*

161. **Женщ.-вр. М. А. Панфиловичъ. Три случая эмбриотоміи.** (Сборникъ протоколовъ Общ. Калужскихъ врачей за 1893 г. Калуга. 1894, стр. 55).

Техника эмбриотоміи, по автору, еще не вполне выработана. Въ трехъ случаяхъ запущенныхъ поперечныхъ положеній автору пришлось съ успѣхомъ примѣнить изогнутыя ножницы на длинныхъ ручкахъ. Въ двухъ случаяхъ при этомъ было сдѣлано прободеніе грудной кѣтки съ послѣдовательнымъ разъединеніемъ (подкожно) позвоночнаго столба, а въ одномъ случаѣ ножницами перерѣзана шейка плода.

*Н. Какушкинъ.*

162. **Р. Ю. Яновскій. О лапаротоміяхъ въ частной практикѣ.** (Труды Общ. Минскихъ врачей, за 1892—93 г. Минскъ. 1893, стр. 18).

Авторъ скептически относится къ болзни многихъ современныхъ хирурговъ, дѣлающихъ чревосечение, воздуха и всего, что находится въ операционной комнатѣ въ моментъ операци, хотя и не имѣетъ соприкосновенія съ полемъ раненія. По его мнѣнію, заботы нѣкоторыхъ хирурговъ обставлять свои чревосечения до крайности строго, въ отношеніи окружающей обстановки, излишни. Самъ онъ оперируетъ въ частномъ домѣ. (Къ сожалѣнію, въ статьѣ нѣтъ *подробныхъ* указаній относительно обстановки его чревосеченій. *Реф.*). Изъ трехъ лапаротомій, описанныхъ въ статьѣ, одна произведена по причинѣ туберкулезнаго перитонита (дѣвочка 7 лѣтъ. Выздоровленіе); другая—при невыправимой пупочной грыжѣ (не радикальная) и третья—по поводу кожевика праваго яичника: дворянка, 35 л., рожавшая. Крови отсутствуютъ около 2 мѣсяцевъ. Опухоль круглая, съ кулакъ, подвижная, удалена обычнымъ