

какія либо отклоненія отъ нормы, то физическое и душевное состояніе роженицы не можетъ оставаться въ предѣлахъ физиологическихъ. Случаи преступленій во время родовъ отмѣчались многими. По *Dörfler*'у, душевныя разстройства роженицъ возникаютъ или на почвѣ истощенія организма (въ формѣ обморока, сонливости и мнимой смерти), или на почвѣ раздраженія центральной нервной системы (въ формѣ аффектовъ, приступовъ гнѣва, преходящей маніи, *raptus melancholici*, истерического, эclamптического и лихорадочнаго бреда). Послѣдній рядъ разстройствъ наиболѣе серьезный. Авторъ заключаетъ, что роды являются только толчкомъ къ возникновенію душевнаго разстройства, на почвѣ, подготовленной или наслѣдственностью, или предшествующими душевными и нервными потрясеніями. *Н. Какушкинъ.*

164. **А. Богаевскій.** Значеніе родильныхъ пріютовъ въ связи съ антисептикой и асептикой. (Земскій Врачъ, 1894, № 13—14).

Статья представляетъ рѣчь, произнесенную въ годичномъ собраніи Общества Кременчугскихъ врачей. Рѣчь эта, рассчитанная, повидимому, главнымъ образомъ на слушателей—не врачей, въ удобопонятной формѣ обстоятельно знакомитъ слушателей съ сущностью послѣродовыхъ заболѣваній, съ исторіей борьбы противъ послѣродовой лихорадки и съ настоящимъ положеніемъ этого вопроса и имѣла, между прочимъ, цѣлью вызвать со стороны общества сочувствіе и матеріальную поддержку родильному пріюту, открытому въ 1890 г. при лечебницѣ Общества врачей для проходящихъ больныхъ. Достоинно замѣчанія, что въ такомъ большомъ городѣ, какъ Кременчугъ, пріютъ этотъ—единственное убѣжище для несостоятельныхъ роженицъ, такъ какъ даже больница губернскаго земства, устроенная на 120 кроватей, не имѣетъ родильнаго отдѣленія. *Н. Рачинскій.*

165. **М. С. Головчинеръ.** *Febris puerperalis (septicaemia). Parotitis metastatica duplex. Erysipelas migrans.* Выздоровленіе. (Медицина, 1894, №№ 25 и 26).

24/ix авторъ, приглашенный къ первородящей по поводу затянувшихся родовъ, окончилъ роды щипцами. Дѣтское мѣсто частично приросло къ маточной стѣнкѣ; при ручномъ отдѣленіи его приросшая часть оболочекъ осталась въ маткѣ; послѣдовательныя попытки двухъ врачей отдѣлить эти остатки оказались тщетными. Сшиванію небольшого разрыва промежности родильница воспротивилась. Назначены сулемовыя рукавныя спринцеванія и іодо-