

167. Гинзбургъ. Искусственный законный выкидышъ по способу Peltzer'a при сильныхъ кровотеченіяхъ у беременныхъ. (Еженедѣльникъ, 1894, № 10).

Авторъ описываетъ 2 случая кровотеченій во время беременности (5-ти мѣсячной и 4-хъ мѣсячной), гдѣ онъ, послѣ безуспѣшныхъ попытокъ остановить кровотеченіе, произвелъ выкидышъ по способу, предложенному Peltzer'омъ. Способъ этотъ, какъ извѣстно, состоитъ въ томъ, что чрезъ катетеръ, введенный на нѣсколько сантиметровъ между стѣнками матки и плодными оболочками, вливается глицеринъ. (Глицеринъ, обладая свойствами раздражать слизистую матки, дѣйствуетъ вѣрнѣе, чѣмъ вода). Въ обоихъ случаяхъ выкидышъ произошелъ черезъ нѣсколько часовъ. Такъ какъ при болѣе или менѣе затянувшемся кровотеченіи во время беременности, гдѣ можно предполагать уже кровоизліяніе въ существо плаценты, плодъ врядъ-ли можетъ сохраниться живымъ, то авторъ совѣтуетъ не тратить времени на выжидательное лѣченіе. Въ заключеніе онъ, какъ дезинфицирующее, рекомендуетъ формалинъ (40% водный растворъ формальдегида), который, по наблюденіямъ Либрейха и Valude, обладаетъ свойствомъ убивать всѣ бактеріи, не свертываетъ бѣлковъ, не измѣняется отъ свѣта и менѣе опасенъ, чѣмъ сулема.

Н. Р.

168. А. Кочетковъ. Два случая разрыва матки. (Еженедѣльникъ, 1894, № 12).

Въ ноябрѣ 1892 г., въ Казанскую Акушерскую клинику поступила роженица, V—para, съ t^o 39,1^o. Животъ вздутъ, очень чувствителенъ при дотрогиваніи, въ нижнихъ частяхъ живота крепитация; дно матки пальца на 2 отъ мечевиднаго отростка; контракціонное кольцо на палецъ ниже пупка, надъ входомъ въ тазъ головка; громадный отекъ наружныхъ половыхъ органовъ; изъ рукава выдѣляется сукровичная жидкость, съ гнилостнымъ запахомъ; сердцебіенія плода не слышно. Размѣры таза: dist. spin. 24, dist. crist. 26,5, dist. troch. 29, conjug. ext. 18, conjug. diagon. 9,5. Полное открытіе зѣва, предлежитъ головка, спустившаяся только небольшимъ сегментомъ за входъ таза. Рѣзко выраженный caput succedaneum. Промежутки между потугами 5—10 минутъ. Распознано: ruptura uteri et endometritis sub partu septica. Произведено прободеніе головки и краниоклазія. Извлеченъ доношенный и прекрасно развитый мальчикъ, вѣсившій 3700 grm. безъ мозга. При изслѣдованіи рукою полости матки оказалась разорванной правая стѣнка матки, начинаясь немного выше наружнаго