

зало давнишнее зарощеніе брюшиннаго конца лѣвой трубы и лѣвую яичниково-брюшинную беременность. 5) 32 лѣтъ, рожавшая. Годъ назадъ, послѣ задержки кровей, при бурныхъ явленіяхъ, развилась haematocele retrouterin. Теперь 2-хъ мѣсячное отсутствіе кровей. Поступила съ болями и кровотеченіемъ. Послѣ выжидательнаго лѣченія—чревосѣченіе. Опухоль въ области лѣваго яичника и въ дугласовомъ пространствѣ удалены. Послѣ операціи упорная рвота. Выздоровленіе. *Н. Какушкинъ.*

174. **Н. Н. Шевелевъ.** **Кровяная опухоль большой губы.** (Медиц. Обзорѣніе, 1894 г. № 15, стр. 243).

33 лѣтъ, многорожавшая. Послѣдніе роды, три дня назадъ, быстро (въ теченіе 2 часовъ). Тотчасъ-же образовалась опухоль лѣвой губы. t° по вечерамъ 38°. На 7-й день послѣ родовъ сдѣланъ разрѣзъ и удалено содержимое опухоли. Выздоровленіе.

Н. Какушкинъ.

175. **В. М. Камеразъ.** **къ этиологіи поперечнаго положенія плода.** (Проток. засѣд. Двинскаго Мед. Общ. за 189¹/₂ и 189²/₃ г.г., Двинскъ, 1894 г., ст. 156).

У второродящей, 22 лѣтъ, съ широкимъ тазомъ,—поперечное положеніе плода съ выпаденіемъ ручки. Поворотъ и извлеченіе съ благополучнымъ исходомъ. Послѣ родовъ обнаружено, что у родильницы ясная форма двуроговой матки (uterus bicornis, arcuatus). Эту форму авторъ считаетъ причиной поперечнаго положенія плода. При первыхъ родахъ такая форма не повліяла на положеніе плода, по автору, потому, что у перворождающихъ головка плода въ концѣ беременности стоитъ уже въ маломъ тазу.

Н. Какушкинъ.

176. **А. Я. Маминовъ.** **О времени проявленія наследственнаго сифилиса и о мѣрахъ предупрежденія передачи его кормилицамъ.** (Проток. Засѣд. Импер. Кавказск. Мед. Общ., 1894 г., № 3, стр. 55).

Вопросъ, затрогиваемый авторомъ, интересенъ для учреждений, имѣющихъ дѣло съ новорожденными дѣтьми. Врожденный сифилисъ не всегда проявляется тотчасъ по рожденіи, иногда черезъ недѣлю, иногда даже мѣсяцевъ чрезъ семь. За этотъ періодъ скрытаго состоянія болѣзни ребенокъ-сифилитикъ легко можетъ заразить здоровую кормилицу. При трудности распознаванія врожденнаго сифилиса нельзя въ зараженіи кормилицъ винить врачей