

и все учреждение. Во избѣжаніе подобныхъ случаевъ авторъ предлагаетъ всѣмъ учреждениямъ, имѣющимъ дѣло съ новорожденными дѣтьми, завести у себя ослицъ и кормить дѣтей, заставляя ихъ *сосать* молоко у этихъ животныхъ. *Н. Какушкинъ.*

**177. В. С. Груздевъ. Начало половой зрѣлости у обитательницъ Россіи въ зависимости отъ вліяющихъ на него факторовъ.** (Журн. Русск. Общ. Охран. Нар. Здравія, 1894 г., №№ 5—7).

Данныя по этому вопросу, полученные тридцатью четырьмя авторами, собраны въ этой статьѣ воедино и разработаны. Данные эти касаются 64.759 случаевъ. По выводамъ, сдѣланнымъ авторомъ, первыя мѣсячныя у обитательницъ Россіи въ среднемъ приходятъ на 15,83 году; наичаще на 16 году, (216% всѣхъ случаевъ). Раньше созрѣваютъ въ половомъ отношеніи южанки, семиты, привилегированныя, состоятельныя, низкорослыя, брюнетки. Въ основѣ вліянія всѣхъ этихъ факторовъ лежитъ, по автору, та или другая степень развитія нервной системы. Половое созрѣваніе замедляется, если нервная система груба, невосприимчива, мало развита,—и обратно. *Н. Какушкинъ.*

**178. С. К. Оленинъ. Отчетъ гинекологическаго и родильнаго отдѣленій Тамбовской губернской земской больницы за 1893 г., Тамбовъ. 1894 г.**

Число гинекологическихъ больныхъ 293. Изъ нихъ прислано земскими врачами Тамбовской губ. для спеціальнаго лѣченія 38. Возрастъ преимущественно 21—30 лѣтъ. 116 женщинъ имѣли болѣзни матки (преимущественно новообразованія и воспалительные процессы), 90—болѣзни придатковъ, 56—наружныхъ половыхъ органовъ и влагалища. Умерло 17 (5,8%). Разрывы промежности лѣчимы были по *L. Tait*'у съ видоизмѣненіями *Славянского*. Одинъ изъ этихъ случаевъ окончился септическимъ параметритомъ, со смертельнымъ исходомъ, вслѣдствіе затека изъ прямой кишки въ клѣтчатку каловой жидкости черезъ бывшую здѣсь язву (?). Изъ пяти случаевъ операціи пузырно-влагалищныхъ свищей полный успѣхъ далъ одинъ случай. При эндометритахъ примѣнялось съ успѣхомъ выскабливаніе (13 случаевъ). Воспаленіе матки и шейки лѣчились преимущественно хирургически (ампутація шейки, выскабливанія, въ одномъ случаѣ операція *Reed*'а). Въ одномъ случаѣ выпаденія матки—пришиваніе къ передней брюшной стѣнкѣ. Фиброзные полипы (2 случ.) уда-