

и все учреждение. Во избѣжаніе подобныхъ случаевъ авторъ предлагаетъ всѣмъ учреждениямъ, имѣющимъ дѣло съ новорожденными дѣтьми, завести у себя ослицъ и кормить дѣтей, заставляя ихъ *сосать* молоко у этихъ животныхъ. *Н. Какушкинъ.*

177. В. С. Груздевъ. Начало половой зрѣлости у обитательницъ Россіи въ зависимости отъ вліяющихъ на него факторовъ. (Журн. Русск. Общ. Охран. Нар. Здравія, 1894 г., №№ 5—7).

Данныя по этому вопросу, полученные тридцатью четырьмя авторами, собраны въ этой статьѣ воедино и разработаны. Данные эти касаются 64.759 случаевъ. По выводамъ, сдѣланнымъ авторомъ, первыя мѣсячныя у обитательницъ Россіи въ среднемъ приходятъ на 15,83 году; наичаще на 16 году, (216% всѣхъ случаевъ). Раньше созрѣваютъ въ половомъ отношеніи южанки, семиты, превиллегированныя, состоятельныя, низкорослыя, брюнетки. Въ основѣ вліянія всѣхъ этихъ факторовъ лежитъ, по автору, та или другая степень развитія нервной системы. Половое созрѣваніе замедляется, если нервная система груба, невосприимчива, мало развита,—и обратно. *Н. Какушкинъ.*

178. С. К. Оленинъ. Отчетъ гинекологическаго и родильнаго отдѣленій Тамбовской губернской земской больницы за 1893 г., Тамбовъ. 1894 г.

Число гинекологическихъ больныхъ 293. Изъ нихъ прислано земскими врачами Тамбовской губ. для спеціальнаго лѣченія 38. Возрастъ преимущественно 21—30 лѣтъ. 116 женщинъ имѣли болѣзни матки (преимущественно новообразованія и воспалительные процессы), 90—болѣзни придатковъ, 56—наружныхъ половыхъ органовъ и влагалища. Умерло 17 (5,8%). Разрывы промежности лѣчимы были по *L. Tait*'у съ видоизмѣненіями *Славянского*. Одинъ изъ этихъ случаевъ окончился септическимъ параметритомъ, со смертельнымъ исходомъ, вслѣдствіе затека изъ прямой кишки въ клѣтчатку каловой жидкости черезъ бывшую здѣсь язву (?). Изъ пяти случаевъ операціи пузырно-влагалищныхъ свищей полный успѣхъ далъ одинъ случай. При эндометритахъ примѣнялось съ успѣхомъ выскабливаніе (13 случаевъ). Воспаленіе матки и шейки лѣчились преимущественно хирургически (ампутація шейки, выскабливанія, въ одномъ случаѣ операція *Reed*'а). Въ одномъ случаѣ выпаденія матки—пришиваніе къ передней брюшной стѣнкѣ. Фиброзные полипы (2 случ.) уда-

лены. При другихъ фиброміомахъ примѣнялось преимущественно электричество. Въ двухъ случаяхъ опухоли подверглись гнилоственному распаду (смерть). Одинъ случай окончился смертью, вследствие тромбоза венъ таза и эмболій легочныхъ артерій. Въ 4 случаяхъ рака—полное вырѣзываніе матки, съ успѣхомъ въ 3 случаяхъ и съ рецидивомъ въ одномъ. При воспаленіяхъ придатковъ обычные, не хирургическіе средства; при новообразованіяхъ яичниковъ—овариотомія. Одинъ случай вѣматочной беременности былъ лѣчимъ чревосѣченіемъ, съ успѣхомъ.

Въ родильномъ отдѣленіи было 241 беременная. Родовъ 234. Смертность родильницъ=0. Первобеременные составляли 38,6%. Возрастъ преимущественно отъ 16 до 30 л. Преждевременные роды составляютъ 7,7% всѣхъ родовъ. Двойни—2,5%. Разрывы промежности были 16 разъ. Conjug. ext. въ 20 смт. была въ 60,2%, conjug. ext. въ 17 смт. была въ 1,7% (всѣ роды при с. ext. въ 17 смт. протекали произвольно, безъ осложнений). Изъ оперативныхъ вмѣшательствъ наичаще было производимо шиваніе промежности, затѣмъ отдѣленіе дѣтскаго мѣста и наложеніе щипцовъ (въ 2,1% всѣхъ родовъ). Послѣродовыхъ заболѣваній было 13. Мальчиковъ родилось 136, дѣвочекъ 104. Средній вѣсъ ребенка 3650 грм., средній ростъ 50 смт.

Н. Какушкинъ.

179. С. Павскій. Къ вопросу объ оперативномъ лѣченіи перегибовъ матки кзади. (Ventre fixatio uteri). Томскъ. 1894 г.

Многорожавшая, 43 лѣтъ. Послѣднія три беременности окончились выкидышемъ. Страдаетъ кровотечениями. Распознавъ перегибъ назадъ, хроническій метритъ и эндометритъ. Послѣ безуспѣшнаго лѣченія массажемъ и кольцами, сдѣлана hysteropexia abdominalis anterior. Спустя 8½ мѣсяцевъ послѣ операціи трехмѣсячный выкидышъ. Нѣсколько болѣе года послѣ операціи эффектъ ея не нарушенъ. Черезъ два года больная родила въ срокъ благополучно. Обратное развитіе матки совершалось довольно медленно; спустя мѣсяцъ послѣ родовъ было кровотеченіе, обусловленное недостаточнымъ обратнымъ развитіемъ. Въ остальномъ отступленіи отъ нормы нѣтъ. Авторъ счиаетъ этотъ случай, какъ нельзя лучше говорящимъ въ пользу операціи пришиванія матки къ передней брюшной стѣнкѣ.

Н. Какушкинъ.