

183. И. М. Львовъ. Суженіе наружнаго отверстія шейки матки и его лѣченіе упрощеннымъ способомъ *Borissowicz'a*. (Еженедѣльникъ, 1894 г., № 29, с. 485).

Дѣлая краткій очеркъ патологии суженій шеечнаго канала, авторъ указываетъ на суженіе наружнаго отверстія, какъ на частую причину (96%) безплодія женщинъ и какъ на причину, совмѣстно съ воспалительными измѣненіями въ шейкѣ, болѣзненныхъ мѣсячныхъ. При лѣченіи суженій авторъ часто прибѣгаетъ къ разрыву шейки (*Sims*) и хвалитъ этотъ методъ. При конической шейкѣ, удлиненной, авторъ примѣняетъ клиновидное вырѣзываніе шейки (*Simon, Markwald*); при конической шейкѣ не удлиненной, тонкой и уплотнѣлой, онъ примѣняетъ видоизмѣненный имъ способъ *Borissowicz'a* (18 случаевъ, съ успѣхомъ): обыкновенной, сильно изогнутой, иглой дѣлается вколъ снаружки шейки и сбоку, отступя отъ края наружнаго отверстія на 1—1½ смт.; вколъ идетъ въ полость шеечнаго канала, откуда конецъ шелковой лигатуры выводится наружу и туго затягивается съ наружнымъ концомъ. Тоже дѣлается на противоположной сторонѣ шейки. Лигатуры сами отпадаютъ на 9—12 дни. *Н. Какушкинъ.*

184. Д. Я. Юровскій. Три случая выворота матки. (Врачъ, 1894 г., № 26, стр. 738).

У женщины, 32 лѣтъ, на 5 мѣсяцѣ беременности послѣ выкидыша обнаруженъ выворотъ матки. Лѣченіе выжидательное (обеззараживающія промыванія влагалища). Черезъ нѣсколько дней отъ дна матки отдѣлилась опухоль (міома) съ куриное яйцо (не распознанная раньше) и совершилось произвольное вправленіе матки. Въ другомъ случаѣ, у женщины, 48 л., выворотъ вызванъ такою же опухолью, съ кулакъ величиной. Опухоль вылучена и вправленіе совершилось подъ дѣйствіемъ кольпейринтера. Третій случай касается женщины, 24 л., заболѣвшей выворотомъ послѣ родовъ. Благопріятный результатъ получился послѣ повторныхъ (въ теченіе 3 недѣль) введеній кольпейринтера. Авторъ высказывается противъ насильственныхъ попытокъ къ вправленію выворотовъ и совѣтуетъ выжидательный методъ съ примѣненіемъ кольпейринтера.

*Н. Какушкинъ.*