

## б) Н ѣ м е ц к о й.

185. Heuck. Ein neuer Fall von Luftembolie bei placenta praevia. (Zetschrift f. Geb., und Gyn. Bd. XXVIII, 1 Hft). Новый случай воздушной эмболии при предлежаніи дѣтскаго мѣста.

У 28 лѣтней здоровой первородящей въ 9 мѣсяцѣ беременности вслѣдствіе сильныхъ, обусловленныхъ предлежаніемъ дѣтскаго мѣста, кровотеченій былъ сдѣланъ поворотъ при зѣвѣ проходимомъ лишь для 2 пальцевъ. Операция была произведена на поперечной кровати подъ хлороформнымъ наркозомъ, который немедленно былъ прекращенъ, послѣ того какъ захватили ножку. Когда эту послѣднюю вывели ко входу во влагалище роженица почувствовавъ боль, сильно натужилась, при чемъ изъ влагалища полилась струя околоплодной жидкости окрашенной кровью. На ножку, которая уже болѣе не реагировала на щекотаніе, наложили петлю. Когда теперь захотѣли положить больную на поперечную кровать, пульсъ вдругъ пропалъ и лицо стало ціанотичнымъ. Дыханіе еще продолжалось, но становилось все медленнѣе а черезъ 3—5 минутъ совершенно прекратилось, не смотря на всѣ употребленныя средства. При произведенномъ 2 часа спустя вскрытіи было констатировано присутствіе пузырьковъ воздуха въ правой v. spermatica, въ правомъ сердцѣ и въ правой v. jugularis. Механизмъ эмболии авторъ объясняетъ себѣ слѣдующимъ образомъ. При послѣдней сильной потугѣ, которая имѣла мѣсто уже послѣ совершеннаго поворота, находившійся между маточно стѣнкою и отдѣленною частью дѣтскаго мѣста воздухъ былъ вогнанъ въ открытыя вены и оттуда при послѣдовавшей за прекращеніемъ потуги уменьшеніи внутри брюшнаго давленія онъ былъ аспирированъ въ стволъ v. spermaticae.

С. Ю. Хазанъ.

186. Goenner. Das Verhältniss des Schädels der Mutter zu dem des Kindes und dessen geburtshilfliche Bedeutung mit gleichzeitiger Berücksichtigung des mütterlichen Beckens. (Zeitschrift f. Geb. und Gyn., XXVIII Bd., 2 Hft). Соотношеніе черепа матери къ черепу плода и акушерское значеніе этого соотношенія въ связи съ величиною материнскаго таза.

Установленный клиническими наблюденіями фактъ, что сплошь да рядомъ у женщинъ съ такими размѣрами таза, которые принято считать патологическими, роды протекаютъ совершенно самопро-