

констатировано расхождение, выполняемое соединительно-тканной мозолью. Измѣненія походки и слабость ногъ, впрочемъ, и въ этихъ случаяхъ не наблюдались. Авторъ думаетъ, что и безъ шва возможно восстановление лона. Нарушеніе цѣлости мягкихъ частей у автора прошли для женщинъ безслѣдно. Костный шовъ авторъ накладываетъ, дѣлая сверломъ отверстіе въ концахъ лонныхъ костей; на кончикѣ сверла имѣется ушко, съ помощью котораго черезъ слѣдланное отверстіе проводится серебряная проволока. Надъ шитой костью шивается надкостница, а затѣмъ мягкія ткани.

Н. Какушкинъ.

244. **A. Goldberg. Ein Fall von Haematoma vulvae et vaginae post partum.** (Centralbl. f. Gynäk., 1894 г., № 30). **Случай гематомы наружныхъ половыхъ органовъ и влагалища послѣ родовъ.**

У первородящей 20 лѣтъ оухоль, съ голову ребенка, обнаружилась черезъ 1 часъ послѣ родовъ, которые продолжались 3 дня (окончились произвольно). Она занимала лѣвую большую губу и часть влагалищной стѣнки. Черезъ 4 дня она прорвалась. Больная выздоровѣла черезъ 3 недѣли. Повышенія температуры не было.

Н. Какушкинъ.

245. **H. Gaertig. Ueber Erythem im Wochenbett.** (Centralbl. f. Gynäk., 1894 г., № 30). **Объ эритемѣ въ послѣродовомъ періодѣ.**

Больная 26 лѣтъ. Никогда не страдала кожными болѣзнями. Первая беременность протекала безъ осложнений. Роды правильны. Послѣ родовъ задержка послѣда и сильное маточное кровотеченіе. На 3-й день послѣ родовъ появилась сыпь въ области пупка, зудящая, съ чувствомъ жара; кожа немного припухла и гиперемирована. Черезъ 2 дня сыпь на кожѣ живота стала пропадать, а на бедрахъ, рукахъ и груди появилась вновь. На 12 день послѣ родовъ родильница была здорова. Повышенія t^0 , заболѣваній въ зѣвѣ и бѣлка въ мочѣ не наблюдалось. Черезъ 1½ года—вторые роды съ такою же, какъ въ первый разъ, задержкой послѣда и кровотеченіемъ. Черезъ 20 часовъ послѣ родовъ, появилась сыпь на животѣ сильно зудящая, съ припухлостью и краснотой кожи, при чемъ t^0 поднялась безъ зноба до 40^0 и держалась на лихорадочныхъ цыфрахъ около 10 дней. Сыпь затѣмъ появлялась на конечностяхъ, груди и лицѣ. Дѣло окончилось выздоровленіемъ и на этотъ разъ. Послѣ 3-хъ родовъ (черезъ 16 мѣсяцевъ), протекавшихъ также съ обильнымъ кровотеченіемъ, также наблюдалась кожная сыпь, при нормальной t^0 , окончившаяся отрубевиднымъ