

констатировано расхождение, выполняемое соединительно-тканной мозолью. Измѣненія походки и слабость ногъ, впрочемъ, и въ этихъ случаяхъ не наблюдались. Авторъ думаетъ, что и безъ шва возможно восстановление лона. Нарушеніе цѣлости мягкихъ частей у автора прошли для женщинъ безслѣдно. Костный шовъ авторъ накладываетъ, дѣлая сверломъ отверстіе въ концахъ лонныхъ костей; на кончикѣ сверла имѣется ушко, съ помощью котораго черезъ слѣдующее отверстіе проводится серебряная проволока. Надъ шитой костью шивается надкостница, а затѣмъ мягкія ткани.

Н. Какушкинъ.

244. **A. Goldberg. Ein Fall von Haematoma vulvae et vaginae post partum.** (Centralbl. f. Gynäk., 1894 г., № 30). **Случай гематомы наружныхъ половыхъ органовъ и влагалища послѣ родовъ.**

У первородящей 20 лѣтъ оухоль, съ голову ребенка, обнаружилась черезъ 1 часъ послѣ родовъ, которые продолжались 3 дня (окончились произвольно). Она занимала лѣвую большую губу и часть влагалищной стѣнки. Черезъ 4 дня она прорвалась. Больная выздоровѣла черезъ 3 недѣли. Повышенія температуры не было.

Н. Какушкинъ.

245. **H. Gaertig. Ueber Erythem im Wochenbett.** (Centralbl. f. Gynäk., 1894 г., № 30). **Объ эритемѣ въ послѣродовомъ періодѣ.**

Больная 26 лѣтъ. Никогда не страдала кожными болѣзнями. Первая беременность протекала безъ осложнений. Роды правильны. Послѣ родовъ задержка послѣда и сильное маточное кровотеченіе. На 3-й день послѣ родовъ появилась сыпь въ области пупка, зудящая, съ чувствомъ жара; кожа немного припухла и гиперемирована. Черезъ 2 дня сыпь на кожѣ живота стала пропадать, а на бедрахъ, рукахъ и груди появилась вновь. На 12 день послѣ родовъ родильница была здорова. Повышенія t^0 , заболѣваній въ зѣвѣ и бѣлка въ мочѣ не наблюдалось. Черезъ 1½ года—вторые роды съ такою же, какъ въ первый разъ, задержкой послѣда и кровотеченіемъ. Черезъ 20 часовъ послѣ родовъ, появилась сыпь на животѣ сильно зудящая, съ припухлостью и краснотой кожи, при чемъ t^0 поднялась безъ зноба до 40^0 и держалась на лихорадочныхъ цыфрахъ около 10 дней. Сыпь затѣмъ появлялась на конечностяхъ, груди и лицѣ. Дѣло окончилось выздоровленіемъ и на этотъ разъ. Послѣ 3-хъ родовъ (черезъ 16 мѣсяцевъ), протекавшихъ также съ обильнымъ кровотеченіемъ, также наблюдалась кожная сыпь, при нормальной t^0 , окончившаяся отрубевиднымъ

шелушеніемъ. Исключая рожу и скарлатину, авторъ это заболѣваніе ставитъ въ связь съ анеміей родильницы, развивавшейся послѣ каждаго родовъ вслѣдствіе кровотеченій. Подобное же совмѣстное существованіе анеміи и эритемы, по словамъ автора, наблюдалъ *Вагитт*.

Н. Какушкинъ.

246. **Füth. Ueber einem Fall von Harnblasenverdoppelung.** (Centralbl. f. Gynäkol., 1894 г., № 14, стр. 332). **Случай двойного мочевого пузыря.**

Особенности случая (4-мѣсячный мальчикъ): грыжа бѣлой линіи, расщепъ лонной дуги, сращеніе, въ формѣ тяжей, между прямой кишкой и пузыремъ и между послѣднимъ и брюшной стѣнкой, и удлиненіе брыжейки *flexurae sigmoideae*.

Н. Какушкинъ.

247. **Brennecke. Zur Frage der Stumpfbehandlung bei der Myomhysterektomie.** (Centralbl. für gynäkol., 1894 г., № 30). **Къ вопросу объ уходѣ за культей при надвлагалищной ампутаціи міоматозной матки.**

Въ этой статьѣ, съ полемическимъ характеромъ, авторъ высказывается противъ метода *Leopold'a*. Стремясь выяснитъ условія, при которыхъ возможно было-бы съ увѣренностью въ хорошій исходъ дѣлать ампутацію матки, авторъ ставитъ два основанія или два принципа, для способовъ ухода за культей; послѣдняя, обдѣлывается или по законамъ пластики, или такъ, чтобы достигалось по возможности полное уничтоженіе культи. Въ показаніяхъ *Leopold'a* авторъ видитъ стремленіе къ пластикѣ, но въ самомъ методѣ онъ находитъ условія, не только мѣшающія пластикѣ, но и ставящія культу въ опасное положеніе быть мѣстомъ вторичнаго зараженія, вслѣдствіе присутствія тканей, плохо питающихся. Еще есть, по автору, въ методѣ *Leopold'a* сходство съ методомъ *Hofmeir-Chrobak'a*, но отсутствіе дренажированія и съ этой точки зрѣнія характеризуетъ методъ *Leopold'a*, какъ методъ невѣрный, рискованный.

Н. Какушкинъ.

248. **W. Thorn. Zur Lactationsatrophie des Uterus.** (Centralbl. für Gynäkol. 1894 г., № 30). **Къ вопросу объ атрофіи матки во время кормленія грудью.**

Авторъ уже раньше трактовалъ объ этомъ предметѣ (*Zeitschr. f. Geb. u. Gyn.*, Bd. XVI), и теперь возражаетъ *O. Engström'u*, сообщившему о своихъ случаяхъ атрофіи матки во время корм-