

последнее всегда считается вторичным явлениемъ, тоже относится и къ лимфатическимъ железамъ. Въ доказательство первичности заболѣванія *port. vag.* авторъ приводитъ еще то, что полость матки не была задѣта, что имѣло бы мѣсто, еслибы поражение шло сверху внизъ, т. е. изъ трубы. Принимая все изложенное во вниманіе, авторъ полагаетъ, что туберкулезный процессъ начался съ *port. vag.* и отсюда распространился.

Причиной туберкулеза женскихъ гениталій, главнымъ образомъ является туберкулезъ гениталій у мужчинъ, встрѣчающійся весьма нерѣдко. Переносится туберкулезный ядъ посредствомъ *coitus*. *Hegar*, указывающій на этотъ этиологическій моментъ, мотивируетъ свой взглядъ указаніемъ, что туберкулезъ гениталій въ дѣтствѣ и послѣ наступленія климакса, встрѣчается значительно рѣже, чѣмъ въ періодѣ вѣторожденія. Сравнительно болѣе частое появленіе туберкулеза гениталій у мужчинъ, дѣлаетъ вѣроятнымъ примѣшиваніе туберкулезныхъ бациллъ къ сѣмени. Даже только общій туберкулезъ мужчинъ можетъ вызвать туберкулезъ гениталій у женщинъ (*Fernet*).

Б. И. Фейнбергъ.

250. Н. Löhlein. *Erfahrungen über den Werth der Castration bei Osteomalacie.* (Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Bd., XXIX). Наблюденія надъ значеніемъ кастраціи при остеомалаціи.

Въ основѣ этихъ наблюденій лежатъ 2 кастраціи съ указанной цѣлью, опубликованныя авторомъ 2 года тому назадъ, 3 кесарскихъ сѣченій по *Porro* и 8 кастрацій, изложенныхъ въ настоящемъ трудѣ. Особенное значеніе авторъ придаетъ тому, что выводы, къ которымъ онъ приходитъ, основаны на продолжительномъ наблюденіи оперированныхъ имъ больныхъ (3½—1½ лѣтъ). Изъ кастированныхъ, случай 8 окончился летально. Помимо кесарскихъ сѣченій авторъ приводитъ еще описаніе 3-хъ случаевъ остеомалаціи, пользовавшихся терапевтически, ибо больныя на операцію не соглашались.

Сравнивая указанные три категоріи воздѣйствія на остеомалацію, *L.* приходитъ къ слѣдующимъ выводамъ: кастраціи подлежатъ случаи остеомалаціи, въ которыхъ заболѣваніе послѣ послѣднихъ родовъ длится довольно продолжительное время и не поддается ни исцѣленію, ни улучшенію, отъ примѣненія другихъ средствъ. По *L.* кастрація не специфическое средство противъ остеомалаціи, но хирургическое пособіе имѣющее серьезное значеніе; она затѣмъ далѣе не безразличное вмѣшательство въ виду общаго упадка силъ больныхъ, въ виду слабой сердечной дѣятельности и осложненій со

стороны респираціи, встрѣчающихся у этихъ больныхъ довольно часто.

Не взирая на то, что успѣхъ кастраціи въ первое время очевиденъ, что боли значительно уменьшаются, что нарушенное передвиженіе больныхъ въ весьма удовлетворительной степени восстанавливается, полное выздоровленіе все же часто затягивается и рецидивы возможны. Съ другой стороны улучшение всѣхъ симптомовъ болѣзни послѣ родовъ возможно и при воздѣйствіи медикаментовъ, и при лѣченіи ваннами (солодовья).

Ближайшая причина успѣха кастраціи, главнымъ образомъ, зиждется на уничтоженіи прилива крови во время менструальныхъ періодовъ.

Б. Фейнбергъ.

251. **A. Buechler. R. Kaltenbach's Ergebnisse der vaginalen Totalexstirpation mit Peritonealnaht.** (Zeitschr. für Geburtsh., Bd. XXX, Hft. 2). **Результаты достигнутые Кальтенбахомъ при влагалищномъ полномъ вырѣзываніи матки со швомъ брюшины.**

Въ іюлѣ 1889 года, *Кальтенбахъ* обнародовалъ 60 такихъ операций, произведенныхъ имъ по поводу злокачественныхъ новообразованій и 2 раза онъ оперировалъ по поводу полныхъ, другимъ пособіемъ трудно восстанавливаемыхъ, пролапсовъ. Изъ 62, окончились летально 2, что равно 3,2%. Изъ 35, которыхъ въ теченіи перваго года наблюдали, умерла одна, 13 были безъ рецидивовъ, 19 въ теченіи 3½—16 мѣсяцевъ получили рецидивъ; отъ двухъ, сообщеній о состояніи здоровья не поступило. Надо замѣтить, что въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ наступалъ рецидивъ, операція произведена поздно, т. е. была уже задѣта ткань, окружающая матку. О дальнѣйшей судьбѣ этихъ оперированныхъ по истеченіи 5—7½ лѣтъ, *Б.* сообщаетъ слѣдующія данныя: поступило свѣденій отъ 53 больныхъ; изъ этого числа наступило полное выздоровленіе у 15, т. е. въ 25% изъ приведеннаго и 28% изъ общаго числа оперированныхъ. Со времени вышеуказаннаго сообщенія *Кальтенбаха* по 1 апрѣля 1894 года, частью покойнымъ профессоромъ, частью его ассистентами, было произведено еще 97 влагалищныхъ полныхъ вырѣзываній матки; 93 раза оперировали по поводу злокачественныхъ новообразованій матки, 2 раза вслѣдствіе неудержимой метрорагіи (endometritis, myom) и 2 раза вслѣдствіе полного выпаденія матки. вмѣстѣ съ описанными 62, число операций такимъ образомъ возросло до 159, съ 6-ю (3,8%) смертельными случаями. Въ то время какъ *Кальтенбахъ* въ первое