

стороны респираціи, встрѣчающихся у этихъ больныхъ довольно часто.

Не взирая на то, что успѣхъ кастраціи въ первое время очевиденъ, что боли значительно уменьшаются, что нарушенное передвиженіе больныхъ въ весьма удовлетворительной степени восстанавливается, полное выздоровленіе все же часто затягивается и рецидивы возможны. Съ другой стороны улучшение всѣхъ симптомовъ болѣзни послѣ родовъ возможно и при воздѣйствіи медикаментовъ, и при лѣченіи ваннами (солодовья).

Ближайшая причина успѣха кастраціи, главнымъ образомъ, зиждется на уничтоженіи прилива крови во время менструальныхъ періодовъ.

Б. Фейнбергъ.

251. **A. Buechler. R. Kaltenbach's Ergebnisse der vaginalen Totalexstirpation mit Peritonealnaht.** (Zeitschr. für Geburtsh., Bd. XXX, Hft. 2). **Результаты достигнутые Кальтенбахомъ при влагалищномъ полномъ вырѣзываніи матки со швомъ брюшины.**

Въ іюлѣ 1889 года, *Кальтенбахъ* обнародовалъ 60 такихъ операций, произведенныхъ имъ по поводу злокачественныхъ новообразованій и 2 раза онъ оперировалъ по поводу полныхъ, другимъ пособіемъ трудно восстанавливаемыхъ, пролапсовъ. Изъ 62, окончились летально 2, что равно 3,2%. Изъ 35, которыхъ въ теченіи перваго года наблюдали, умерла одна, 13 были безъ рецидивовъ, 19 въ теченіи 3½—16 мѣсяцевъ получили рецидивъ; отъ двухъ, сообщеній о состояніи здоровья не поступило. Надо замѣтить, что въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ наступалъ рецидивъ, операція произведена поздно, т. е. была уже задѣта ткань, окружающая матку. О дальнѣйшей судьбѣ этихъ оперированныхъ по истеченіи 5—7½ лѣтъ, *Б.* сообщаетъ слѣдующія данныя: поступило свѣденій отъ 53 больныхъ; изъ этого числа наступило полное выздоровленіе у 15, т. е. въ 25% изъ приведеннаго и 28% изъ общаго числа оперированныхъ. Со времени вышеуказаннаго сообщенія *Кальтенбаха* по 1 апрѣля 1894 года, частью покойнымъ профессоромъ, частью его ассистентами, было произведено еще 97 влагалищныхъ полныхъ вырѣзываній матки; 93 раза оперировали по поводу злокачественныхъ новообразованій матки, 2 раза вслѣдствіе неудержимой метрорагіи (endometritis, myom) и 2 раза вслѣдствіе полного выпаденія матки. вмѣстѣ съ описанными 62, число операций такимъ образомъ возросло до 159, съ 6-ю (3,8%) смертельными случаями. Въ то время какъ *Кальтенбахъ* въ первое

время не во всѣхъ случаяхъ вмѣстѣ съ маткой удалялъ и аднексы, онъ и его ассистенты впоследствии дѣлали это постоянно. По ихъ удаленіи, наступаетъ зашиваніе брюшины. Этимъ избѣгается выпаденіе и ущемленіе кишечника, послѣдовательная септическая инфекція, интоксикаціи вызываемыя тампонаціей. Въ первыхъ 62 случаяхъ дренажъ употреблялся 4 раза, въ послѣдующихъ 97 случаяхъ одинъ только разъ. Авторъ вторично указываетъ, на основаніи описываемыхъ имъ случаевъ, на прекрасные результаты отъ зашиванія брюшины; упрекъ, что вслѣдствіе этого, позади шва, можетъ накопиться гной, неоснователенъ.

Результаты, достигнутыя *Кальтенбахомъ*, лучше другихъ; въ то время какъ средняя смертность послѣ 718 случаевъ полного влагалищнаго вырѣзыванія матки равна 9,5%, на долю случаевъ *Кальтенбаха* приходится только 3,9% или 3% (случаи имъ самимъ оперированные *).

Б. И. Фейнбергъ.

*) Изъ русскихъ операторовъ *Оттъ*, на 30 случаевъ, имѣлъ 0% смертности.
Реф.