

265. **Dr. Gardiner. Dystocia from occlusion of cervix uteri.** (Lancet, 26 May, 1894, p. 1300). Препятствіе къ родамъ вслѣдствіе зарощенія зѣва.

Д-ръ *G.* былъ приглашенъ къ беременной во второй разъ, по случаю болей, принятыхъ окружающими за родовыя, но оказавшіяся кишечными. При внутреннемъ изслѣдованіи маточная шейка оказалась заросшею; вмѣсто отверстія зѣва, ощупывался бугорочекъ, величиною въ горчичное зерно, черезъ который нельзя было провести самый тонкій зондъ. Черезъ нѣсколько времени наступили роды. Прождавъ 3 часа, пока растянувшаяся шейка покрыла предлагающую головку, д-ръ *G.*, подъ хлороформомъ, захватилъ острымъ крючкомъ маточную шейку, оттянулъ ее еще болѣе книзу и пугочатыми ножницами разрѣзалъ ткани шейки въ направленіи поперечнаго діаметра таза; въ виду недостаточности этого, сдѣлалъ еще 2—3 продольныхъ надрѣза шейки и извлекъ щипцами ребенка 10 фунтовъ вѣсу. Черезъ 2 часа у родильницы произошло огромное кровотеченіе съ явленіями острой анеміи. Эрготинъ и эфиръ подкожно, удаленіе кровяныхъ сгустковъ изъ матки и горячіе души, такія же бутылки къ ногамъ, горчичники къ сердцу—оживили больную. Послѣродовой періодъ прошелъ гладко, за исключеніемъ двухъ-дневнаго жара, приписаннаго *G.* изъязвленію сосковъ. Зѣвъ на 25 день не представлялъ ничего ненормальнаго. *Gardiner* говоритъ, что на 4000 родовъ, онъ видѣлъ такое зарощеніе зѣва всего два раза.

*М. Гинзбургъ.*

266. **Dr. Thomas Oliwer. Epilepsy in a puerpera with hyperpyrexia; death.** (Lancet, 26 May, 1894). Эпилепсія у родильницы, съ чрезвычайно высокой температурой, кончившаяся летально.

Эклампсическія и эпилептическія конвульсіи у родильницъ схожи только по наружнымъ проявленіямъ; но зависятъ отъ совершенно различныхъ болѣзней. Слѣдующій случай поучителенъ во многихъ отношеніяхъ.

Въ семьѣ родильницы не было эпилептиковъ, первый приступъ эпилепсіи появился у ней на 10 день послѣ первыхъ родовъ, 4 года назадъ; она тогда тяжело болѣла; вслѣдствіе частыхъ, повторныхъ приступовъ; бѣлка въ мочѣ не было.

Послѣ второй беременности у ней были легкіе приступы, *petit mal*. При третьей беременности она стала нервной, раздражительной, скучной и у нея появились приступы, состоявшіе въ поблѣднѣніи лица, неподвижности глазъ и потери сознанія на 1—2 минуты; ни бѣлка въ мочѣ, ни отековъ, ни рвоты не было.