

265. **Dr. Gardiner. Dystocia from occlusion of cervix uteri.** (Lancet, 26 May, 1894, p. 1300). Препятствіе къ родамъ вслѣдствіе зарощенія зѣва.

Д-ръ *G.* былъ приглашенъ къ беременной во второй разъ, по случаю болей, принятыхъ окружающими за родовыя, но оказавшіяся кишечными. При внутреннемъ изслѣдованіи маточная шейка оказалась заросшею; вмѣсто отверстія зѣва, ощупывался бугорочекъ, величиною въ горчичное зерно, черезъ который нельзя было провести самый тонкій зондъ. Черезъ нѣсколько времени наступили роды. Продавъ 3 часа, пока растянувшаяся шейка покрыла предлагающую головку, д-ръ *G.*, подъ хлороформомъ, захватилъ острымъ крючкомъ маточную шейку, оттянулъ ее еще болѣе книзу и пучговчатыми ножницами разрѣзалъ ткани шейки въ направленіи поперечнаго діаметра таза; въ виду недостаточности этого, сдѣлалъ еще 2—3 продольныхъ надрѣза шейки и извлекъ щипцами ребенка 10 фунтовъ вѣсу. Черезъ 2 часа у родильницы произошло огромное кровотеченіе съ явленіями острой анеміи. Эрготинъ и эфиръ подкожно, удаленіе кровяныхъ сгустковъ изъ матки и горячіе души, такія же бутылки къ ногамъ, горчичники къ сердцу—оживили больную. Послѣродовой періодъ прошелъ гладко, за исключеніемъ двухъ-дневнаго жара, приписаннаго *G.* изъязвленію сосковъ. Зѣвъ на 25 день не представлялъ ничего ненормальнаго. *Gardiner* говоритъ, что на 4000 родовъ, онъ видѣлъ такое зарощеніе зѣва всего два раза.

*М. Гинзбургъ.*

266. **Dr. Thomas Oliwer. Epilepsy in a puerpera with hyperpyrexia; death.** (Lancet, 26 May, 1894). Эпилепсія у родильницы, съ чрезвычайно высокой температурой, кончившаяся летально.

Эклампсическія и эпилептическія конвульсіи у родильницъ схожи только по наружнымъ проявленіямъ; но зависятъ отъ совершенно различныхъ болѣзней. Слѣдующій случай поучителенъ во многихъ отношеніяхъ.

Въ семьѣ родильницы не было эпилептиковъ, первый приступъ эпилепсіи появился у ней на 10 день послѣ первыхъ родовъ, 4 года назадъ; она тогда тяжело болѣла; вслѣдствіе частыхъ, повторныхъ приступовъ; бѣлка въ мочѣ не было.

Послѣ второй беременности у ней были легкіе приступы, *petit mal*. При третьей беременности она стала нервной, раздражительной, скучной и у нея появились приступы, состоявшіе въ поблѣднѣніи лица, неподвижности глазъ и потери сознанія на 1—2 минуты; ни бѣлка въ мочѣ, ни отековъ, ни рвоты не было.

Роды произошли быстро; через 7 часовъ начались у ней приступы конвульсій, повторившіеся 5—6 разъ до утра, до прихода д-ра *Ol.* Онъ засталъ ее какъ бы въ коматозномъ состояніи, изъ котораго ее можно было разбудить; языкъ былъ припухшимъ, зрачки полу-расширены, очищенія обильны, моча отдѣлялась непроизвольно; катетеромъ извлечено 3 унца мочи, въ которой бѣлка не оказалось. Температура  $101,2^{\circ}$ , пульсъ 80. Назначены бромистые препараты въ клистирѣ, горчишники на поясницу.

21/у. Съ 3 ч. ночи, до 10 ч. утра приступы возобновились.  $t^{\circ} 101,5^{\circ}$ , пульсъ 160. Зрачки сужены.

22/у.  $t^{\circ} 104,4$ , п. 140, зрачки сужены, безъ сознанія. 20 gram. antipyrin'a низвели температуру на  $102^{\circ}$ , но къ ночи она вновь поднялась на  $104^{\circ}$ , пульсъ на 162, дыханіе на 60, съ хрипѣніемъ, зрачки въ видѣ точекъ, коматозное состояніе.

23/у. Состояніе ухудшилось и при постоянномъ повышеніи температуры, она умерла на четвертый день послѣ родовъ. Температура передъ смертію подымалась такъ: *утромъ*  $104,2^{\circ}$ ; *днемъ*  $105,2^{\circ}$ ; *позднѣе*  $105,6^{\circ}$ ; *вечеромъ*, въ 8 ч.,  $107,2^{\circ}$ ; въ 10 ч.  $108,2^{\circ}$ ; въ  $11\frac{1}{2}$  ч.  $109,0^{\circ}$ .

Здѣсь не было послѣ-родовой септицеміи; отсутствіе бѣлка въ мочѣ исключало эклампсію. Безсознаніе, суженіе зрачковъ и hyperpyrexia указывали на капиллярное кровоизліяніе въ мозгъ; вскрытіе къ сожалѣнію, не было допущено.

*Oliver* оспариваетъ взгляды *Gowers'a*, утверждающаго, что большею частью приступы эпилепсіи не появляются въ послѣ-родовомъ періодѣ. *Ol.* находитъ, что обусловливаемая беременностью измѣненія въ кровообращеніи и нервныхъ центрахъ, predisposing женщины къ повторнымъ приступамъ, подобно тому, какъ хорей, появившись при одной беременности, повторяется при слѣдующихъ беременностяхъ въ томъ же періодѣ беременности. *Ol.* рассказываетъ про одну даму, у которой при каждой беременности повторялись эпилептическіе приступы, такъ что она по нимъ узнавала, что у ней наступила новая беременность.

*М. Гинзбургъ.*

167. Dr. Morton Butler. Two cases of hernia of the Fallopian Tube. (Lancet, 1894, 17 February). Два случая грыжи Фаллопіевой трубы.

46-лѣтняя женщина страдала болѣе 2-хъ лѣтъ опухолью въ правомъ паху, которая вдругъ быстро увеличилась. Опухоль представлялась похожей на железу съ зыбленіемъ въ центрѣ. До-