

Роды произошли быстро; через 7 часовъ начались у ней приступы конвульсій, повторившіеся 5—6 разъ до утра, до прихода д-ра *Ol.* Онъ засталъ ее какъ бы въ коматозномъ состояніи, изъ котораго ее можно было разбудить; языкъ былъ припухшимъ, зрачки полу-расширены, очищенія обильны, моча отдѣлялась непроизвольно; катетеромъ извлечено 3 унца мочи, въ которой бѣлка не оказалось. Температура 101,2°, пульсъ 80. Назначены бромистые препараты въ клистирѣ, горчишники на поясницу.

21/у. Съ 3 ч. ночи, до 10 ч. утра приступы возобновились. t° 101,5°, пульсъ 160. Зрачки сужены.

22/у. t° 104,4, п. 140, зрачки сужены, безъ сознанія. 20 gram. antipyrin'a низвели температуру на 102°, но къ ночи она вновь поднялась на 104°, пульсъ на 162, дыханіе на 60, съ хрипѣніемъ, зрачки въ видѣ точекъ, коматозное состояніе.

23/у. Состояніе ухудшилось и при постоянномъ повышеніи температуры, она умерла на четвертый день послѣ родовъ. Температура передъ смертію подымалась такъ: *утромъ* 104,2°; *днемъ* 105,2°; *позднѣе* 105,6°; *вечеромъ, въ 8 ч.,* 107,2°; *въ 10 ч.* 108,2°; *въ 11½ ч.* 109,0°.

Здѣсь не было послѣ-родовой септицеміи; отсутствіе бѣлка въ мочѣ исключало эклампсію. Безсознаніе, суженіе зрачковъ и гипергугехія указывали на капиллярное кровоизліаніе въ мозгу; вскрытіе къ сожалѣнію, не было допущено.

Oliver оспариваетъ взгляды *Gowers'a*, утверждающаго, что большею частью приступы эпилепсіи не появляются въ послѣ-родовомъ періодѣ. *Ol.* находитъ, что обусловливаемая беременностью измѣненія въ кровообращеніи и нервныхъ центрахъ, предрасполагають женщинъ къ повторнымъ приступамъ, подобно тому, какъ хорей, появившійся при одной беременності, повторяется при слѣдующихъ беременностяхъ въ томъ же періодѣ беременності. *Ol.* рассказываетъ про одну даму, у которой при каждой беременності повторялись эпилептическіе приступы, такъ что она по нимъ узнавала, что у ней наступила новая беременность.

М. Гинзбургъ.

167. **Dr. Morton Butler. Two cases of hernia of the Fallopian Tube.** (Lancet, 1894, 17 February). Два случая грыжи Фаллопіевой трубы.

46-лѣтняя женщина страдала болѣе 2-хъ лѣтъ опухолью въ правомъ паху, которая вдругъ быстро увеличилась. Опухоль представлялась похожей на железу съ зыбленіемъ въ центрѣ. До

поступленія въ больницу пациентку 5 дней не слабило, назначенное ей въ госпиталѣ слабительное отлично прочистило ее. На 4-й день по поступленіи ея сдѣлали разрѣзь опухоли: въ грыжевомъ мѣшкѣ найдено немного темно-кофейной жидкости, и трубчатое тѣло неправильной формы съ варикозными расширениями и бахромкой на одномъ концѣ ея, оказавшееся Фаллопиевой трубой. Рана зашита и заросла первичнымъ натяженіемъ, больная выздоровѣла.

Другая женщина имѣла право-бедренную грыжу, въ которой двѣ недѣли замѣчались припадки ущемленія. Назначенное ей слабительное вызвало обильное испражненіе. При грыжесѣченіи въ мѣшкѣ оказались: омертвѣвшія части сальника и разорванной кишки, въ полости брюшины фекальныя массы съ гноемъ. Труба удалена и сдѣланъ искусственный anus. Черезъ 12 часовъ больная умерла отъ шока. Вскрытіе указало, что сальникъ, части тонкихъ и слѣпой кишки срослены въ одну массу, оканчивающуюся бахромками, т. е. срослись съ Фаллопиевой трубой.

М. Д. Гинзбургъ.

Редакторы: { Д. Оттъ.
Л. Личеусъ.