

Одну изъ нихъ онъ крѣпко затягиваетъ и завязываетъ, съ другою же онъ продѣлываетъ тоже самое черезъ 3—5 дней. Черезъ 12—16 дней лигатуры отпадаютъ, прорѣзавъ сдавленные и лишеныя питающаго тѣни, а наружный зѣвъ представляется расширеннымъ, бисквито-образной формы. Выгоды операціи, по автору состоятъ въ легкости, безболѣзненности, и, слѣдовательно, возможности производить ее безъ хлороформнаго наркоза, необременительности для больной послѣдующаго лѣченія.

Операція была уже произведена около 50 разъ. Показаніемъ къ операціи авторъ считаетъ стенозъ наружнаго маточнаго зѣва при нормальной или малой влагалищной части. *В. Строгоновъ.*

117. **Alfred Goenner. Ein Fall von selbsteingeleitetem Abort.** (Centr. f. Gynaecol., № 3, 1894). **Случай искусственнаго аборта вызваннаго самой больной.**

25/x 1885 г. *G.* былъ приглашенъ къ 37-лѣтней больной, родившей уже 4 зрѣлыхъ дѣтей и имѣвшей уже 3 выкидыша, вызванныхъ искусственнымъ путемъ. И на этотъ разъ больная считала себя беременной и ввела, какъ и прежде эластическій катетеръ съ мандриномъ во влагалище, а затѣмъ, по ея мнѣнію, въ матку. Часть катетера была отрѣзана, при введеніи была нѣкоторая боль. Вечеромъ рвота. На 4-й день t^0 39,5⁰. Чувствительность живота слѣва. При изслѣдованіи врачомъ катетера не найдено, во влагалищѣ нѣтъ слѣдовъ раненія. Явленія перитонита увеличились.

На 6-й день произошелъ абортъ, но катетеръ не вышелъ, тѣмъ не мѣнѣ болѣзненные явленія значительно уменьшились, и лишь по временамъ появлялась высокая температура. Черезъ 1½—2 мѣсяца больная обратилась къ проф. *Bischoff*'у, который не могъ констатировать гдѣ либо куска катетера. На слѣдующій день онъ выпалъ самъ при стулѣ, но къ сожалѣнію точно не констатировано изъ влагалища, или *per rectum*. Большое количество слизи, покрывавшей его, говоритъ за послѣдній путь.

В. Строгоновъ.

118. **Pfannenstiel. Ueber die gefährlichkeit der intra uterinen glycerineinspritzung behufs Einleitung der Künstlichen Frühgeburt.** (Centr. f. Gynaecolog., № 4, 1894). **Объ опасности внутриматочнаго впрыскиванія глицерина для вызыванія искусственныхъ преждевременныхъ родовъ.**

P. сообщаетъ два случая примѣненія глицериновыхъ впрыскиваній, доказывающихъ по его мнѣнію, большую опасность этого спо-