

При секції опухоль оказалась солитарной кистой, содержащей прозрачную сыворотку, съ внутренней стѣнкой похожей на сывороточную оболочку. Въ окружности большой множество мелкихъ кистъ величиной съ горошину.

В. Строгоновъ.

124. Feis. Ein Fall von Fibromyoma ovarii. (Centr. f. Gynaecol., № 6, 1894 г.). **Случай фиброміомы яичника.**

Е. наблюдалъ относительно рѣдкій случай фиброміомы яичника. Какъ извѣстно нѣкоторые авторы отрицаютъ существованіе яичниковыхъ твердыхъ опухолей, заключающихъ мышечные элементы, хотя въ литературѣ имѣется уже нѣсколько сообщеній, опровергающихъ это мнѣніе.

Случай *Feis*'а слѣдующій: 38 лѣтн., больная была оперирована проф. *Runge* по поводу опухоли лѣваго яичника. По удаленіи изъ живота она оказалась величиной съ гусиное яйцо, имѣла форму увеличеннаго яичника. Труба проходила свободно по ней. Новообразование равномерно твердо, имѣетъ бугристую поверхность безъ слѣда сращеній.

При микроскопическомъ изслѣдованіи, кромѣ соединительной ткани, констатируются многочисленные мышечные пучки, находящіеся не только вблизи сосудовъ, но и въ отдаленіи отъ нихъ. Только на одномъ мѣстѣ былъ найденъ Граафовъ пузырекъ съ хорошо сохраннымъ эпителиемъ, которымъ и удалось доказать яичниковую натуру опухоли. Пузырекъ лежалъ непосредственно подъ капсулой.

125. Sängner. Zur Aetiologie und operativen Behandlung der Vulvitis pruriginosa. (Centralblatt für Gynaecologie, № 7, 1894 г.). **Къ этиологіи и оперативному лѣченію vulvitid. pruriginosae.**

S. вначалѣ разсматриваетъ различныя воззрѣнія авторовъ на эту болѣзнь и указываетъ на ихъ односторонность. Онъ полагаетъ, что pruritus vulvae всегда сочетается съ воспалительными явленіями этой области, и потому считаетъ наиболѣе раціональнымъ названіе vulvitis pruriginosa. Причины этой болѣзни онъ раздѣляетъ на 2 большія группы: эндогенныя и экзогенныя.

Къ первымъ онъ относитъ:

1) Гемотогенныя—точноѣ гематохимическія, какъ напримѣръ, при желтухѣ, при хроническомъ нефритѣ, при сахарномъ мочеизнуреніи, а также иногда при морфинизмѣ, алкоголизмѣ и хроническомъ отравленіи іодоформомъ. Соотвѣтственные вещества,

циркулирующія при этихъ заболѣваніяхъ въ крови, дѣйствуютъ на нервныя окончанія и вызываютъ зудъ.

2) Причины, обусловливающія гиперемію. Такъ напр., застойныя гипереміи въ области срамныхъ вѣнъ, геморроидальныхъ вѣнъ съ *plexus rampiniformis*, при порокахъ сердца, беременности, геморроѣ, *retroflexio uteri*, опухоляхъ матки.

3) При гематогенныхъ кожныхъ заболѣваніяхъ, какъ напр., эритема, крапивница, *herpes*, отдѣльныя формы экземы производятъ заболѣваніе кожныхъ сосочковъ вѣнъ съ чувствительными нервными окончаніями или приводятъ къ таковому вслѣдствіе механическаго раздраженія треніемъ, чесаніемъ и проч.

Къ экзогенной группѣ онъ относитъ:

1) Секреторно-химическія причины, какъ напр., при чрезмѣрной потливости, при чрезмѣрномъ отдѣленіи салныхъ железъ, при орошеніи нормальной или патологической мочей, при ѣдкихъ бѣляхъ, будутъ ли послѣднія исходить изъ *vulvae*, влагалища или матки, при катарральномъ и гнойномъ секретѣ изъ прямой кишки (въ послѣднемъ случаѣ прежде всего развивается *pruritus ani* нерѣдко съ переходомъ на *vulv'y*).

2) Причины, обусловленные паразитами, какъ животнаго, такъ и растительнаго царства. Изъ первыхъ онъ упоминаетъ вшей, *morpion'овъ* и острицъ, изъ растительныхъ называетъ *leptothrix*, *leptomitus*, *oidium albicans*, *micrococcus ureae*, *bacterium ureae*, *gonococcus*, *smegmobacillus*, *bacterium termo*, стрептококковъ, стафилококковъ и различныхъ микробовъ кожи и влагалища.

3) Механическія причины, какъ напр., мастурбация, излишнее мытье, особенно губками и растираніе.

4) Термическія причины, какъ напр., *pruritus aestivus et hiemalis*.

Переходя къ терапіи этого заболѣванія *S.* говоритъ, что въ большинствѣ случаевъ причинная и мѣстная терапія устраняетъ или значительно ослабляетъ заболѣваніе. Въ упорныхъ же случаяхъ онъ рекомендуетъ оперативное лѣченіе, уже давно предложенное нѣкоторыми авторами, но до сихъ поръ имѣющее лишь небольшое примѣненіе. Въ своихъ 2-хъ случаяхъ онъ получилъ полный успѣхъ, причемъ въ первомъ онъ удалилъ клиторъ, съ уздечкой и покрываломъ, большія и малыя губы, а во второмъ—была экстирпирована вся вульва. Кромѣ того въ обѣихъ случаяхъ было сдѣлано *abrasio mucosae uteri*, а въ первомъ—еще и *perineorrhaphi'a*.

В. Строгоновъ.