

ныхъ случаяхъ они были видны даже вблизи zona яйца; способъ окончанія въ послѣднемъ случаѣ не могъ быть констатированъ.

В. Строгоновъ.

138. Pelzer. Weitere Mittheilungen über die intra-uterine Injection von Glycerin, als Erviederung auf Pfannestiel's Aufsatz. (Centr. f. Gynaecologie, 1894, № 15). Дальнѣйшія сообщенія о внутриматочномъ впрыскиваніи глицерина, въ отвѣтъ на статью Pfannenstiel'я.

Pelzer не совсѣмъ объективно возражаетъ на статью своего противника; онъ полагаетъ, что вредное дѣйствіе глицерина въ случаяхъ, бывшихъ подъ наблюденіемъ *Pfannenstiel'*я, не доказано, что повышение t^0 зависѣло отъ раздраженія тепловаго центра глицериномъ, и что можно абсолютно устранить воздушную эмболию при осторожномъ примѣненіи способа, рекомендуемаго имъ.

Далѣе онъ дѣлаетъ краткій обзоръ 28 случаевъ примѣненія глицерина для возбужденія искусственныхъ преждевременныхъ родовъ или для усиленія маточныхъ сокращеній. Въ двухъ случаяхъ наблюдался смертельный исходъ. Оба съ нефритомъ. Къ сожалѣнію они описаны очень кратко. Возбужденіе маточныхъ сокращеній наблюдалось не только при впрыскиваніи большихъ дозъ (100 grm.), но и значительно меньшихъ (50 и даже 15 grm.) въ послѣднихъ случаяхъ, правда, приходилось иногда повторять впрыскиваніе.

Резюмируя наблюденія, онъ говоритъ: ни въ одномъ случаѣ (за исключеніемъ двухъ, имѣвшихъ уже Брайтову болѣзнь) не наблюдалось появленія въ мочѣ ни бѣлка, ни кровянистаго окрашиванія. Не было также воздушной эмболии.

Родовыя боли наступали среднимъ числомъ въ періодъ времени около 2 часовъ. До совершеннаго раскрытія маточнаго зѣва проходило еще 8—10 часовъ, а при узкомъ тазѣ нѣсколько больше.

Смерть двухъ матерей отъ частыхъ экламптическихъ припадковъ, можетъ быть была нѣсколько ускорена впрыскиваніемъ глицерина. Одинъ изъ плодовъ, по мнѣнію автора, умеръ вслѣдствіе сильныхъ маточныхъ сокращеній, вызванныхъ впрыскиваніемъ 100 ccm. глицерина.

На основаніи этихъ данныхъ онъ приходитъ къ заключенію, что впрыскивать слѣдуетъ отъ 30 до 50 ccm. иногда повторяя это и что при эклампсіи, равно и при центральномъ предлежаніи

послѣда примѣнять этотъ способъ не слѣдуетъ, въ другихъ же случаяхъ онъ заслуживаетъ дальнѣйшаго примѣненія и испытанія.

В. Строгоновъ.

139. Pfannenstiel. Nochmals über die Gefährlichkeit der intrauterinen Glycerineinspritzung behufs Einleitung der Künstlichen Frühgeburt. (Centr. f. G., № 16, 1894). Еще разъ объ опасности внутриматочнаго впрыскиванія глицерина съ цѣлью производства искусственныхъ преждевременныхъ родовъ. Возраженіе на статью Pelzer'a. (Centr. f. G., № 15, 1894).

Возражая *Pelzer*'у, *Pf.* приводитъ нѣкоторыя подробности ранѣе сообщенныхъ имъ случаевъ впрыскиванія глицерина для производства преждевременныхъ родовъ. Онъ полагаетъ, что тамъ имѣлись несомнѣнныя явленія отравленія глицериномъ. Далѣе онъ реферировать случай *Müller*'а (опущенный *Pelzer*'омъ) изъ клиники *Winckel*'я, гдѣ наблюдались подобныя явленія, а именно: послѣ впрыскиванія глицерина появилась рвота, потрясающій знобъ, повышение t^0 до 40^0 C., учащеніе дыханія до 44, при явленіяхъ сильной одышки. При этомъ моча сдѣлалась красно-темнокоричневою, въ ней найдены гемоглобинъ, гематопорфиринъ и небольшое число красныхъ и бѣлыхъ кровяныхъ шариковъ. Далѣе онъ сообщаетъ наблюденіе *Микулича*, что впрыскиваніе іодоформа въ глицеринъ при свѣжихъ раненіяхъ зачастую вызываетъ гемоглобинурию. Въ одномъ случаѣ дѣло окончилось даже смертью у ребенка четырехъ лѣтъ, при явленіяхъ остраго паренхиматознаго нефрита, отека легкихъ и инфаркта почекъ метгемоглобиномъ.

На основаніи вышеизложеннаго *Pf.* отвергаетъ впрыскиваніе большихъ дозъ глицерина для производства преждевременныхъ родовъ. Что же касается впрыскиванія малыхъ дозъ, то дѣйствительность ихъ далеко не доказана, такъ какъ чистыхъ наблюденій въ этомъ направленіи очень мало, и едва-ли въ такой формѣ предлагаемый способъ болѣе дѣйствителенъ, чѣмъ давно примѣняемое бужированіе и колнейризы матки, которые, по мнѣнію автора, значительно менѣе опасны.

В. Строгоновъ.

140. И. Верницъ. Zur Kasuistik der Geschwülste der Vagina und Vulva. (Centralbl. f. Gynäk., 1894, № 26). Къ казуистикѣ новообразованій влагалища и наружныхъ половыхъ органовъ.

Два случая: 1) *fibromyoma*, съ гусиное яйцо, передней стѣнки влагалища, у рожавшей женщины, 49 лѣтъ; 2) *sarcoma fibroides*, съ кулакъ, лѣвой большой губы, у рожавшей женщины, 44 лѣтъ.

Н. Какушкинъ.