

послѣда примѣнять этотъ способъ не слѣдуетъ, въ другихъ же случаяхъ онъ заслуживаетъ дальнѣйшаго примѣненія и испытанія.

В. Строгоновъ.

139. Pfannenstiel. Nochmals über die Gefährlichkeit der intrauterinen Glycerineinspritzung behufs Einleitung der Künstlichen Frühgeburt. (Centr. f. G., № 16, 1894). Еще разъ объ опасности внутриматочнаго впрыскиванія глицерина съ цѣлью производства искусственныхъ преждевременныхъ родовъ. Возраженіе на статью Pelzer'a. (Centr. f. G., № 15, 1894).

Возражая *Pelzer*'у, *Pf.* приводитъ нѣкоторыя подробности ранѣе сообщенныхъ имъ случаевъ впрыскиванія глицерина для производства преждевременныхъ родовъ. Онъ полагаетъ, что тамъ имѣлись несомнѣнныя явленія отравленія глицериномъ. Далѣе онъ реферировать случай *Müller*'а (опущенный *Pelzer*'омъ) изъ клиники *Winckel*'я, гдѣ наблюдались подобныя явленія, а именно: послѣ впрыскиванія глицерина появилась рвота, потрясающій знобъ, повышение t^0 до 40^0 C., учащеніе дыханія до 44, при явленіяхъ сильной одышки. При этомъ моча сдѣлалась красно-темнокоричневою, въ ней найдены гемоглобинъ, гематопорфиринъ и небольшое число красныхъ и бѣлыхъ кровяныхъ шариковъ. Далѣе онъ сообщаетъ наблюденіе *Микулича*, что впрыскиваніе іодоформа въ глицеринъ при свѣжихъ раненіяхъ зачастую вызываетъ гемоглобинурию. Въ одномъ случаѣ дѣло окончилось даже смертью у ребенка четырехъ лѣтъ, при явленіяхъ остраго паренхиматознаго нефрита, отека легкихъ и инфаркта почекъ метгемоглобиномъ.

На основаніи вышеизложеннаго *Pf.* отвергаетъ впрыскиваніе большихъ дозъ глицерина для производства преждевременныхъ родовъ. Что же касается впрыскиванія малыхъ дозъ, то дѣйствительность ихъ далеко не доказана, такъ какъ чистыхъ наблюденій въ этомъ направленіи очень мало, и едва-ли въ такой формѣ предлагаемый способъ болѣе дѣйствителенъ, чѣмъ давно примѣняемое бужированіе и колнейризы матки, которые, по мнѣнію автора, значительно менѣе опасны.

В. Строгоновъ.

140. И. Верницъ. Zur Kasuistik der Geschwülste der Vagina und Vulva. (Centralbl. f. Gynäk., 1894, № 26). Къ казуистикѣ новообразованій влагалища и наружныхъ половыхъ органовъ.

Два случая: 1) *fibromyoma*, съ гусиное яйцо, передней стѣнки влагалища, у рожавшей женщины, 49 лѣтъ; 2) *sarcoma fibroides*, съ кулакъ, лѣвой большой губы, у рожавшей женщины, 44 лѣтъ.

Н. Какушкинъ.