

РЕФЕРАТЫ.

Обзор нѣмецкой акушерско-гинекологической литературы:

1. Ф. А. Доббертъ.—*Beiträge zur Anatomie der Uterusschleimhaut bei ektopischer Schwangerschaft.* (Arch. f. Gynaekologie, Bd., XLVII, Hft. 2). Къ анатоміи слизистой оболочки матки при внѣматочной беременности.

Въ двухъ препаратахъ, полученныхъ благодаря разрыву беременной тубы со смертельнымъ исходомъ, легко различить на слизистой оболочкѣ матки три слоя: поверхностный, состоящій преимущественно изъ децидуальныхъ клѣтокъ, средній, содержащій расширенныя железы и глубокий слой, состоящій изъ мало измененной соединительной ткани и содержащій въ себѣ сравнительно мало измененныя железы. Замѣчательно, что во второмъ изъ этихъ препаратовъ, не смотря на то, что беременность въ этомъ случаѣ продолжалась дольше, дифференцировка этихъ слоевъ не была такъ ясно выражена какъ въ первомъ, фактъ, который авторъ, подобно *Wyder*'у, объясняетъ тѣмъ обстоятельствомъ, что въ этомъ случаѣ яйцевое ложе находилось дальше отъ маточной полости, а именно въ наружной трети трубы. Въ трехъ препаратахъ дѣло идетъ о произвольно выдѣлившихся изъ матки децидуальныхъ мѣшкахъ, строеніе которыхъ вполнѣ напоминаетъ собою поверхностный компактный слой первыхъ двухъ препаратовъ. Наконецъ, въ двухъ препаратахъ, тоже полученныхъ благодаря разрыву тубы, но послѣ того, какъ при жизни уже выдѣлилась *decidua*, авторъ нашелъ на слизистой оболочкѣ матки лишь глубокий, мало измененный слой. Всѣ препараты, вмѣстѣ взятые, вполнѣ подтверждаютъ какъ тотъ фактъ, что при внѣматочной беременности слизистая оболочка матки претерпѣваетъ измененія

вполнѣ аналогичныя съ тѣми, какія бываютъ при нормальной беременности, такъ и тотъ фактъ, что отдѣленіе deciduae происходитъ въ элементахъ средняго слоя. *С. Ю. Хазанъ.*

2. Pelzer.—Ueber das Credé'sche Verfahren in der Nachgeburtsperiode. (Arch. f. Gyn., Bd. XLVII, Hft. 3). **О способѣ Credé въ третьемъ періодѣ родовъ.**

На основаніи новыхъ 1000 наблюденій, сдѣланныхъ въ Кельнскомъ родильномъ институтѣ, авторъ высказывается въ пользу примѣненія въ третьемъ періодѣ родовъ способа *Credé*, при которомъ не только средняя потеря крови меньше, чѣмъ при выжидательномъ образѣ дѣйствій, но и родильный періодъ протекаетъ лучше, не смотря на то, что при активномъ вмѣшательствѣ несравненно чаще приходится прибѣгать къ ручному отдѣленію послѣда.

С. Ю. Хазанъ.

3. Leopold.—Vergleichende Untersuchungen über die Entbehrlichkeit der Scheidenausspülungen bei ganz normalen Geburten und über die sogenannte Selbstinfektion. (Arch. f. Gyn., Bd. XLVII, Hft. 3). **Сравнительныя изслѣдованія о ненужности влагалищныхъ спринцеваній при нормальныхъ родахъ и о такъ называемомъ самозараженіи.**

Въ то время какъ вопросъ о ненужности или даже вредѣ влагалищныхъ спринцеваній при нормальныхъ родахъ, по скольку дѣло идетъ о частной практикѣ, гдѣ внутреннее изслѣдованіе по мѣрѣ возможности избѣгается, всѣми почти рѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ, этотъ же вопросъ остается спорнымъ касательно клиникъ, гдѣ въ цѣляхъ обученія персонала производятся въ общемъ вредныя для здоровья роженицъ внутреннія изслѣдованія. Такъ какъ прежнія изслѣдованія автора, доказывавшія вредъ влагалищныхъ спринцеваній при нормальныхъ родахъ, даже при производимыхъ учащимися изслѣдованіяхъ, не убѣдили многихъ, въ особенности *Ahlfeld*'а, то для окончательнаго установленія истины *L.* предпринялъ новую серію наблюденій. Вслѣдствіе большаго наплыва роженицъ, въ Дрезденской клиникѣ, въ послѣднее время, пришлось устроить еще помѣщеніе для родовъ, и вотъ этимъ обстоятельствомъ *L.* воспользовался для того, чтобы одновременно произвести наблюденія какъ надъ такими роженицами, у которыхъ не производились влагалищныя ирригаціи, (въ одномъ помѣщеніи), такъ и надъ такими, у которыхъ съ профилактической цѣлью производились ирригаціи (въ другомъ помѣщеніи).