

РЕФЕРАТЫ.

Обзоръ Акушерско-Гинекологической литературы.

а) Русской.

38. В. Н. Орловъ.—Къ дифференціальной діагностикѣ между язвой мягкаго шанкра и раковой язвой влагалища.—(Больничная газета Боткина. 1897, №№ 14, 15, 16).

Въ клиникѣ проф. А. И. Лебедева первичный ракъ влагалища найденъ въ 4 случаяхъ на 6280 приходящихъ больныхъ. Такія же приблизительно отношенія встрѣчаются и у *Martin'a*, *Горвица* и *Славянского*. Но у *Hecht'a* у 4507 женщинъ больныхъ ракомъ первичный ракъ влагалища встрѣтился 50 разъ. Изъ 83 случаевъ рака—на задней стѣнкѣ новообразование помѣщалось 41 разъ, на передней 7 разъ, на передней и задней 12 разъ, на боковыхъ 5 и въ сводахъ 8 разъ. Случай автора касается 45-лѣтней, рожавшей женщины, имѣвшей на задней стѣнкѣ влагалища язву величиной въ поперечникѣ въ 7 смт.; язва неровная, бугристая, легко кровоточащая, съ приподнятыми краями, помѣщается на высокомъ основаніи. Микроскопъ показалъ строеніе плоско-клеточковаго рака. Язва вырѣзана, при чемъ кровоточащіе сосуды отчасти перевязывались, отчасти прижигались каленымъ желѣзомъ. Рана засыпана іодоломъ. Послѣоперационный періодъ протекалъ гладко. Второй случай автора касается 24-лѣтней, рожавшей женщины, страдавшей обильными, иногда сукровичными бѣлями и имѣвшей на лѣвой стѣнкѣ влагалища язву, длиною въ 5 смт. и шириною въ 2½ смт. Язва съ подрывными краями, кровоточащая. Микроскопъ показалъ грануляціонную ткань. Путемъ исключенія поставлено распознаваніе на мягкій шанкръ. Черезъ нѣсколько дней во влагалищѣ появилось нѣсколько язвочекъ, подобныхъ первой.

Н. Какушкинъ.