

42. В. А. Петровъ.—Отчетъ по Саратовскому городскому родильному дому съ 1 декабря 1895 года по 1 декабря 1896 г. (Труды и Прот. Физ.-Медиц. Общ. въ Саратовѣ за 1896 г. Саратовъ. 1897. Стр. 213).

Число родоразрѣшеній 546, въ томъ числѣ 10 выкидышей, 11 двойней. Первородящихъ 30,3%. Мальчиковъ 52,6%. Извлеченій за ножки было 26, поворотовъ на ножку 10, щипцовъ 5, прободеній головки 1. 4 раза была эклипсія. Въ 4,6% былъ разрывъ промежности. Въ среднемъ каждая женщина провела въ родильномъ домѣ 6,99 сутокъ. Послѣродовыя заболѣванія наблюдались въ 9,2% случаевъ, смерть въ 0,73%.

Н. Какушкинъ.

43. А. Малиновскій.—Рожденіе плода *per vias naturales* при внѣматочной беременнности.—(Еженедѣльникъ. 1897, № 45, стр. 703).

Роженица 38 лѣтъ (2-я беременность); роды срочные, воды отошли болѣе сутокъ назадъ. Величина матки соотвѣтствуетъ концу беременности. Справа отъ нея опухоль, нѣсколько болѣе 2 кулаковъ, отдѣленная отъ матки глубокой бороздой. Предлежащая головка стоитъ во входѣ. Схватокъ нѣтъ. Сердцебіенія плода не слышно. Въ щипцахъ сдѣлано прободеніе головки съ послѣдующимъ извлеченіемъ плода. Введенная рука опредѣлила, что матка не содержитъ послѣда, пуповина идетъ въ правую фаллопиеву трубу, гдѣ и находится дѣтское мѣсто (вышеописанная опухоль, сосѣдняя съ маткой). Послѣднее отдѣлено и удалено. Послѣродовой періодъ безъ осложнений.

Н. Какушкинъ.

44. М. В. Кохъ.—Къ казуистикѣ беременнности.—(Еженедѣльникъ. 1897, № 44, стр. 685).

Описано 2 случая. 1) *Роды тройнями*. Беременная, 39 лѣтъ, въ девятый разъ, на 8 мѣсяцѣ. Первый ребенокъ (мальчикъ) родился въ головномъ предлежаніи; 2-й (дѣвочка, около 4 фунтовъ), черезъ часъ, въ ножномъ; 3-й (тоже дѣвочка), черезъ $\frac{1}{4}$ часа, тоже въ ножномъ. Потужная дѣятельность затѣмъ прекратилась, и послѣды пришлось удалить ручными приѣмами; ихъ оказалось три съ общей ворсистой* и отдѣльными водными оболочками. Дѣти хорошо сосали, громко кричали, но черезъ нѣсколько дней умерли. Родильница поправилась. 2) *Missed abortion*. Крестьянка 35 лѣтъ на 5-й недѣлѣ беременности (8-я беременность) была сильно

потрясена внезапной смертью мужа. Появилось скоро прекратившееся кровотечение, но выкидыша не послѣдовало. Выкидышь произошелъ черезъ 4 мѣсяца послѣ этого, причемъ извергнутый плодъ оказался 6—7 недѣльнаго возраста.

Н. Какуткинъ.

45. **К. Г. Столь.**—**Женское безплодіе.**—(Медицинская Бесѣда. 1897 г. № № 19, 20, 21, 22, 24).

Статья представляетъ обстоятельное изложеніе по данному вопросу. Установивъ понятіе о безплодіи, авторъ дѣлитъ безплодіе на первичное и послѣдовательное, постоянное и относительное, опредѣляетъ частоту безплодія и указываетъ на необходимость въ каждомъ случаѣ жалобы женщины на безплодіе исключать безплодіе мужчины. Много мѣста отведено въ статьѣ вопросу объ оплодотвореніи. Авторъ разсматриваетъ 1) безплодіе, какъ слѣдствіе неправильнаго развитія и поступленія яичка въ матку, 2) безплодіе, какъ слѣдствіе непоступленія мужского сѣмени въ дѣтородные органы женщины и 3) безплодіе, какъ слѣдствіе непригодности матки для дальнѣйшаго развитія оплодотвореннаго яичка. Въ заключеніе статьи авторъ говоритъ о половой безчувственности женщины и о вредѣ искусственнаго безплодія.

Н. Какуткинъ.

46. **В. П. Скворкинъ.**—**Два случая эхинококка брюшной полости.**—(Медиц. Бесѣда. 1897 г. № 21, стр. 623).

1) Многорожавшая, 49 лѣтъ. Опухоль въ животѣ растетъ около 1½ лѣтъ. У пупка прощупывается очень подвижная опухоль съ апельсинъ, въ маломъ тазу выпячиваетъ лѣвый сводъ опухоль съ дѣтскую головку. Предположены кисты яичника. Чревосѣченіе показало, что это былъ эхинококкъ сальника, разившійся въ послѣднемъ въ видѣ многихъ разной величины опухолей. Отчасти отсѣчены вмѣстѣ съ тканью сальника, отчасти вылучены только болѣе или менѣе крупныя опухоли, изъ которыхъ одна во время операціи лопнула. Мѣсяцевъ черезъ 5 чревосѣченіе повторено, ибо у больной снова выросли въ животѣ опухоли. На этотъ разъ также изъ сальника удалено нѣсколько опухолей и одна изъ лѣвой фаллопиевой трубы. Всего за 2 раза удалено: 3 опухоли съ дѣтскую головку, 15 опухолей отъ грецкаго орѣха до гусинаго яйца (всѣ 18 изъ сальника), 1 съ гусиное яйцо изъ подъ пристѣночной брюшины, 1—съ грецкій орѣхъ изъ фаллопиевой трубы. Больная поправилась. 2) Повторнорожав-