

потрясена внезапной смертью мужа. Появилось скоро прекратившееся кровотечение, но выкидыша не послѣдовало. Выкидышь произошелъ черезъ 4 мѣсяца послѣ этого, причемъ извергнутый плодъ оказался 6—7 недѣльнаго возраста.

*Н. Какуткинъ.*

45. **К. Г. Столь.**—**Женское безплодіе.**—(Медицинская Бесѣда. 1897 г. № № 19, 20, 21, 22, 24).

Статья представляетъ обстоятельное изложеніе по данному вопросу. Установивъ понятіе о безплодіи, авторъ дѣлитъ безплодіе на первичное и послѣдовательное, постоянное и относительное, опредѣляетъ частоту безплодія и указываетъ на необходимость въ каждомъ случаѣ жалобы женщины на безплодіе исключать безплодіе мужчины. Много мѣста отведено въ статьѣ вопросу объ оплодотвореніи. Авторъ разсматриваетъ 1) безплодіе, какъ слѣдствіе неправильнаго развитія и поступленія яичка въ матку, 2) безплодіе, какъ слѣдствіе непоступленія мужского сѣмени въ дѣтородные органы женщины и 3) безплодіе, какъ слѣдствіе непригодности матки для дальнѣйшаго развитія оплодотвореннаго яичка. Въ заключеніе статьи авторъ говоритъ о половой безчувственности женщины и о вредѣ искусственнаго безплодія.

*Н. Какуткинъ.*

46. **В. П. Скворкинъ.**—**Два случая эхинококка брюшной полости.**—(Медиц. Бесѣда. 1897 г. № 21, стр. 623).

1) Многорожавшая, 49 лѣтъ. Опухоль въ животѣ растетъ около 1½ лѣтъ. У пупка прощупывается очень подвижная опухоль съ апельсинъ, въ маломъ тазу выпячиваетъ лѣвый сводъ опухоль съ дѣтскую головку. Предположены кисты яичника. Чревосѣченіе показало, что это былъ эхинококкъ сальника, развившійся въ послѣднемъ въ видѣ многихъ разной величины опухолей. Отчасти отсѣчены вмѣстѣ съ тканью сальника, отчасти вылучены только болѣе или менѣе крупныя опухоли, изъ которыхъ одна во время операціи лопнула. Мѣсяцевъ черезъ 5 чревосѣченіе повторено, ибо у больной снова выросли въ животѣ опухоли. На этотъ разъ также изъ сальника удалено нѣсколько опухолей и одна изъ лѣвой фаллопиевой трубы. Всего за 2 раза удалено: 3 опухоли съ дѣтскую головку, 15 опухолей отъ грецкаго орѣха до гусиного яйца (всѣ 18 изъ сальника), 1 съ гусиное яйцо изъ подъ пристѣночной брюшины, 1—съ грецкій орѣхъ изъ фаллопиевой трубы. Больная поправилась. 2) Повторнорожав-