

ипая 26 лѣтъ. 8—9 мѣсяцевъ назадъ замѣтила у себя опухоль внизу живота и отсутствіе мѣсячныхъ. Правый сводъ выпяченъ опухолью съ голову взрослого. Предположена киста яичника. При чревосѣченіи оказалось, что опухоль исходитъ отчасти изъ правой фаллопѣевой трубы, отчасти изъ праваго яичника. При удаленіи ея она лопнула, что заставило автора дренажировать брюшную полость черезъ нижній уголъ раны. Больная выздоровѣла. Въ первомъ изъ описанныхъ случаевъ, гдѣ пришлось наблюдать брюшную полость черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ происшедшаго разрыва одной изъ эхинококковыхъ опухолей съ излітіемъ содержимаго на брюшину, авторъ съ нѣкоторой вѣроятностью исключаетъ эхинококковое зараженіе, потому что въ брюшной полости не было замѣтно свѣжихъ ростковъ эхинококка.

Н. Какушкинъ.

47. Д. Е. Гороховъ.—Къ казуистическѣмъ внѣматочной трубной беременности.—(Медиц. Обзор. 1897 г. ноябрь, с. 685).

Больная (возрастъ не обозначенъ) три раза рожавшая; послѣднія мѣсячныя—7 недѣль назадъ; шесть недѣль страдаетъ кровотеченіями. Матка размѣромъ съ 1½—мѣсячную беременную, слѣва прилегаетъ къ ней опухоль съ куриное яйцо, сзади—мягкая опухоль съ голову ребенка. Предположено: или внѣматочная беременность, или злокачественное новообразование. Чревосѣченіе. Въ брюшной полости и за маткой оказалось обширное кровоизліяніе; сгустки и жидкая кровь удалены. Сращенія тонкой кишки и сальника съ маткой разрушены. Ввиду парапериметрическихъ наслоевъ на маткѣ и сосѣдней тазовой брюшинѣ, кистознаго пораженія обоихъ яичниковъ и беременности лѣвой трубы, удалена матка съ придатками. Тазовая рана затампонирована іодоформной марлей, выведенной во влагалище; марля удалена на 5-й день послѣ операціи. Гладкое выздоровленіе.

Н. Какушкинъ.

48. Е. А. Ларинъ.—Случай кистовиднаго перерожденія лѣвой фаллопѣевой трубы съ папилломатозными разрастеніями внутри кистъ и на ихъ поверхности. Операція. Выздоровленіе.—(Военно-Медиц. Журналъ, Октябрь 1897 г. стр. 400).

У 22-лѣтней больной, послѣ удаленія громаднаго количества асцитической жидкости (больше трехъ ведеръ), обнаружено присутствіе въ лѣвомъ и заднемъ сводѣ двухъ опухолей, изъ которыхъ одна признана принадлежащей трубѣ, а другая заподоз-