

показало, что дно матки ушло на столько въ глубину, что указательнымъ пальцемъ, съ трудомъ могло быть достигаемо. На слѣдующій день, боли достигнувъ своего апогея и принявъ характеръ родовыхъ схватокъ, внезапно прекратились. При изслѣдованіи оказалось, что дно матки возвратилось на свое нормальное мѣсто, сама же матка, формою своею изображала колоколь, маточная же часть и губы вовсе отсутствовали, т. е. были сглажены, такъ что стѣнки рукава непосредственно переходили въ полость матки. Черезъ покровы живота дно матки прощупывалось на нормальномъ мѣстѣ. Послѣ четырехъ недѣльнаго лѣченія эрготиномъ и при исполнѣ еще открытомъ зѣвѣ, черезъ внутренній зѣвъ пальцемъ невозможно уже было проникнуть. Кольпейринтеръ былъ окончательно удаленъ. Двѣ недѣли спустя, больная съ исполнѣ сформировавшеюся влагалищною частью была выписана изъ больницы. Въ теченіе нѣсколькихъ послѣдующихъ лѣтъ, она рожала благополучно нѣсколько разъ.

Б. Полонскій.

26. Д-ръ Юсифъ Яворскій. Случай *hypertrophiae labii pendendi minoris*. (*Przegląd chirurgiczny*. Томъ II, книга II, 1894).

34 лѣтняя замужняя жевщина обратилась къ автору съ жалобами на затрудненное мочеиспускание, болѣзненность и жженіе въ половыхъ частяхъ. Coitus всегда сопровождается жестокими болями въ наружныхъ половыхъ частяхъ. При изслѣдованіи, авторъ нашелъ у больной чрезмѣрное увеличеніе лѣвой малой губы, длина которой $9\frac{1}{2}$ сантим., такъ что оттянутая кзади, она своимъ свободновисящимъ краемъ достигаетъ до заднепроходнаго отверстия. Кромѣ того на слизистой vulvae распознано vulvovaginitis catarrhalis follicularis, по устраненіи чего, авторъ ампутировалъ губу и больная выздоровѣла совершенно.

Б. Полонскій.

27. А. Карчевскій (въ Варшавѣ). Къ лѣченію гнилокровія. („*Przegląd chirurgiczny*“. Томъ II, кн. II, 1894. Стр. 285).

Многочисленность существующихъ общеизвѣстныхъ средствъ противъ развившагося уже гноекровія, указываетъ на ихъ ненадежность, и, примѣняются онѣ врачами, такъ сказать, скрѣпя сердце, одно за другимъ—въ большинствѣ случаевъ съ отрицательными результатами. Въ настоящее время, благодаря раціональной профилактики, въ сравнительно рѣдко встрѣчающихся случаяхъ этого заболѣванія, намъ всетаки приходится бороться съ нимъ тѣми-же, мало внушающими довѣрія средствами, какъ то: рвотными, про-