

4. **Dr. Touton.**—(Centr. f. Gynaek. № 2, 1897).—**О проявленіи (über Provokation) скрытыхъ гонококковъ.**

Указывая на нерѣдкое заболѣваніе женщинъ триперомъ вскорѣ послѣ свадьбы отъ мужей, имѣвшихъ скрытую гоноррею, *T.* рекомендуетъ у сомнительныхъ въ смыслѣ полного выздоровленія отъ гонорреи мужчинъ искусственно вызывать проявленіе гонорреи. Наилучшимъ средствомъ къ этому, по его мнѣнію, является впрыскиваніе въ уретру раствора лангиса или *argentamin'a* (0,05—0,1 : 200,0). Онъ отмѣчаетъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ этотъ взрывъ сопровождается довольно серьезными припадками, почему онъ допускаетъ ихъ примѣненіе лишь на уретрѣ мужчинъ и женщинъ, но никакъ не въ полости матки.

5. **M. Sänger.**—**Über vaginale Klemmen Hysterektomie.**—(Centr. f. Gynaek. № 3, 1897).—**О влагалищной экстирпации матки при помощи зажимовъ.**

На основаніи 44 операцій *Hysterektomiae et Hystero-Salpingo-Oophorectomiae*, произведенныхъ подъ рядъ безъ выбора случаевъ при исключительномъ примѣненіи способа съ зажимами (*Klemmenverfahrens*), *Sänger* производитъ критическую оцѣнку этого способа. Изъ указаннаго числа оперированныхъ умерло 6, причемъ особенно большую смертность дали міомы. (8 сл. 4 смерти). *S.* полагаетъ, что причиной такой высокой смертности при этомъ служитъ существованіе очень обширнаго сообщенія между влагалищемъ и полостью брюшины. По его мнѣнію, дренажъ дѣйствуетъ вреднымъ образомъ при здоровой брюшинѣ, способствуя инфекціи и интоксикаціи. Напротивъ, при нагноеніяхъ въ тазу примѣненіе дренажа дѣйствуетъ особенно благопріятно.

*S.* отмѣчаетъ, что способъ съ зажимами отличается большой легкостью, быстротой, точностью, которыя даютъ полное основаніе примѣненію этого способа. Однако и способъ съ лигатурами не можетъ быть устраненъ. Такимъ образомъ каждый изъ нихъ имѣетъ свои показанія. При тазовыхъ нагноеніяхъ, гдѣ имѣется показаніе къ дренированію, въ случаяхъ свѣжей инфекціи, далѣе, если лигатурный способъ представляетъ особенные трудности—долженъ примѣняться способъ съ зажимами. Напротивъ того, при міомахъ лучше примѣнять способъ съ лигатурами и лишь въ исключительныхъ случаяхъ, когда этотъ способъ оказывается недостаточнымъ или крайне труднымъ, прибѣгать къ способу съ зажимами.