

ность живота 109 снтм.). При чревосѣченіи оказалось, что матки у больной нѣтъ и слѣда. Ножка опухоли, толщиной въ мизинецъ, направляясь слѣва и сверху книзу и кнутри, постепенно теряется въ области лонной дуги. Тщательное микроскопическое изслѣдованіе ножки показало, что она состоитъ какъ-бы изъ двухъ параллельно идущихъ половинокъ; въ правой половинѣ имѣются зачатки полости, высланной цилиндрическимъ эпителиемъ (зачаточная полость однорогой зачаточной матки), въ лѣвой—лишь пучокъ соединительнотканыхъ волоконъ съ небольшимъ количествомъ мышечныхъ элементовъ. Съ опухолью сращена по всей своей длинѣ зачаточная правая фаллопиева труба. Опухоль оказалась принадлежащею правому яичнику; она удалена послѣ перевязки въ два пучка и перерѣзки ножки. Лѣвый яичникъ отсутствовалъ. Больная послѣ операціи выздоровѣла.

Н. Какучкинъ.

53. А. П. Браунштейнъ.—Къ фармакодинамикѣ *Stigma maidis* и *ustilago maidis*. Вліяніе ихъ на сократительность матки.—(Русскій Архивъ Патологіи, IV, вып. 3 (1897 г.), стр. 268).

Такъ какъ механизмъ маточныхъ сокращеній въ физиологическомъ смыслѣ остается еще невыясненнымъ, во взглядахъ на способъ дѣйствія различныхъ сокращающихъ лѣкарственныхъ веществъ на матку существуютъ большія разногласія: по мнѣнію однихъ, средства эти дѣйствуютъ на центры сокращеній матки, заложенные въ центральной нервной системѣ, по мнѣнію другихъ, они дѣйствуютъ чрезъ собственные центры матки, лежащіе въ стѣнкахъ ея, по третьимъ, дѣйствіе этихъ средствъ идетъ сосудодвигательнымъ путемъ. Авторъ произвелъ цѣлый рядъ опытовъ надъ кроличихами съ маисовой головней и съ маисовыми сушеными рыльцами. Вещество вводилось въ кровь черезъ яремную вену. Брюшная полость вскрывалась, чрезъ нее и отверстие въ заднемъ сводѣ вводилась стеклянная трубочка, сообщающаяся съ эластическимъ баллономъ, помѣщавшимся во влагалищѣ. Баллонъ и трубочка наполнялись водой и все вмѣстѣ сообщалось съ *Marey*'евскимъ приборомъ. Опыты привели автора къ заключенію, что *Stigmata maydis* дѣйствуютъ на матку сосудодвигательнымъ путемъ, а *ustilago maydis* путемъ дѣйствія на самые перво-мышечные элементы матки. Клиническія наблюденія автора надъ *ustilago maydis* (по 30—40 капель *extracti fluidi*) показали, что это средство замѣтно усиливало схватки и уменьшало промежутки между послѣдними, какъ въ началѣ періода раскрытія, такъ и въ

самомъ періодѣ. *Stigmata maydis* авторъ рекомендуетъ при маточныхъ кровотеченіяхъ, въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ должно дѣйствовать исключительно путемъ вліянія на сосуды матки.

Н. Какушкинъ.

54. **К. П. Улезко-Строганова.**—Современное состояніе вопроса объ эклампсіи.—(Русскій Архивъ Патологіи, кл. Медицины и бактериологіи, Т. IV, вып. 3, 1897 г. стр. 343).

Авторъ дѣлаетъ обзоръ работъ русскихъ, французскихъ и нѣмецкихъ авторовъ приблизительно за послѣдніе 30—40 лѣтъ, главнымъ же образомъ за 80-е и 90-е годы. Въ первой главѣ онъ касается работъ, въ которыхъ защищалась уремическая теорія эклампсіи (*Frerichs, Spiegelberg, Boucharde, Riviere, Chamberlent* и др.); во второй главѣ идетъ рѣчь о паразитарной теоріи (*Dolérus, Blanc, A. Favre, Gerdes*), не подтвердившейся многими изслѣдователями (*Fehling, Döderlein, Chamberlent, Vossf* и др.); въ третьей перечисляются работы, касающіяся главнымъ образомъ тщательнаго изученія анатомическихъ измѣненій различныхъ органовъ при эклампсіи (*Jürgens, Klebs, Pilliet, Schmorl, Никифоровъ, Массенъ* и др.). Въ заключительной главѣ авторъ съ явной симпатіей становится на сторону изслѣдованій *Schmorl*'а показавшаго, что при эклампсіи, вслѣдствіе отравленія какимъ то кровесвертывающимъ веществомъ, происходитъ образованіе въ органахъ (главнымъ образомъ въ печени) большого количества тромбовъ съ обычными послѣдствіями ихъ. Источникомъ происхожденія этого общаго агента, свертывающаго кровь, надо считать дѣтское мѣсто, на изученіе котораго во всѣхъ отношеніяхъ должно быть обращено вниманіе дальнѣйшихъ изслѣдователей.

Н. Какушкинъ.

55. **В. П. Мосешвили.**—Сравнительное дѣйствіе жидкихъ экстрактовъ спорыньи, полученныхъ послѣ извлеченія петрольнымъ и этиловымъ эфирами, на сократительную способность матки.—(Вѣстн. Общ. Гигіены, Суд. и Практ. Медицины, 1897 г., июнь, стр. 17).

Не подлежитъ сомнѣнію, что терапевтическое вліяніе маточныхъ рожковъ зависитъ отъ присутствія въ нихъ *нѣсколькихъ* дѣйствующихъ началъ. Поэтому, при приготовленіи экстракта этого средства слѣдуетъ стараться, чтобы дѣйствующія начала переходили въ вытяжку по возможности въ большемъ количествѣ и неподвергались здѣсь разложенію. Послѣднее достигается обез-