

самомъ періодѣ. *Stigmata maydis* авторъ рекомендуєть при маточныхъ кровотеченихъ, въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ должно дѣйствовать исключительно путемъ вліянія на сосуды матки.

*H. Какушкинъ.*

54. К. П. Улезко-Строганова.—Современное состояніе вопроса обѣ эклампсіи.—(Русскій Архивъ Патологіи, кл. Медицины и бактеріологии, Т. IV, вып. 3, 1897 г. стр. 343).

Авторъ дѣлаетъ обзоръ работъ русскихъ, французскихъ и нѣмецкихъ авторовъ приблизительно за послѣдніе 30—40 лѣтъ, главнымъ же образомъ за 80-е и 90-е годы. Въ первой главѣ онъ касается работы, въ которыхъ защищалась уремическая теорія эклампсіи (*Frerichs, Spiegelberg, Bouchard, Riviere, Chamberlent* и др.); во второй главѣ идетъ рѣчь о паразитарной теоріи (*Doléris, Blanc, A. Favre, Gerdes*), не подтвердившейся многими изслѣдователями (*Fehling, Döderlein, Chamberlent, Voß* и др.); въ третьей перечисляются работы, касающіяся главнымъ образомъ тщательного изученія анатомическихъ измѣненій различныхъ органовъ при эклампсіи (*Jürgens, Klebs, Pilliet, Schmorl, Никифоровъ, Массенъ* и др.). Въ заключительной главѣ авторъ съ явной симпатіей становится на сторону изслѣдований *Schmorl* я показавшаго, что при эклампсіи, вслѣдствіе отравленія какимъ то кровесвертывающимъ веществомъ, происходитъ образованіе въ органахъ (главнымъ образомъ въ печени) большого количества тромбовъ съ обычными послѣдствіями ихъ. Источникомъ происхожденія этого общаго агента, свертывающаго кровь, надо считать дѣтское мѣсто, на изученіе котораго во всѣхъ отношеніяхъ должно быть обращено вниманіе дальнѣйшихъ изслѣдователей.

*H. Какушкинъ.*

55. В. П. Мосешвили.—Сравнительное дѣйствіе жидкихъ экстрактовъ спорынъи, полученныхъ послѣ извлечения петрольнымъ и этиловымъ эфирами, на сократительную способность матки.—(Вѣстн. Общ. Гигіиены, Суд. и Практ. Медицины, 1897 г., іюнь, стр. 17).

Не подлежитъ сомнѣнію, что терапевтическое вліяніе маточныхъ рожковъ зависитъ отъ присутствія въ нихъ *многолѣтнихъ* дѣйствующихъ началъ. Поэтому, при приготовленіи экстракта этого средства слѣдуетъ стараться, чтобы дѣйствующія начала переходили въ вытяжку по возможности въ большемъ количествѣ и неподвергались здѣсь разложенію. Послѣднее достигается обез-