

вергаются послѣоперационнымъ опасностямъ. *Döderlein* считаетъ показаннымъ примѣнять способъ съ лигатурами при обыкновенныхъ случаяхъ и только тогда, когда послѣдній не можетъ быть примѣненъ или очень труденъ—примѣняется способъ съ зажимами, особенно при удаленіи воспалительно измѣненныхъ половыхъ органовъ со сращеніями. Онъ видитъ въ примѣненіи зажимовъ новое обогащеніе нашей техники.

7. **Adolf. Calmann.**—(Centr. f. Gynaek. № 4, 1897 г.)—**Къ техники Alexander-Adam'овской операціи.**

Авторъ выступаетъ въ защиту вышеназванной операціи на основаніи 32 случаевъ, оперированныхъ въ госпиталѣ всѣхъ Святыхъ въ Бреславлѣ. Онъ утверждаетъ, что при нѣкоторомъ навыкѣ нахожденіе круглой связки не представляетъ особой трудности и что сила и крѣпость круглой связки значительно больше, чѣмъ требуется для удержанія матки въ нормальномъ положеніи. Паховой грыжи не можетъ образоваться въ связи съ операціей, если не будетъ нанесено раненія паховому каналу и наружному отверстию его. Что касается результатовъ этой операціи, то авторъ полагаетъ, что неудачи возможны лишь въ томъ случаѣ, если не получилось достаточно крѣпкого соединенія связки съ окружающими наружное паховое отверстие сухожильными пучками. Важное значеніе имѣетъ при этомъ способъ наложенія шва—перпендикулярнымъ швомъ связка очень часто можетъ быть перерѣзана или подвергнута некротизаціи, почему авторъ и совѣтуетъ наложеніе 3—5 швовъ, захватывающихъ связку по направленію ея длинной оси; равнымъ образомъ послѣ резекціи круглой связки, онъ соединяетъ концы ея подобнымъ-же однимъ швомъ. Операція производится слѣдующимъ образомъ: разрѣзъ въ направленіи пупартовой связки 3—4 сант. длиной черезъ кожу и поверхностную фасцію, отпрепарированіе наружнаго отверстия пахового канала, руководствуясь *Imlach*'овскими жировыми комочками, выдѣленіе круглой связки тупымъ способомъ (бойся: перевязки и ущемленія п. *pubendi externi* и *arteriae pudendae externae*), вытягиваніе круглой связки до появленія *process. vaginal. peritonei* въ наружномъ паховомъ кольцѣ, переходъ къ операціи на другой сторонѣ, затѣмъ резекція и шовъ катгутомъ.

Результаты, по словамъ *C.* превосходные, тѣмъ не менѣе не указано точно, какое время больныя оставались подъ наблюденіемъ.