

8. Dr. Westphal.—(Centr. f. Gynaek., № 4, 1897).—Случай выпадения прямой кишки, происшедшаго послѣ операціи ради полнаго выпаденія матки.

W. въ одномъ случаѣ очень значительнаго выпаденія матки, нижній конецъ котораго достигалъ середины бедра и величина равнялась дѣтской головкѣ, произвелъ сопро-perineorrhaphiam и ventrofixationem. Черезъ 2 недѣли послѣ выписки изъ больницы больная снова явилась, но уже съ выпаденіемъ прямой кишки около 14 сант. длины. Массажъ по *Thüre Brandt*'у далъ отрицательный результатъ и авторъ приступилъ къ операціи удаленія части прямой кишки. Кровотеченіе было при этомъ очень значительное, полость брюшины вскрыта, вырѣзанъ кусокъ около 13 сант. длины. Больная поправилась и въ теченіи 6-ти мѣсячнаго наблюденія была совершенно здорова.

9. M. Graefe.—(Centr. f. Gynaek., № 4, 1897).—Случай миксомы большой губы.

Миксомы вульвы встрѣчаются крайне рѣдко. Gr. нашелъ въ литературѣ только 3 случая, между тѣмъ какъ другія опухоли, особенно липомы, встрѣчаются нерѣдко. Случай Gr. слѣдующій: Больная I., 36 л., рожала 3 раза, послѣдній разъ 10 лѣтъ тому назадъ. Первые роды окончены щипцами. Пациентка всегда была здорова, но лѣтъ за 5 до операціи во время танцевъ внезапно почувствовала при напряженіи острую боль въ лѣвой половинѣ живота и въ лѣвой половинѣ наружныхъ половыхъ частей. Вскорѣ она замѣтила тамъ опухоль, которая постепенно увеличивалась и въ послѣднее время затрудняла хожденіе и особенно сидѣніе. 2 врача видѣвшіе больную приняли опухоль одинъ за hydrocele, другой за липому. Авторъ нашелъ у больной на лѣвой большой губѣ опухоль величиной съ кулакъ мужчины, полушарообразную, нѣсколько чувствительную къ давленію, которое ее не уменьшало. Она не была туго-эластична, но какъ будто содержала кишечникъ, тѣмъ не менѣе звукъ при перкуссіи получался тупой и вправить ее не удавалось, почему авторъ остановился на вѣроятномъ діагнозѣ ущемленной сальниковой грыжи, или липомы. Выдѣленіе опухоли изъ капсулы совершалось легко, но ножка ея шла далеко вверхъ, почему и была перерѣзана послѣ соответственной перевязки. Подъ микроскопомъ оказалось, что дѣло шло о чистой миксомѣ.

Авторъ отмѣчаетъ еще слѣдующую особенность клиническаго теченія этого заболѣванія: опухоль не увеличивалась передъ и