

во время мѣсячныхъ, а лишь послѣ послѣднихъ, уменьшаясь постепенно къ періоду ихъ появленія.

10. P. Müller.—(Centr. f. Gynaek., № 4, 1897).—Возраженіе на рефератъ Grüning'a о работѣ Kleinwächter'a: Къ вопросу о научныхъ занятіяхъ женщинъ.

Краткое указаніе на ошибочное заявленіе Grüning'a, будто-бы Müller принадлежитъ къ противникамъ медицинскаго образованія женщинъ. Напротивъ, онъ допускаетъ женщинъ къ изученію медицины, но не безусловно. Онъ указываетъ, что медицинскій факультетъ университета въ Бернѣ единогласно высказался въ пользу допущенія женщинъ къ научнымъ занятіямъ, отвѣчая на запросъ германскаго правительства.

11. Dr. H. Rose in Hamburg.—(Centr. f. Gynaek., № 5, 1897).—Новый способъ собиранія мочи отдѣльно для каждой почки у женщины.

Сущность способа Rose состоитъ въ томъ, что въ мочевой пузырь черезъ уретру вводятъ особое трубчатое зеркало, внутреннее отверстіе котораго приставляется къ пузырному отверстію мочеточника. Моча скопляется въ просвѣтѣ зеркала и удаляется шприцемъ для изслѣдованія. Форма зеркала напоминаетъ влагалищное зеркало Ферюссона, длина его отъ 7 до 9 сант., а діаметръ у внутренняго отверстія 1,2 сант. Зеркало снабжено поршнемъ для болѣе легкаго и бережнаго введенія въ мочевой пузырь, головка котораго проходитъ черезъ внутреннее отверстіе зеркала. Конечно послѣ введенія зеркала поршень удаляется. Собираніе мочи и введеніе зеркала производится лучше всего въ положеніи Тренделенбурга, при чемъ въ мочевой пузырь предварительно опорожненный отъ мочи, выпускается воздухъ растягивающій пузырь подобно тому, какъ влагалище растягивается воздухомъ при положеніи à la vache. Такимъ образомъ отдѣляемое другого мочеточника скопляется ниже зеркала и не смѣшивается съ его содержимымъ. Отверстія мочеточниковъ при вышеприведенномъ положеніи лежатъ болѣе высоко, чѣмъ другія части мочевого пузыря. Разстояніе отверстій мочеточниковъ отъ наружнаго отверстія мочеиспускательнаго канала около $5\frac{1}{2}$ сант. при данномъ положеніи. Преимущества этого способа по Rose слѣдующія:

1) Большая точность отдѣльнаго собиранія мочи каждой стороны безъ всякой опасности инфекціи.