

Въ заключеніе шиваютъ рану передней стѣнки влагалища. Авторъ накладываетъ обыкновенно непрерывный шовъ, только при большомъ натяженіи родъ матрацнаго шва. Матеріалъ формалиновый кетгутъ. Анатомическое основаніе такого рода операціи *Gersuny* видить въ слѣдующемъ: при нормальныхъ отношеніяхъ мочевой пузырь покоится на той части тазовой кѣлѣчатки, которая образуетъ *Septum vesico-vaginale* направляясь къ срединѣ отъ внутренней стѣнки костнаго таза. Вслѣдствіе растяженія или разрыва этой соединительной ткани мочевой пузырь теряетъ свою опору и спускается во влагалище, какъ бы черезъ грыжевое отверстіе. При указанномъ зашиваніи это расхожденіе или разрывъ устраняются и положеніе пузыря дѣлается нормальнымъ.

16. **Ludwig Pincus.**—(Cent. f. Gynaek. № 7, 1897).—**Примѣненіе пара въ терапіи пугриднаго аборта.**

Авторъ, какъ извѣстно, уже ранѣе высказывался въ пользу примѣненія пара при лѣченіи пугридныхъ эндометритовъ. Онъ примѣнилъ его въ 10 случаяхъ пугриднаго аборта, причемъ въ 5 случаяхъ температура тотчасъ упала до нормы, въ 2-хъ наблюдалось постепенное паденіе ея, въ остальныхъ же 3-хъ ова и ранѣе была нормальной. Онъ примѣняетъ паръ только въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѣтъ никакихъ осложненій въ придаткахъ матки.

Pincus даже утверждаетъ на основаніи своего опыта, что паръ представляетъ до извѣстной степени *specificum* въ лѣченіи пугриднаго эндометрита. Онъ думаетъ, что и въ лѣченіи неосложненныхъ пугридныхъ эндометритовъ онъ будетъ дѣйствовать также специфически.

17. **Dr. Alexander Rosner.**—(Cent. f. Gynaekolog. 8. 1897).—**Къ техникѣ дисцизіи наружнаго маточнаго зѣва.**

Стремясь устранить часто наблюдаемое сращеніе разрѣзанныхъ частей маточнаго зѣва послѣ дисцизіи, авторъ присоединяетъ къ этой операціи маленькую пластику, а именно вырѣзываетъ съ влагалищной части лоскутъ слизистой оболочки, достаточный для покрытія дна разрѣза. Отворачивая такимъ образомъ лоскутъ и прикладывая его на дно разрѣза, онъ пришиваетъ его однимъ стежкомъ со стороны цервикальнаго канала и дѣлаетъ не возможнымъ сращеніе разрѣзанныхъ частей губъ, (лучше дѣлать въ такихъ случаяхъ коническую эксцизію. (Реф).