

18. Prof. Dr. Mars.—(Centr. f. Gynaek. № 8, 1897).—**Къ расширенію наружнаго маточнаго зѣва по способу Rosner'a.**

Авторъ нѣсколько видоизмѣняетъ предложеніе Dr. Rosner'a въ отношеніи выбора мѣста изъ котораго берутся лоскуты, вставляемые въ дно раны. Онъ вырѣзалъ лоскутъ въ одномъ случаѣ въ томъ отдѣлѣ влагалищной части, гдѣ долженъ проходить разрѣзъ по наружной поверхности влагалищной части. Нельзя не согласиться что операція такимъ образомъ облегчается и шансы на приживленіе такого лоскута дѣлаются болѣе благоприятными.

19. Dr. Biermer in Bonn.—(Centr. f. Gynaek. № 9, 1897).—**Два случая грыжъ яичника.**

Въ началѣ авторъ сообщаетъ вкратцѣ литературныя данныя по этому вопросу, описываетъ затѣмъ 2 имъ наблюдавшихся случая и резюмируетъ современный взглядъ на этиологию, симптомы и лѣченіе этого заболѣванія. Въ первомъ случаѣ дѣло шло о 37 лѣтней женщинѣ, которая родила 4 раза и впервые замѣтила грыжевое выпячиваніе въ паховой области черезъ 2 года послѣ замужества. Первое время опухоль не давала никакихъ болѣзненныхъ явленій. 2 года спустя больная носила бандажъ съ хорошимъ успѣхомъ. Черезъ годъ бандажъ былъ снятъ и только спустя 6 лѣтъ снова появилась грыжа. Во время мѣсячныхъ она дѣлалась больше, твердѣла и давала непріятное болѣзненное ощущеніе. Во время беременности болѣзненности не наблюдалось; стулъ всегда нормальный. Вслѣдствіе болѣзненности больная обратилась въ клинику за оперативной помощью. При изслѣдованіи было констатировано: отсутствіе кишекъ въ грыжи, отсутствіе праваго яичника въ маломъ тазу, связь содержимаго грыжи съ половыми органами. Былъ поставленъ діагнозъ hydrocele ligam. rotundi или hernia inguinalis ovarii dextri. Грыжа не вправлялась. При операціи удаленъ кистовидно перерожденный яичникъ. Выздоровленіе.

Другой случай наблюдался у дѣвушки 26 л., которая впервые 4 г. т. назадъ замѣтила появленіе маленькой опухоли въ правой паховой области при напряженіи и танцахъ, причинявшей ей умѣренно-сильныя боли. Во время мѣсячныхъ опухоль припухала и боли усиливались. При изслѣдованіи констатирована опухоль миндалевидной формы у наружнаго пахово-го отверстія, дающая тупой звукъ при перкуссіи. Опухоль напоминала по формѣ яичникъ, къ чему склоняли и вышеприве-