

Въ большихъ родильныхъ домахъ авторъ рекомендуется применить вибрационный аппаратъ (напр. *Ewer'a*), такъ какъ при немъ достигается еще болѣе интенсивное дѣйствие.

**22. Johann Kalabin in Moskau.**—(Centr. f. Gynaecol., № 11, 1897).—**Къ вопросу о лѣченіи рака Chelidonio majore.**

Авторъ сообщаетъ одинъ случай лѣченія рака вышеозначеннымъ средствомъ съ отрицательнымъ результатомъ. Однако онъ отмѣчаетъ временное улучшеніе какъ общаго состоянія больной, такъ и нѣкоторыхъ мѣстныхъ явлений.

**23. Dr. Spörlin in Zwickan.**—(Centr. f. Gynaek., № 42, 1896).—**Случай внѣматочной беременности на 8-омъ мѣсяцѣ съ живымъ ребенкомъ.**

Означенный случай наблюдался у 36-лѣтней женщины; имѣвшей 6 нормальныхъ родовъ и одинъ выкидышъ. Гинекологическихъ и послѣродовыхъ заболѣваній не имѣла. Внѣматочная беременность на 3-емъ мѣсяцѣ дала картину разрыва плоднаго мѣшка съ сильношимъ коллапсомъ, тѣмъ не менѣе больная оправилась и развитіе беременности шло впередъ съ явленіями сильныхъ болей въ животѣ и улучшеніемъ общаго состоянія. Нѣкоторое время больная чувствовала движения ребенка, но передъ операцией ни субъективно, ни объективно жизнь ребенка, не могла быть констатирована. Боли и улучшенія общаго состоянія заставили приступить къ операциі на 8-омъ мѣсяцѣ.

При разрѣзѣ брюшныхъ стѣнокъ найдено сращеніе послѣднихъ—со стѣнкой плоднаго мѣшка, попытка къ отдѣленію вызвала очень сильное кровотеченіе, почему по вскрытии плоднаго мѣшка и удаленія его содержимаго было приступлено къ тампонадціи стерилизованнымъ газомъ и наложенію тугой повязки. Кровотеченіе остановилось. Больная постепенно оправилась. Плодъ 1200,0 вѣсомъ, 37 сант. длины. Умеръ на 2-ой день.

**24. Dr. Josef von Chrzanowski.**—(Centr. f. Gynaek., 42, 1897).—**Полный выворотъ матки.**

Авторъ описываетъ выворотъ матки у 55-лѣтней женщины, обусловленный развитіемъ фиброміомы *in fundo uteri*. Первоначально С. удалилъ міому, а черезъ три дня приступилъ къ ампутаціи