

Исторіи болѣзней.

№ 1. (По журналу 1895 г., № 935).

Степанида З., 24-хъ лѣтъ, второродящая, крѣпкаго тѣлосложенія, здоровая. Поступила въ Институтъ безъ водь и скоро родила. Продолжительность родовъ 2 ч. 15 м. Роды нормальные.

Послѣродовой периодъ.

- 1-й день. Общее состояніе хорошее. Матка плотная безболѣз-
ненная; выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны.
Утромъ $t^0=36.3$, р.=62; вечеромъ: $t^0=37.1$, р.=68.
- 2-й " Утр. $t^0=37$. р.=66. Состояніе по прежнему. Животъ
слегка вздутъ, нечувствителенъ. Не было стула: Ol.
ricini. Веч. $t^0=38$, р.=80.
- 3-й " Ночью прослабило. Утр. $t^0=36.9$, р.=76. Веч. $t^0=38.8$
р.=80. 12' ночи: $t^0=38$, р.=80.
- 4-й " У. $t^0=36.9$, р.=88. Чувствительности внизу живота
нѣтъ. Выдѣление кровянисто-слизистыя съ мутью и съ
запахомъ. 12' дня; $t^0=39$, р.=80. 4' д.: $t^0=39.3$,
р.=86. Переведена въ лазаретъ; 9' веч.: $t^0=39.1$,
р.=100.
- 5-й " У. $t^0=37.1$, р.=78. Матка средней величины, мягкая,
въ нормальномъ наклоненіи впередъ; ткань ея крово-
точива: при захватываніи пулевыми щипцами и при
введеніи въ полость ватныхъ шариковъ получалось
незначительное кровотеченіе. Своды свободны *) без-
болѣзненны. Выдѣленій много, гнойная съ примѣсью
крови и съ сильнымъ непріятнымъ запахомъ. 3' дня.
Тщательно вымыто влагалище, затѣмъ полость матки
промыта 1% растворомъ карболовой кислоты и затам-
понирована юдоформной марлей. Большій тампонъ
вложенъ въ рукавъ. Назначено 2 порошка secale cor-
nuta по 0.6 и ледъ на низъ живота 5' веч. $t^0=38.9$,
р.=82; 7' веч. $t^0=38.5$, р.=74. Болей нигдѣ нѣтъ.
Общее состояніе хорошее. 8 веч. Удалены тампоны,
которые пропитаны выдѣленіями измѣненными въ
цвѣтѣ и издающими сильный запахъ. На постельномъ
бѣльѣ тоже нѣсколько пятенъ. Матка промыта 1%
карболовымъ растворомъ и затампонирована юдоформ-
ной марлей.
- 6-й " У. $t^0=36.6$, р.=76. Общее состояніе хорошее. Ночью
больная чувствовала небольшую тяжесть въ животѣ.
Матка меньше и плотнѣе, выдѣленій меньше и съ
меньшимъ запахомъ 2' дня: $t^0=36.6$, р.=74; веч.

*) Выраженіемъ: „своды свободны“ мы для краткости обозначаемъ, что про-
шупываемые черезъ своды влагалища ткани и органы не представляютъ укло-
неній отъ нормы.

$t^0 = 36.7$. $p. = 72$. Въ виду хорошаго состоянія больной и норм. t^0 и пульса, оставлена безъ тампонації; назначены влагалищныя спринцованія *) и Pulv. secalis cornuti 0.3 № 2.

- 7-й день. У. $t^0 = 37$, $p. = 70$. 3' дня: небольшой ознобъ, $t^0 = 39.8$, $p. = 90$. Самочувствіе относительно хорошее. Матка дряблая, но безболѣзная; выдѣленій немного съ замѣтнымъ запахомъ. Вымыто влагалище, полость матки и рукавъ затампонированы іодоф. марлей. 7' веч. $t^0 = 39.5$, $p. = 72$. Удалены тампоны: пропитаны не цѣликомъ. Запахъ меньшій. Pulv. secalis 0.6; 12' ночи: $t^0 = 38$, $p. = 74$.
- 8-й „ У. $t^0 = 36.9$. $p. = 72$. Выдѣленій мало; запахъ едва замѣтный. Матка небольшая плотная подвижная безболѣзная. Своды свободны. Назначены влагалищные спринцованія. В. $t^0 = 37.6$, $p. = 80$.
- 9-й „ У. $t^0 = 36.6$, $p. = 66$. Состояніе хорошее. Выдѣленія безъ запаха. В. $t^0 = 36.8$, $p. = 66$.
- 10-й „ Утромъ $t^0 = 36.8$, $p. = 66$. Здорова.

Въ данномъ случаѣ первыя двѣ тампонаціи производились съ предварительнымъ промываніемъ матки. Послѣ второй тампонації, когда больная оставалась безъ тампоновъ въ продолженіе 6-го и половины 7-го дня, t^0 снова поднялась до 39.8 съ ознобомъ. Примѣненная тутъ-же тампонація понизила t^0 до нормы, и повышенія больше уже не повторялись. Больная черезъ десять дней явилась въ амбулаторію показаться: она чувствовала себя очень хорошо. Инволюція полового аппарата шла вполнѣ правильно. Какихъ либо ненормальныхъ выдѣленій, бѣлей больная не замѣчала.

№ 2. (№ 938).

Александра М. 35 лѣтъ, первородящая, среднаго сложенія, здоровая. Поступила въ Институтъ съ зѣвомъ открытымъ на 3 пальца; околоплодныя воды грязны. Беременность и роды нормальны; продолжительность родовъ 17 часовъ. Ruptura perinei 1-й степени. Швы.

Послѣ родовъ.

- 1-й день. У. $t^0 = 37.1$, $p. = 70$. Состояніе удовлетворительное; в. $t^0 = 37.1$, $p. = 60$.
- 2-й „ У. 37.4 , $p. = 74$; вѣч. $t^0 = 37^0$, $p. = 70$.
- 3-й „ У. $t^0 = 37.6$, $p. = 78$. Ссадины во входѣ въ рукавъ покрыты гноевиднымъ налетомъ. Ulcera puerperalia. Назначеніе: спринцовывать рукавъ и смазывать ссадины сулемовымъ вазелиномъ; вѣч. $t^0 = 36.9$, $p. = 74$.
- 4-й „ У. $t^0 = 37.4$, $p. = 80$; вѣч. $t^0 = 37.9$, $p. = 90$. Состояніе то-же.

*) Для спринцований рукава обыкновенно употреблялся растворъ сулемы $1/4000$, если къ его примѣненію не было особыхъ противопоказаній.

- 5-й день. У. $t^0 = 37.2$, р. = 74. Сняты швы: срединные разошлись и на ихъ мѣстѣ образовалась язвочка величиною съ горошину; смазана т-ра Iodi. Спринцовани; в. $t^0 = 37.9$, р. = 70.
- 6-й " У. $t^0 = 37.6$, р. = 88; в. $t^0 = 37.4$, р. = 80.
- 7-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 72; в. $t^0 = 36.9$, р. = 84.
- 8-й " У. $t^0 = 36.9$, р. = 80. Выдѣленія съ запахомъ; язвочка въ прежнемъ состояніи. Переведена въ лазаретъ. В. 36.9—60.
- 9-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 70. 4' дня: $t^0 = 38.4$, р. = 98; 8' веч. $t^0 = 38.7$, р. = 100; 12' ночи $t^0 = 38.9$, р. = 104.
- 10-й " У. 8 ч. $t^0 = 39^{\circ}$, р. = 98. Изслѣдованіе: шейка хорошо сформировалась; довольно глубокій надрывъ имѣется на лѣвой сторонѣ portionis vaginalis; нар. зѣвъ слегка открытъ. Тѣло матки небольшое, средней плотности, нечувствительное, въ нормальномъ наклоненіи впередъ. Своды свободны. Выдѣленія изъ полости матки мутныя съ запахомъ. *Endometritis*. На промежности несросшееся мѣсто оставило дефектъ, проникающій насквозь въ vestibulum. Рана чиста и покрыта свѣжими грануляціями; 12' дня: тампонациѣ и *Pulv. secalis* 0.3. № 2. 1' дня $t^0 = 38.9$, вечеромъ удалены тампоны, $t^0 = 38$, р. = 90.
- 11-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 86. Матка маленькая плотная; выдѣленія безъ запаха. Склейка на промежности разошлась; рана чиста. Самочувствіе хорошее; в. $t^0 = 37.5$; р. = 80.
- 12-й " У. $t^0 = 36.5$, р. = 60; веч. $t^0 = 37.5$, р. = 80.
- 13-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 72. Здорова. 4' дня: $t^0 = 37^{\circ}$; веч. $t^0 = 36.8$, р. = 70.

№ 3. (№ 944).

Авна Ш., 26 лѣтъ, второродящая, средняго тѣлосложенія, здоровая. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ 19' 45".

* Прослѣ родовъ.

- 1-й день. У. $t^0 = 37.2$, р. = 60; в. $t^0 = 36.7$, р. = 62. Небольшая чувствительность внизу живота при давленіи.
- 2-й " У. $t^0 = 36.5$, р. = 65; в. $t^0 = 37^{\circ}$, р. = 68.
- 3-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 68; в. $t^0 = 37^{\circ}$, р. = 68.
- 4-й " У. $t^0 = 38.5$, р. = 60; в. $t^0 = 38.5$, р. = 76. 12' ночи $t^0 = 37.7$, р. = 70. Матка болѣзнина при давленіи; выдѣленія съ запахомъ; влагалищная спиртованія 1/2000 суплемой.
- 5-й " У. $t^0 = 37.5$, р. = 60; в. $t^0 = 37.8$, р. = 70. Status idem. Переведена въ лазаретъ.

- 6-й день. У. $t^0 = 38$, р. = 76; выделения, взятые изъ полости матки, довольно обильны, кровянисто-гнойные, съ запахомъ. Матка небольшая, довольно плотная, чувствительная съ боковъ, въ норм. наклоненіи впередь. *Endometritis*. Тампонада и 2 пор. *secalis* по 0.6; ледъ на животъ. 4' дня $t^0 = 39.1$, р. = 84, 7' веч. $t^0 = 38^0$, р. = 68, 12' ночи $t^0 = 37.8$; веч. удалены тампоны.
- 7-й „ У. $t^0 = 39.1$, р. = 64. По словамъ больной ночью вышелъ довольно большой плотный темного цвѣта кусокъ (старый сгустокъ крови), издававшій сильный запахъ; в. $t^0 = 37.8$, р. = 80.
- 8-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 68. Чувствительность матки уменьшается; в. $t^0 = 36.4$, р. = 66. Спринцованиія.
- 9-й „ У. $t^0 = 36.7$, р. = 60; в. $t^0 = 36.8$, р. = 60. Выдѣленія безъ запаха. Матка безболѣзненна.
- 10-й „ У. $t^0 = 37.4$, р. = 58. Здорова.

Слѣдуетъ отмѣтить: 1) Вслѣдъ за тампонадой t^0 повысилась съ 38^0 до 39.1, но безъ озноба и при хорошемъ пульсѣ 84; t^0 къ вечеру понизилась до 37.8. 2) Вскорѣ за удаленіемъ тампона изъ полости матки вышелъ загнившій кровяной сгустокъ, который, видимо, долго оставался въ полости матки.

№ 4. (№ 998).

Татьяна А. 32-хъ лѣтъ, 5-мъ ребенкомъ, средняго тѣлосложенія. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ 22'. Окологрудничные воды грязны.

Послѣ родовъ:

- 1-й день. У. $t^0 = 36.8$, р. = 68; в. такъ-же.
- 2-й „ У. $t^0 = 37$, р. = 60; в. $t^0 = 37$, р. = 56.
- 3-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 60; в. $t^0 = 36.5$, р. = 68.
- 4-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 64; в. $t^0 = 36.8$, р. = 68. Ночью вышли небольшие сгустки.
- 5-й „ У. $t^0 = 37.8$, р. = 70. Легкая чувствительность у лѣваго края матки. Выдѣленія красно-бурыя съ запахомъ; в. $t^0 = 37.9$, р. = 80. Спринцованиія влагалища.
- 6-й „ У. $t^0 = 37.5$, р. = 84. Изслѣдованіе: въ наружномъ зѣвѣ торчить измѣненный кусокъ тонкихъ оболочекъ, который издаетъ сильный запахъ. *Retentio velamentorum. Endometritis*. Пинцетомъ удалены оболочки, матка вычищена ватными шариками и затампонирована юдо-формной марлей: $t^0 = 38.3$, веч. $t^0 = 39.6$, ночью 39.5, р. = 90. Удалены тампоны.
- 7-й „ У. $t^0 = 37.5$, р. = 76. Матка плотная подвижная нечувствительная. Выдѣленія съ сильнымъ запахомъ. Тампонада; веч. удалены тампоны; $t^0 = 38.5$, р. = 88.
- 8-й „ У. $t^0 = 37.3$, р. = 82⁰. 4' дня $t^0 = 38.5$, р. = 82. По обнаружениіи влагалищной части и раздвиганіи лопастей

зеркала Collin'a зъвъ слегка раскрылся и оттуда вылилось довольно большое количество густой кровянисто-гнойной жидкости съ рѣзкимъ запахомъ. *Lochiometra*. Тампонация. Веч. $t^0 = 38.1$, р. = 80. Ночью удалены тампоны.

- 9-й день: У. $t^0 = 37.1$, р. = 65. Выдѣленія безъ запаха. Матка маленькая плотная; в. $t^0 = 37$, р. = 68.
 10-й " У. $t^0 = 36.9$, р. = 65; в. $t^0 = 37.4$, р. = 76.
 11-й " $t^0 = 37^0$; р. = 70. Здорова.

№ 5. (№ 1046).

Марѣа А. 20-ти лѣтъ, второродящая. До и во время беременности страдала бѣлями ѳдкими и съ запахомъ. Роды нормальные. Продолжительность родовъ 9 часовъ. Передъ поступлениемъ въ Институтъ изслѣдована повитухой, которая разорвала ей пузырь. Воды грязныя.

Послѣ родовъ:

- 1-й день. У. $t^0 = 37.4$ р. = 58; в. $t^0 = 38.3$, р. = 60. Ночью былъ ознобъ.
 2-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 56. Выдѣленія гразнаго цвѣта съ запахомъ. Шейка матки у наружнаго зѣва покрыта желтовато-грязнымъ налетомъ, легко стирающимся ватными шариками; очищенная поверхность слегка кровоточить. *Endometritis*. Тампонация. 5' веч. $t^0 = 39$. Удалены тампоны; 8' веч. $t^0 = 39$, р. = 58; (? авт.); 12' ночи $t^0 = 39.1$.
 3-й " У. $t^0 = 38$, р. = 68. Шейка очистилась. Выдѣленій меньше, съ меньшимъ запахомъ. Матка нѣсколько уменьшилась. Тампонация. Самочувствіе удовлетворительное. т° веч. 39.2, р. = 80. Удалены тампоны.
 4-й " У. $t^0 = 37.5$, р. = 70. Выдѣленія грязны, съ запахомъ. Тампонация. 1' дня $t^0 = 37.8$; веч. удалены тампоны; $t^0 = 38^0$, р. = 78; 12' ночи $t^0 = 38.2$.
 5-й " У. $t^0 = 37.5$, р. = 80. Status idem. Тампонация; вечеромъ удалены тампоны, $t^0 = 38.5$, р. = 82.
 6-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 76. Выдѣленій меньше съ меньшимъ запахомъ. Тампонация; веч. $t^0 = 38.8$.
 7-й " У. $t^0 = 37.6$. Удалены тампоны. Влагалищная спринцовкія. 2' дня $t^0 = 38.3$; 8' веч. $t^0 = 38.5$, р. = 96.
 8-й " У. $t^0 = 37.9$, р. = 90; вѣч. $t^0 = 37.8$.
 9-й " У. $t^0 = 37$, р. = 82. Выдѣленія съ запахомъ, грязныя. Тампонация. 2' дня; $t^0 = 37.7$; веч. 38^0 . Удалены тампоны.
 10-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 60. Тампонация; веч. удалены тампоны; $t^0 = 37.8$.
 11-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 60. Выдѣленія значительно меньше пахнутъ. Тампонация; веч. $t^0 = 37.5$. Удалены тампоны.

- 12-й день. У. $t^0 = 37.3$, р. = 75; веч. $t^0 = 37$, р. = 72. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны. Матка плотная.
 13-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 70; веч. $t^0 = 37.5$, р. = 80.
 14-й " У. $t^0 = 36.7$, р. = 72. Здорова.

Слѣдуетъ отмѣтить въ данномъ случаѣ давнишнее страданіе, сопровождавшееся Ѣдкими бѣлями непрѣятнаго запаха: то, повидимому, былъ хронической эндометритъ (gonorrhoea?).

№ 6. (№ 1058).

Евдокія П. 21 года, первородящая. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ 7 часовъ. Околоплодныя воды грязны.

Послѣ родовъ.

- 1-й день. У. $t^0 = 37.5$, р. = 76; в. $t^0 = 37.5$, р. = 76.
 2-й " У. $t^0 = 37.5$, р. = 76; веч. ознообъ; $t^0 = 39.4$, р. = 95. Небольшая чувствительность матки. Выдѣленія съ небольшимъ запахомъ. Спринцованиемъ влагалища.
 3-й " У. $t^0 = 37.7$, р. = 36. Матка довольно большая. Въ полости—куски тонкихъ оболочекъ; выдѣленія съ запахомъ: *Retentio velamentorum et Endometritis*. Удалены остатки плевъ и матка промыта супеломой $1/4000$. 2' дня $t^0 = 39.2$, р. = 100. 8' веч. $t^0 = 39.6$, р. = 108.
 4-й " У. $t^0 = 39.6$, р. = 102. Матка промыта 2% растворомъ карб. кисл. Отдѣленія кровянисты со сгустками. 2 часа дня $t^0 = 39.1$; 8' веч. $t^0 = 40.4$, р. = 110.
 5-й " У. $t^0 = 38.2$, р. = 94. Матка промыта 2% растворомъ корб. кисл. Во время промыванія вышли пленки и кровянистая жидкость. Замѣтный запахъ выдѣленій. 2' дня $t^0 = 39.9$; 6' веч. $t^0 = 41.4$, р. = 128; 8' веч. $t^0 = 40.0$, р. = 116, 12' ночи $t^0 = 40.2$. Общая слабость. Вино, коньякъ.
 6-й " У. $t^0 = 39.4$, р. = 108. Тампонация. 2' дня $t^0 = 39.7$; веч. удалены тампоны, 8' веч. $t^0 = 40.9$, р. = 118, 12' ночи 40.2.
 7-й " У. $t^0 = 39^{\circ}$. Тампонация. 2' дня $t^0 = 39.5$, р. = 86; веч. удалены тампоны. $t^0 = 39.7$, р. = 90.
 8-й " У. $t^0 = 39.3$. Выдѣленія изъ матки густыя гноевидные, въ большомъ количествѣ и съ рѣзкимъ запахомъ. Тампонаций; вечеромъ удалены тампоны. 8' веч. $t^0 = 40.2$, р. = 100. 12' ночи $t^0 = 39.9$.
 9-й " У. $t^0 = 39^{\circ}$, р. = 90. Тампонаций, $t^0 = 38.8$; в. $t^0 = 39.1$, р. = 92. Удалены тампоны.
 10-й " У. $t^0 = 37.8$, р. = 82; 4' дня $t^0 = 39.9$, р. = 100. При надавливаніи на матку снаружи, изъ полости вылилось довольно большое количество желтовато-зеленаго густаго гноя съ рѣзкимъ запахомъ: *Lochiometra*. Полость матки промыта 2% карбол. к. и затампонирована. 8' веч. $t^0 = 39.5$, р. = 92; 11' ночи удалены тампоны.

11-й день. 8' у. $t^0 = 38.8$, р. = 100; 12' д. Выдѣленія того-же характера, что и раньше. Тампонація. 1' дня $t^0 = 38.3$, р. = 80. 9' веч. удалены тампоны, велѣдъ за которыми при надавлении на матку снаружи оттуда вылилось довольно большое количество густого гноя съ запахомъ. Новая тампонація. $t^0 = 39^0$, р. = 88. Общая слабость.

12-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 88. 11' у. Вынуты тампоны. Задержки выдѣленій въ полости нѣтъ. Тампонація. 2' дня: $t^0 = 37.3$, р. = 80. 6' веч. перемѣнены тампоны. 8' веч. $t^0 = 38.2$. Общее состояніе лучше.

13-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 80. Удалены тампоны. Выдѣленія значительно чище и запахъ едва замѣтенъ. Матка маленькая, плотная нечувствительная. Тампонація, $t^0 = 36.8$. Веч. удалены тампоны.

14-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 74. Спринцованиемъ рукава, secale. Веч. $t^0 = 37.4$, Р. = 80. Выдѣленія безъ запаха.

15-й " У. $t^0 = 36.9$, р. = 78. веч. $t^0 = 36.5$, р. = 65.

16-й " $t^0 = 36.7$. р. = 64. Здорова.

Слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что въ продолженіе трехъ дней, когда примѣнялись одни исключительно промыванія матки, t^0 рѣзко повышалась и дошла до 41.4^0 . Далѣе выдѣленія были очень густы, вслѣдствіе чего, можетъ быть, марля не въ состояніи была ихъ впитывать въ себя, отчего они и скоплялись позади тампона (11-й д.).

№ 7. (№ 1073).

Софья Б., 30 лѣтъ, 4-я беременность. Трудные роды: плоскій тазъ и безъ водъ; продолжительность родовъ 30 часовъ. Воды грязныи и съ запахомъ. Ручное отдѣленіе послѣда.

Послѣ родовъ.

1-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 74; веч. $t^0 = 37^0$, р. = 80.

2-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 60; веч. $t^0 = 38.8$, р. = 84. Выдѣленія съ запахомъ. Спринцованиемъ рукава.

3-й " У. $t^0 = 39^0$, р. = 94. 2' дня $t^0 = 39.8$. 8' веч. $t^0 = 39.5$; 12' ночи $t^0 = 39.3$, р. = 94.

4-й " У. $t^0 = 38.2$, р. = 86. Матка довольно большая, мягкая, нечувствительная, подвижная. Своды свободны. Выдѣленія грязно-бурыя, съ запахомъ. Большіе надрывы по сторонамъ влагалищной части, такъ что передняя и задняя губы отвисаютъ въ видѣ лоскутовъ. *Endometritis*. Тампонація. 2' дня $t^0 = 38.5$, р. = 70; веч. $t^0 = 39.2$, р. = 70. Удалены тампоны.

5-й " У. $t^0 = 38.7$, р. = 82. Тампонація. Веч. $t^0 = 39^0$, р. = 80. Удалены тампоны.

6-й " У. $t^0 = 38.6$, р. = 84. Тампонація. В. $t^0 = 38.2$, р. = 82. Удалены тампоны.

- 7-й день. У. $t^0 = 37.5$, р. = 86. Состояніе лучше. Выдѣленія съ меньшимъ запахомъ. Тампонація. 8' веч. $t^0 = 38.2$. Удалены тампоны.
- 8-й " У. $t^0 = 37.9$, р. = 82. Матка уменьшилась. Тампонація. $t^0 = 38$, р. = 80. 9' веч. $t^0 = 37^0$. Перетампонирована.
- 9-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 80. Тампонація. Веч. $t^0 = 37.4$, р. = 74. Удалены тампоны. Спринцованиі.
- 10-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 84, вech. $t^0 = 37^0$, р. = 82. Выдѣленій немногого, кровянисто-слизистыя, безъ запаха.
- 11-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 76, вech. $t^0 = 37^0$, р. = 74.
- 12-й " $t^0 = 36.8$, р. = 70. Здорова.

№ 8. (№ 1117).

Евдокія Г. 20 лѣтъ, первородящая. Беременность и роды нормальные. Продолжительность родовъ 14 ч.

Послѣ родовъ.

- 1-й день. У. $t^0 = 36.9$, р. = 56; вech. $t^0 = 37.3$, р. = 82.
- 2-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 75; вech. $t^0 = 37.1$, р. = 80.
- 3-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 75; вech. $t^0 = 37.5$, р. = 86.
- 4-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 80. Выдѣленія гноинага. Веч. $t^0 = 37.9$, р. = 90. 12' ночи $t^0 = 36.6$.
- 5-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 88; вech. $t^0 = 37.5$, р. = 78. Status idem. Спринцованиія рукава.
- 6-й " У. $t^0 = 37.3$, р. = 84. Матка средней величины, дряблная, нечувствительная, зѣвъ свободно пропускаетъ два пальца; въ полости матки значительный кусокъ послѣда, который пальцемъ отѣленъ и удаленъ изъ полости. Своды свободны. Выдѣленія съ запахомъ, гноевидныя. *Retentio Placentae et Endometritis*. Матка промыта 2% растворомъ карб. к.; вech. $t^0 = 36.8$, р. = 90.
- 7-й " У. $t^0 = 38.7$, р. = 110. Выдѣленій мало, гноинага, съ запахомъ. Матка промыта. В. $t^0 = 38.5$, р. = 100.
- 8-й " У. $t^0 = 38.1$, р. = 110; вech. $t^0 = 38.5$, р. = 104. Переvedena въ лазаретъ.
- 9-й " У. $t^0 = 36.9$, 4' дня $t^0 = 39.3$, р. = 110. Матка дряблная въ положеніи retroversio. Изъ полости ея выдѣляется густая желто-зеленая гноинага жидкость съ сильнымъ запахомъ. Тампонація. $t^0 = 38.8$, р. = 100.
- 10-й " У. $t^0 = 38.1$, р. = 90. Выдѣленія съ меньшимъ запахомъ. Перемѣнены тампоны. $t^0 = 37.7$, р. = 96; 4' дня $t^0 = 38.6$, р. = 104; вech. перемѣнены тампоны. $t^0 = 38.2$.
- 11-й " У. $t^0 = 37.5$, р. = 80. Перемѣнены тампоны; 3' дня $t^0 = 37.4$, 8' веч. $t^0 = 37.3$, р. = 82. Удалены тампоны, безъ запаха.
- 12-й " У. $t^0 = 37.2$. Состояніе удовлетворительное. Веч. $t^0 = 37.4$, р. = 84.
- 13-й " У. $t^0 = 37$, р. = 60. Здорова.

Въ данномъ случаѣ тампонація производилась не юдоформной марлей, а стериллизованной, для чистоты наблюденій. Какъ тампоны, по ихъ удаленіи изъ матки, такъ и выдѣленія издавали болѣе рѣзкій запахъ, чѣмъ при употребленіи юдоформной марли.

№ 9. (№ 1123).

Домника М. 31 года, первородящая. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ 16' 20''. Послѣдъ выжать по *Credé*. Оторвавшіяся тонкія оболочки удалены рукой; часть ихъ осталась внутри матки.

Послѣ родовъ.

- 1-й день. У. $t^0 = 36.6$, р. = 88; в. $t^0 = 37^0$, р. = 86.
- 2-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 90; в. $t^0 = 37.5$, р. = 80.
- 3-й " У. $t^0 = 37.5$, р. = 80. Выдѣленія съ небольшимъ запахомъ, в. $t^0 = 37.5$, р. = 80.
- 4-й " У. $t^0 = 37.5$, р. = 86. Въ полости матки, у дна—куски тонкихъ оболочекъ, которые издаются небольшой запахъ. Выдѣленія съ тѣмъ-же запахомъ, краснобурыя: *Retentio velamentorum et Endometritis levis*. Пальцемъ удалены оболочки. Влагалищная спринцованія; в. $t^0 = 37.7$, р. = 84.
- 5-й " У. $t^0 = 37.9$, р. = 90. Выдѣленія по прежнему. Тампонація; в. $t^0 = 37.9$, р. = 80. Перемѣнены тампоны.
- 6-й " У. $t^0 = 37.6$, р. = 96. Перемѣнены тампоны. Выдѣленія съ меньшимъ запахомъ, в. $t^0 = 37.1$, р. = 82.
- 7-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 100. Удалены тампоны (они лежали въ маткѣ 24 часа): пропитаны насквозь; выдѣленія черезъ нихъ просочились наружу (на простыню); запахъ небольшой. Матка плотная нечувствительная. В. $t^0 = 37.5$, р. = 92.
- 8-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 94. Выдѣленія еще съ запахомъ. Тампонація. Веч. $t^0 = 37.5$, р. = 88. Удалены тампоны.
- 9-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 86. Выдѣленія еще съ небольшимъ запахомъ. Тампонація; в. $t^0 = 37.5$, р. = 88. Удалены тампоны.
- 10-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 90. Выдѣленія слизистая безъ запаха; в. $t^0 = 37^0$, р. = 88.
- 11-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 84, веч. $t^0 = 37.4$, р. = 90. Матка маленькая плотная, безболѣзненная. Выдѣленія нормальны.
- 12-й " $t^0 = 37.3$, р. = 88. Здорова.

Третій тампонъ оставался въ полости матки цѣлые сутки, не вызывая ни повышенія t -ы, ни какихъ-либо другихъ непріятныхъ явлений; весь пропитавшись, онъ продолжалъ выводить отдѣленія наружу, на простыню.

№ 10. (№ 1131).

Александра К. 17 лѣтъ, первородящая. Беременность нормальная. Воды прошли при зѣвѣ открытомъ на 2 пальца. Продолжительность родовъ 36 часовъ.

Послѣ родовъ.

- 1-й день. У. $t^0 = 36.5$, р. = 72; веч. $t^0 = 37.2$, р. = 62.
 2-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 64; в. $t^0 = 36.5$, р. = 66.
 3-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 70; в. $t^0 = 37.4$, р. = 64.
 4-й " У. $t^0 = 36.7$, р. = 64; в. $t^0 = 37.4$, р. = 68.
 5-й " У. $t^0 = 36.9$, р. = 64; в. $t^0 = 37.6$, р. = 66.
 6-й " У. $t^0 = 37.5$, р. = 68; в. $t^0 = 38.1$, р. = 82.
 7-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 84. Выдѣленія мутныя, съ небольшимъ запахомъ; в. $t^0 = 38.1$, р. = 86. *Endometritis*.
 8-й " У. $t^0 = 37.8$, р. = 84. Матка довольно плотная безболѣзненная. Выдѣленія бурыя съ запахомъ.
 Матка промыта 1% борнымъ растворомъ. 3' дня $t^0 = 38.8$, р. = 98; веч. $t^0 = 38.8$, р. = 92. Вечеромъ въ 9' часовъ тампонація.
 9-й " У. $t^0 = 38.2$, р. = 88. Тампоны пропитаны; выдѣленія также на подкладной простынѣ. По удалениіи тампоновъ изъ полости матки вылилась зловонная бурая жидкость. Тампонація; 3' дня: $t^0 = 38.3$; веч. 38.1. Тампонація.
 10-й " У. $t^0 = 37.5$, р. = 80. Тампоны пропитаны, съ сильнымъ запахомъ. Тампонація; 2' дня $t^0 = 37.8$, р. = 82; веч. $t^0 = 38.1$, р. = 84. Удалены тампоны.
 11-й " У. $t^0 = 38.1$, р. = 76. Запахъ значительно меньшій. Тампонація. 12' дня $t^0 = 37.8$, веч. $t^0 = 37.5$. Тампонація.
 12-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 70. Удалены тампоны; запаха нѣтъ; в. $t^0 = 37.4$, р. = 68.
 13-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 68. Выдѣленія по цвѣту нормальны, безъ запаха.

№ 11. (1169).

Марія В. 23 лѣтъ, второродящая. Послѣ первыхъ родовъ долго страдала бѣлями; кашель: bronchitis chronica. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ 9 часовъ. Околоплодная воды грязны.

- 1-й день. У. $t^0 = 37$, р. = 70; в. $t^0 = 37.8$, р. = 80. Сильное малокровіе, отеки ногъ; въ мочѣ бѣлокъ; молочная діета.
 2-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 86; в. $t^0 = 38.7$, р. = 96.
 3-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 90. Выдѣленія немнога, съ небольшимъ запахомъ; груди сильно нагрубаютъ; спринцовкія рукава борнымъ растворомъ; слабительная соль; в. $t^0 = 38.7$, р. = 94; озносы: ночью въ 12' потъ; $t^0 = 37.3$.

- 4-й день. У. $t^0 = 37.2$, р. = 90; выдѣленія съ запахомъ. Пере-
веденіа въ лазаретъ; в. $t^0 = 38.3$, р. = 120. *Edometritis*.
- 5-й " У. $t^0 = 37^{\circ}$, р. = 88; матка большая, дряблая, по-
движная нечувствительная; своды свободны; полость
матки большая, каналъ свободно проходимъ для пальца;
выдѣленія кровянисто-бурыя, съ запахомъ; в. $t^0 = 37.7$.
Тампонация.
- 6-й " У. $t^0 = 38.8$, р. = 92. Часть влагалищного тампона
вывалилась наружу; тампоны удалены; всѣ пропитаны
и съ запахомъ; новая тампонация; $t^0 = 39.8$, р. = 96; въ
правой грудной железѣ надъ околососковымъ круж-
комъ небольшое болѣзненное затвердѣніе; ледъ на
грудь; 8' веч. $t^0 = 40.7$, р. = 100; чувствительности
внизу живота нѣтъ; тампоны удалены; пропитаны
только частью; веч. $t^0 = 40.1$, р. = 100.
- 7-й " Матка небольшая, не совсѣмъ плотная, нечувстви-
тельная; выдѣленія, взятая на шарикѣ изъ рукава,
безъ запаха. У. $t^0 = 38.9$, р. = 120; небольшой ознобъ.
Припухлость и чувствительность правой груди; веч.
 $t^0 = 38.6$, р. = 96.
- 8-й " У. $t^0 = 37.8$, р. = 90; въ грудной железѣ болѣзнен-
ный узелъ величиною въ куриное яйцо; согрѣвающій
компрессъ на грудь. 2' дня $t^0 = 38.6$; в. $t^0 = 39.6$,
р. = 100. Суточное колич. мочи 1200 сс.
- 9-й " У. $t^0 = 38.6$, р. = 90. Матка мягкая, довольно боль-
шая, немного чувствительная. Своды свободны; послѣ
тищательного промыванія влагалища борнымъ раство-
ромъ, въ полость матки подъ контролемъ зеркала
введенъ маленький ватный шарикъ, который, проходя
внутренній зѣвъ, встрѣтилъ небольшое препятствіе.
Послѣ обратнаго выведенія шарика, отгуда вылилось
около 20 граммъ жидкой мутной кофейного цвѣта
жидкости, издававшей сильный непріятный запахъ.
Тампонация. На правой грудной железѣ краснота,
припухлость, повышенная мѣстная t^0 , болѣзненность.
Mastitis. 2' дня $t^0 = 40.1$, р. = 102; 5' веч. $t^0 = 39^{\circ}$;
тампонация; в. $t^0 = 39.8$, р. = 96.
- 10-й " У. $t^0 = 39.1$. Тампоны всѣ пропитаны, съ запахомъ;
перемѣнены тампоны; 2' дня $t^0 = 39.4$, р. = 98; веч.
перемѣнены тампоны; $t^0 = 39.6$, р. = 96.
- 11-й " У. $t^0 = 38^{\circ}$. По удаленіи тампоновъ изъ полости матки
выдѣлилось довольно много пѣнистой кофейного цвѣта
жидкости съ сильнымъ запахомъ. Корнцангомъ и вна-
чалѣ шариками удалось оттуда извлечь кусочки сильно
измѣненной ткани (оболочки?). Тампонация. Въ пра-
вой подмышечной области—припухшая болѣзненная
железа; 8' в. $t^0 = 39^{\circ}$, р. = 90. Удалены тампоны;
12' н. $t^0 = 38.7$.

- 12-й день. У. $t^0 = 38^0$, р. = 92. Изъ полости матки выдѣлился сначала густой зеленовато-желтый гной, затѣмъ прозрачная кофейного цвета жидкость. Обслѣдована полость матки пальцемъ: на передней стѣнкѣ выпячиваніе—мѣсто прикрепленія послѣда. На задней стѣнкѣ у дна рыхлый массы; корицантомъ удалены эти массы, которые оказались сильно измѣненными и съ крайне рѣзкимъ запахомъ. Тампонація; 2' дня $t^0 = 38.2$, р. = 88; веч. $t^0 = 39.7$, р. = 114. Перемѣнены тампоны; 12' н. $t^0 = 37.6$, р. = 100.
- 13-й „ У. $t^0 = 37.4$, р. = 100; 12' д. удалены тампоны: запахъ значительно меньшій. Тампонація. 2' д. 37.9 ; веч. удалены тампоны; $t^0 = 38.5$, р. = 100; въ грудной железѣ зыбленіе.
- 14-й „ У. $t^0 = 37^0$. Выдѣленія слизистыя слегка окрашенныя, безъ запаха; 2' дня $t^0 = 37.6$; в. $t^0 = 37.5$, р. = 86.
- 15-й „ У. $t^0 = 37^0$, р. = 94. Со стороны половыхъ органовъ ничего ненормального; в. $t^0 = 38.5$, р. = 100.
- 16-й „ У. $t^0 = 38^0$. Выдѣленія изъ рукава и полости матки нормальны. Грудь краснѣе и зыбленіе яснѣе.

1) Въ данномъ случаѣ имѣлись два процесса: со стороны правой грудной железы и со стороны слизистой оболочки матки; поэтому о теченіи эндометрита можно судить только по мѣстнымъ явленіямъ. Шокуда въ полости матки оставались загнившіе куски измѣненной ткани, выдѣленія продолжали оставаться гноевидными и съ очень рѣзкимъ запахомъ. По удаленіи этой загнившей ткани, выдѣленія быстро стали нормальныя.

2) Далѣе слѣдуетъ отмѣтить, что нормальная по виду выдѣленія, взятая изъ влагалища, не исключаютъ возможности существованія эндометрита, какъ это было на 9-й день, когда имѣлась lochiometra вслѣдствіе съуженія внутренняго зѣва (также и закупорки его густымъ секретомъ).

Послѣ вскрытия разрѣзомъ нарыва въ грудной железѣ болѣная поправилась.

№ 12. (1229).

Шелагея Н. 32 лѣтъ, 3-я беременность. Прежнія и настоящая беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ 3 часа.

Послѣ родовъ.

- 1-й день. У. $t^0 = 37.2$, р. = 68; в. $t^0 = 36.7$, р. = 78.
 2-й „ У. $t^0 = 37.1$, р. = 72; в. $t^0 = 37.5$, р. = 76.
 3-й „ У. $t^0 = 36.9$, р. = 74; в. $t^0 = 37.3$, р. = 74.
 4-й „ У. $t^0 = 37.1$, р. = 74; в. $t^0 = 37.4$, р. = 76.
 5-й „ У. $t^0 = 36.9$, р. = 76; в. $t^0 = 37.8$, р. = 66.
 6-й „ У. $t^0 = 37.1$, р. = 64; в. $t^0 = 37.8$, р. = 68.
 7-й „ У. $t^0 = 37.6$, р. = 64; в. $t^0 = 38.5$, р. = 78.

- 8-й день. У. $t^0 = 38.5$, р. = 82; в. $t^0 = 40^0$, р. = 108. Днемъ былъ ознобъ; 12' ночи $t^0 = 38.9$.
- 9-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 80. Матка въ положеніи retroversio, довольно большая, средней плотности, немного чувствительная. Съ правой стороны матки также небольшая чувствительность. Въ лѣвомъ сводѣ рубцовое напряженіе. Полость матки довольно большая. Выдѣленія темнобураго цвѣта съ небольшими пленочками (отпадающая оболочка?), и съ небольшимъ запахомъ. *Endometritis*. Тампонация, 12' дня $t^0 = 37.1$; 8' веч. $t^0 = 37.5$, р. = 80. Удалены тампоны и новая тампонация, $t^0 = 36.7$.
- 10-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 70. Удалены тампоны: пропитаны насквозь и на внутреннемъ концѣ маточного тампона имѣются небольшіе измѣненные кусочки тканей; запахъ небольшой. Тампонация; 2' дня $t^0 = 37.1$; веч. $t^0 = 38.7$, р. = 82. Выдѣленія прошли сквозь тампоны на простыню. Удалены тампоны; 12' н. $t^0 = 38$, р. = 80.
- 11-й " $t^0 = 38^0$. Задержка въ полости матки темнобурыхъ густоватыхъ съ небольшимъ запахомъ выдѣленій. Тампонация; 2' дня $t^0 = 38^0$; веч. $t^0 = 39.2$, р. = 84. Премѣнены тампоны. 11' в. $t^0 = 37.8$.
- 12-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 60. Тампонация. 12' дня $t^0 = 37.3$; веч. $t^0 = 38.5$. 11' ночи $t^0 = 37.4$. Удалены тампоны.
- 13-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 80. Выдѣленія свѣтлобурыя безъ запаха. Тампонация; веч. $t^0 = 37^0$, р. = 68. Удалены тампоны.
- 14-й " У. $t^0 = 36.4$, р. = 60. Выдѣленія нормальны. Матка маленькая безболѣзnenна; в. $t^0 = 36.5$, р. = 68.
- 15-й " У. $t^0 = 36.4$, р. = 65; в. $t^0 = 37^0$.
- 16-й " $t^0 = 36.5$. Здорова.

№ 13. (№ 1231).

Гликерія Н. 18 лѣтъ, первородящая, крѣпкаго сложенія. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ 13 час. Послѣ родовъ.

- 1-й день. У. $t^0 = 37$, р. = 66; в. $t^0 = 36.5$, р. = 60.
- 2-й " У. $t^0 = 36.5$, р. = 76; в. $t^0 = 37.6$, р. = 74.
- 3-й " У. $t^0 = 37.6$, р. = 74; в. $t^0 = 39$, р. = 80.
- 4-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 78. Матка болѣзnenна; выдѣленія съ запахомъ. Ночью вышли кровяные сгустки и оболочки. Чувствительность съ лѣвой стороны матки. В. $t^0 = 39.1$, р. = 84.
- 5-й " У. $t^0 = 37.6$, р. = 86. Матка средней величины и плотности въ антеградиссии. Чувствительность у дна и въ боковыхъ сводахъ. Небольшіе надрывы на влагалищной части. Выдѣленій не много, слизисто-кровя-

- нисты съ примѣсью гноя и съ запахомъ. *Endometritis.*
 Тампонація. 12' дня. Ознобъ, $t^0 = 40^{\circ}$, р. = 120; 6' в.
 $t^0 = 40^{\circ}$, р. = 116. Удалены тампоны и замѣнены но-
 выми. 12' н. $t^0 = 39.3$.
- 6-й день. У. $t^0 = 38.8$, р. = 108. Новая тампонація. 1' дня
 $t^0 = 38.9$; в. $t^0 = 38.7$, р. = 98. Удалены тампоны, за-
 пахъ ? $t^0 = 37.3$.
- 7-й „ У. $t^0 = 36.4$. Выдѣленія съ небольшимъ запахомъ.
 Чувствительность внизу живота исчезла. Тампонація.
 2' дня $t^0 = 37.2$, р. = 80; в. 37.6. Перемѣнены там-
 поны. 8' в. $t^0 = 38.5$, р. = 86.
- 8-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 68. Удалены тампоны; запаха нѣтъ.
 Матка маленькая, плотная, безболѣзнная. Своды
 свободны и нечувствительны. Общее состояніе хоро-
 шее. Веч. $t^0 = 37.1$.
- 9-й „ У. $t^0 = 37.4$, р. = 68; в. $t^0 = 36.8$, р. = 64.
- 10-й „ $t^0 = 36.5$. Здорова.

На 5-й день, послѣ первой тампонаціи получилось значительное
 повышеніе t^0 съ 37.6 до 40° , сопровождавшееся ознобомъ. Слѣ-
 дуетъ замѣтить, что непосредственно передъ этой первой тампо-
 націей, какъ то обыкновенно дѣжалось, было произведено тщательное
 бимануальное изслѣдованіе больныхъ и чувствительныхъ органовъ.

№ 14. (№ 1235).

Елена М. 19 лѣтъ, первородящая. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ 6'.

Послѣ родовъ.

- 1—5 дни. $t^0 = 36.7—37.1$, р. = 52—60; в. $t^0 = 36.9—37.3$, р. =
 52—78.
- 6-й день. У. $t^0 = 39^{\circ}$, р. = 96. Ночью были сильные схваткооб-
 разныя боли внизу живота. Матка болѣзенная при
 давлениі. Послѣ изслѣдованія, при влагалищномъ
 спринцованиі вышли куски плевъ. Пальцемъ изъ по-
 лости матки удалены еще такие-же куски. 1' дня
 $t^0 = 40$, р. = 100. 3' дня $t^0 = 39.9$. 6' веч.: Матка
 средней величины, вялая; наружный и внутренний
 зѣвы проходимы для пальца. Въ полости матки имѣются
 плевы, которыхъ тутъ-же удалены пальцемъ. Выдѣле-
 нія обильны, буро-красного цвѣта съ запахомъ. Дно
 матки и лѣвый сводъ болѣзnenны. *Retentio velamen-
 torum et Endometritis.* Тампонація. В. $t^0 = 38.9$, 11'
 ночи $t^0 = 38.5$, р. = 85.
- 7-й „ $t^0 = 38^{\circ}$, р. 84. Перемѣнены тампоны. 12' дня $t^0 =$
 37.3 , р. = 76, веч. $t^0 = 38.8$. Тампонація.
- 8-й „ $t^0 = 36.6$, р. = 86. Перемѣнены тампоны; они ока-
 зались насквозь пропитанными. Въ лѣвомъ сводѣ чув-
 ствительность значительно меньше. $t^0 = 37.4$, 8' веч.
 $t^0 = 39^{\circ}$, р. 94. Выдѣленія съ едва замѣтнымъ запа-
 хомъ. Оставлена безъ тампоновъ. $t^0 = 38^{\circ}$, р. = 82.

- 9-й день. У. $t^0 = 37.4$. Выдѣленія обильны, густыя, бураго цвѣта, запахъ? Тампонація. 2' дня $t^0 = 37.9$; в. $t^0 = 39^0$, р. = 96. Тампонація. 12' ночи $t^0 = 38.8$.
- 10-й " У. $t^0 = 37.5$. Тампонаы пропитаны, выдѣленія и на простынѣ. Позади тампоновъ въ маткѣ скоплениe зеленовато-буровой жидкости. Тампонація. 2' д. $t^0 = 38.1$ веч. $t^0 = 38.8$. Тампонація. $t^0 = 37.1$, р. = 70.
- 11-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 60. Тампонація. 12' дня $t^0 = 37.3$, веч. $t^0 = 37.5$, р. = 70. Тампонація. t^0 въ 12' н. 37.1.
- 12-й " У. $t^0 = 37^0$. Удалены тампонаы. Выдѣленія безъ запаха. Веч. $t^0 = 37.4$, р. = 64.
- 13-й " У. $t^0 = 36.4$. Шейка матки хорошо сформировалась, небольшая. Тѣло матки средней величины, мало подвижное, плотное, безболѣзменное, въ норм. наклоненіи впередъ. Въ лѣвомъ сводѣ рубцовое напряженіе слегка болѣзменное. Выдѣленія по цвѣту и запаху ^{нормальны}. 2' д. $t^0 = 37.2$, веч. $t^0 = 36.9$.
- 14-й " $t^0 = 37.2$.

Послѣ 4, 5 и 7 тампонацій (8-й, 9-й и 10 дни) замѣчалось постепенное повышение t^0 на 1.6—1.3⁰, но безъ ознобовъ и при относительно хорошемъ пульсѣ 94—96.

№ 15. (№ 1241).

Дарья М., 24-хъ лѣтъ, второродящая. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ 19 ч.

Послѣ родовъ:

- 1-й день. У. $t^0 = 36.8$, р. = 68; в. $t^0 = 37^0$, р. = 70.
- 2-й " У. $t^0 = 38^0$, р. = 70. Выдѣленія съ небольшимъ запахомъ. Веч. $t^0 = 38.5$, р. = 80. *Endometritis*.
- 3-й " У. $t^0 = 37.6$, р. = 72. Выдѣленія съ запахомъ. Переведена въ лазаретъ. В. $t^0 = 38^0$. Тампонація.
- 4-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 68. Матка большая, средней плотности, подвижная, нечувствительная. Своды свободны. Шейка плохо сформировалась. По обѣимъ сторонамъ наружного зѣва довольно большие рубцово-стянувшіеся старые надрывы. Выдѣленія съ запахомъ. Тампонація. 1' дня $t^0 = 37.8$; в. Тампонація. $t^0 = 38.2$, р. = 80. 12' ночи $t^0 = 37.3$.
- 5-й " У. $t^0 = 36.6$. Перемѣнены тампонаы. $t^0 = 36.5$, р. = 68. Веч. перемѣнены тампонаы. $t^0 = 36.9$, р. = 70.
- 6-й " У. $t^0 = 37.3$. Тампонація. $t^0 = 37.6$, р. = 74; в. удалены тампонаы при $t^0 = 37.2$; н. $t^0 = 36.4$.
- 7-й " У. $t^0 = 36.6$. Выдѣленія безъ запаха и нормального цвѣта. Здорова. В. $t^0 = 36.9$, р. = 70.
- 8-й " $t^0 = 37^0$.

№ 16. (39).

Наталья Г., 20 лѣтъ, первородящая. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ 13 ч.

Послѣ родовъ.

- 1-й день. У. $t^0 = 37.5$, р. = 70; в. $t^0 = 37.8$, р. = 74.
 2-й „ У. $t^0 = 37.1$, р. = 68. Выдѣленія съ запахомъ. Спринцованиемъ рукава; в. $t^0 = 38.5$, р. = 74.
 3-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 74; в. $t^0 = 38.5$, р. = 72.
 4-й „ У. $t^0 = 37.5$, р. = 92; в. $t^0 = 39.2$, р. = 95. Переведена въ лазаретъ.
 5-й „ У. $t^0 = 39.4$, р. = 98. Въ области задней спайки трещина, покрытая желтоватымъ налетомъ; вокругъ ткань отечна. На влагалищной части небольшіе надрывы съ такимъ-же налетомъ. Матка довольно большая, вялая, подвижная въ ретроверсіи. Выдѣленія кровянистые, мутные, съ запахомъ. *Ulcera puerper. et Endometritis.* Тампонация. $t^0 = 39.1$, р. = 92; в. $t^0 = 39.8$, р. = 78. Тампонация.
 6-й „ У. $t^0 = 37.5$, р. = 70. Шейка и рана у спайки очистились отъ налетовъ. Тампонация $t^0 = 38.2$, р. = 70; в. $t^0 = 38.5$, р. = 76. Перемѣнены тампоны.
 7-й „ У. $t^0 = 37^0$, р. = 60. Удалены тампоны. Выдѣленія безъ запаха. В. $t^0 = 37.6$, р. = 56.
 8-й „ У. $t^0 = 36.5$, р. = 56. На промежности отекъ значительно уменьшился; рана чиста. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны. Матка немного вялая. Secale; в. $t^0 = 36.8$, р. = 60.
 9-й „ У. $t^0 = 36.6$, р. = 60; в. $t^0 = 36.8$, р. = 64.
 10-й „ $t^0 = 36.5$. Здорова.

№ 17. (№ 41).

Прасковья Т., 20 лѣтъ, первая беременность. Послѣднія двѣ недѣли лихорадила. Abortus 4-хъ мѣсяцевъ. Продолжительность 17 часовъ. Въ послѣдовомъ періодѣ кровоточеніе. Ручное удаление послѣда.

Post abortum.

- 1-й день. У. $t^0 = 37.8$, р. = 74; веч. $t^0 = 38.5$, р. = 85. Выдѣленія кровянистые съ запахомъ.
 2-й „ У. $t^0 = 38.5$, р. = 86. Утромъ матка промыта растворомъ суплемы 1 : 4000. $t^0 = 39.5$, р. = 92. 2' дня $t^0 = 40^0$, р. = 100; веч. матка промыта 2% карбол. к. t^0 въ 8' веч. 40^0 , р. = 102. 12' ночи $t^0 = 39.9$, р. = 98. *Endometritis.*
 3-й „ У. $t^0 = 38.5$, р. = 100. Больная очень малокровна. Изъ матки вышли куски послѣда съ запахомъ. Матка промыта борной кислотой и вложены туда тампоны. В. $t^0 = 39.7$, р. = 110. Удалены тампоны.

4-й день. У. $t^0 = 37.6$, р. = 95. Матка шаровидная величиною въ апельсинъ, подвижная, слегка болѣзnenная, въ наклоненіи впередъ. Своды свободны. Шейка у наружнаго зѣва покрыта зеленоватымъ налетомъ. Выдѣленія бурыя съ сильнымъ запахомъ. $t^0 = 38.5$, р. = 96. Вычищена полость матки маленькими ватными шариками, при чемъ оттуда вышло довольно много кусковъ и хлопьевъ сильно измѣненной и съ рѣзкимъ запахомъ ткани. Тампонация. 7' веч. $t^0 = 40.1$, р. = 100. 11' ночи $t^0 = 39.5$. Больная жаловалась на схваткообразныя боли. Тампонация.

- 5-й " У. $t^0 = 38.7$, р. = 100. Спала хорошо, болей нѣть. Тампонация. 8' веч. $t^0 = 38.8$. Перемѣнены тампоны.
- 6-й " У. $t^0 = 38.4$, р. = 92. Тампонация (Выдѣленія съ сильнымъ запахомъ, бурыя); в. $t^0 = 39.5$, р. = 100 довольно полный. Больная ни на что не жалуется, кроме слабости. Мѣстныхъ болей нѣть. Тампонация. 11' у. $t^0 = 38.2$.
- 7-й " У. $t^0 = 37.7$, р. = 100. Тампонация (выдѣленія съ меньшимъ запахомъ); в. $t^0 = 37.7$, р. = 86. Удалены тампоны.
- 8-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 70. Общее состояніе хорошее. Выдѣленія съ небольшимъ запахомъ. Тампонация. В. $t^0 = 38.6$, р. = 90. Удалены тампоны.
- 9-й " У. $t^0 = 36.3$, р. = 72. Выдѣленія безъ запаха, небольшны. Матка плотная безболѣзnenная, t^0 веч. 37.1, р. = 80.
- 10-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 70; веч. $t^0 = 36.9$, р. = 70.
- 11-й " $t^0 = 36.5$, р. = 68. Здорова.

1) Продолжительность лихорадки до выкидыша, болѣзнь матки при давлениі, схваткообразныя боли—позволяютъ предположить, что воспалительный процессъ не ограничился одной слизистой оболочкой, а, проникши глубже, поразилъ и мышечную ткань (mesometritis). 2) Всѣ три промыванія матки, особенно первое, сопровождались рѣзкимъ повышеніемъ t^0 . 3) Изъ восьми тампонаций первая, пятая и, особенно замѣтно, восьмая тоже вызвали послѣдовательное повышение t^0 .

№ 18. (№ 53).

Каролина Л., 20 лѣтъ, первородящая, слабаго тѣлосложенія. Беременность нормальная. Во время родовъ: Perineotomy; швы. Продолжительность родовъ 15 часовъ.

Послѣ родовъ.

- 1-й день. У. $t^0 = 37.4$, р. = 72; в. $t^0 = 38^0$, р. = 76; 12' ночи $t^0 = 37.3$.
- 2-й " У. $t^0 = 36.4$, р. = 60; в. $t^0 = 36.9$, р. = 72.
- 3-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 80; в. $t^0 = 38.1$, р. = 86.

- 4-й день. У. $t^0 = 37.6$, р. = 98. Выдѣленія жидкаго, темнобурыя, съ запахомъ. 4' дня $t^0 = 39.6$, р. = 98; в. $t^0 = 38.9$, р. = 90.
- 5-й „ У. $t^0 = 37.5$, р. = 76. 4' дня $t^0 = 38.8$, р. = 92. Небольшая краснота и чувствительность по краямъ швовъ; послѣдніе въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разошлись. Выдѣленія изъ матки грязнобурыя съ сильнымъ запахомъ. Матка и своды по наружному изслѣдованию нечувствительны. *Ulcera puerperalia (Colpitis) et Endometritis*. Спринцованиемъ рукава, secale; в. $t^0 = 37.2$, р. = 80.
- 6-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 75. 12' дня $t^0 = 37.7$. Status idem. Въ виду хорошаго общаго состоянія больной и невозможности примѣненія внутриматочной терапіи безъ риска порвать защитную промежность, назначены одни влагалищныя спринцования; веч. $t^0 = 38.1$, р. = 80.
- 7-й „ У. $t^0 = 37^0$. 12' дня $t^0 = 38.3$, р. = 100. Сняты швы: большинство изъ нихъ выгноились; сращеніе получилось только мѣстами. Матка небольшая, довольно плотная, нечувствительная. На шейкѣ по обѣимъ сторонамъ разрывы. Выдѣленія довольно много, съ хлопьями, бурыя съ запахомъ. Матка промыта $1/2\%$ Lysol'омъ. 4' дня $t^0 = 38.7$, р. = 112; в. $t^0 = 37.8$, р. = 96.
- 8-й „ У. $t^0 = 37^0$, 12' дня $t^0 = 38^0$. Тѣло матки въ положеніи *retroversio*, довольно большое, нечувствительное. Выдѣленія грязныя съ запахомъ. Тампонадія. $t^0 = 37.7$, р. = 80; в. $t^0 = 37.6$. Тампонадія.
- 9-й „ У. $t^0 = 37^0$. 12' дня $t^0 = 37.8$. Тампонадія. 2' дня $t^0 = 37.7$; в. $t^0 = 37.8$. Удалены тампоны, безъ запаха.
- 10-й „ У. $t^0 = 37^0$; днемъ $t^0 = 36.5$; веч. $t^0 = 36.9$. Выдѣленія довольно обильны, безъ запаха. Рана чиста.
- 11-й „ У. $t^0 = 37^0$; днемъ $t^0 = 36.5$. Мѣсто разрѣза на промежности покрыто свѣжими, чистыми грануляціями. Матка маленькая плотная нечувствительная, въ нормальномъ наклоненіи впередъ. Своды свободны. Выдѣленія бѣловатыя безъ запаха. Общая слабость, малокровіе. $t^0 = 36.9$, р. = 72.
- 12-й „ $t^0 = 36.5$, р. = 70. Здорова.

№ 19. (№ 198).

Александра Х., 18 лѣтъ, первородящая. Доставлена изъ Александровской больницы, гдѣ хворала ревматизмомъ. $t^0 = 37.6$, р. = 70. Продолжительность родовъ = 26 часовъ. t^0 послѣ родовъ 38.3.

Послѣ родовъ.

1-й день. У. $t^0 = 38^0$, р. = 76, дых. = 26. Большая грибовидная разращенія на малыхъ губахъ и задней спайкѣ; та-кія-же разращенія меньшей величины въ рукавѣ.

- Condylomata acuminata*. Матка плотная, чувствительная у дна и по краямъ. Шейка не сформирована. Въ рукавѣ сгустки крови. Запахъ? Спринцованиемъ рукава Lysol'омъ; в. $t^0 = 38.3$, р. = 86, д. = 28.
- 2-й день. У. $t^0 = 38.5$, р. = 88, д. = 32. Языкъ сухой, животъ слегка вздути, кишечникъ переполненъ. Въ легкихъ сухие и влажные крупно-пузырчатые хрипы. Кашель. Матка большая, слегка болезненная. Выдѣленія цвѣта мясныхъ помоевъ, съ запахомъ. *Endometritis*. $t^0 = 38.2$, р. = 100. Матка промыта 2% растворомъ карб. к. t^0 въ 5' веч. 40^0 , р. = 120.—7' веч. Тампонациѣ. 8' $t^0 = 38.9$, р. = 100.
- 3-й " У. $t^0 = 38.2$, р. = 100. Тампонациѣ. Выдѣленія, пропитавши тампонъ, прошли на простыню. 1' дня $t^0 = 39^0$, р. = 90; веч. $t^0 = 39.8$, р. = 100. Больная жалуется на схваткообразные боли въ области матки. Запахъ выдѣленій значительно меньшій. Оставлена безъ тампоновъ.
- 4-й " У. $t^0 = 39.1$, р. = 98; веч. $t^0 = 39.8$, р. = 100 правильный, средняго наполненія.
- 5-й " У. $t^0 = 39^0$, р. = 96. Тампонациѣ. 12' дня $t^0 = 39.4$; 5' веч. $t^0 = 39^0$; 7' веч. $t^0 = 39.6$, р. = 96. Удалены тамponsы: не всѣ пропитаны. По извлечениіи тампона изъ полости матки вышелъ старый кровяной сгустокъ. Въ 10' веч. больную вырвало; жалуется на головную боль.
- 6-й " У. $t^0 = 39.4$, р. = 92. Матка уменьшилась, довольно плотная; шейка относительно сформировалась; выдѣленія скучны, бурогрязны, съ рѣзкимъ запахомъ. Тампонациѣ. 1' д. $t^0 = 39.3$, веч. $t^0 = 39.9$, р. = 100 довольно слабый, дикротический. Матка подвижная нечувствительная. Тамponsы мало пропитаны; на внутреннемъ концѣ кусочекъ приставшей, сильно измѣненной ткани, съ рѣзкимъ запахомъ. Самочувствіе помимо головной боли относительно хорошее. Тампонациѣ.
- 7-й " У. $t^0 = 39.3$, р. = 100. 11' у. $t^0 = 39^0$, р. = 100. Тамponsы мало пропитаны. Запахъ меньшій. Матка маленькая плотная подвижная нечувствительная. Тампонациѣ. 1' дня $t^0 = 39^0$, р. = 100. 2' 30" д. $t^0 = 40^0$ р. = 110. 5' веч. $t^0 = 39.8$. 8' веч. потрясающій ознобъ $t^0 = 40.1$, р. = 115. 9' веч. удалены тамponsы: почти не пропитаны; р. = 100. Тоны сердца чисты. Небольшая одышка. Матка плотная безболезненная. Своды свободны. Кашель; сухие хрипы. Кожа суха, горяча. DS. Phenacetini 0,3 и спринцованиемъ. Въ 12' ночи больная сильно потѣла. $t^0 = 37.7$, р. = 78.
- 8-й " У. $t^0 = 38.1$, р. = 100, легко сжимаемый. Выдѣленія, взятая изъ рукава, бурогрязны съ запахомъ; веч. въ 11' $t^0 = 39.6$, р. = 100.

- 9-й день. У. $t^0 = 39.4$, р. = 96. Выдѣленія въ значительномъ количествѣ, изъ рукава—съ запахомъ, изъ полости матки взятая на шарикахъ—безъ запаха. Матка и своды безболѣзны, нормальны. Въ рукавѣ небольшія экскоріаціи и сосочковыя разрѣщенія. Изслѣдованіе легкихъ: въ лѣвой половинѣ груди разсѣянные трескучіе хрипы. На правой сторонѣ въ области средней доли—притупленіе перкуторнаго звука, жесткое везикулярное дыханіе и чувствительность. *Fremitus pectoralis* усиленъ. Языкъ сухой, обложенъ, по краямъ красенъ. Сухія корки на губахъ. Дыханіе учащено = 32. Сухой кашель, при чѣмъ больная жалуется на колики въ правой сторонѣ груди. Тоны сердца глухи. Пульсъ легко сжимаемъ, учащенъ = 100. DS. Согрѣвающій компрессъ на грудь. *Jnfus. Digitalis 1.0 : 150.0 cum liqui. Kali acetici 30.0.* Вино; в. $t^0 = 39.6$, р. = 100. Спринцовывать.
- 10-й „ У. $t^0 = 39.4$, р. = 98. Status idem. В. $t^0 = 39.7$, р. = 100.
- 11-й „ У. $t^0 = 39.1$, р. = 98. Чувствуетъ себя лучше, t^0 вech. 38.2, р. = 76. Спринцованиѳ рукава.
- 12-й „ У. $t^0 = 37.8$, р. = 72. Наканунѣ почью потѣла. Кашель и боли значительно меньше. Матка въ anteflexi'и. Въ рукавѣ мало выдѣленій; изъ полости матки (на шарикахъ) довольно много желтыхъ гнойныхъ выдѣленій. Матка довольно плотная подвижная нечувствительная. Своды свободны. Вычищена полость матки шариками и тампонацией. в. $t^0 = 37.6$, 38.1; р. = 74. Тампонациѣ.
- 13-й „ У. $t^0 = 37.8$, 38.1, р. = 80. Тампонациѣ; в. $t^0 = 37.9$, 38.4, р. = 76. Тампонациѣ.
- 14-й „ У. $t^0 = 37.1$, р. = 70. Удалены тампоны. Выдѣленія изъ полости матки по цвѣту и запаху не предста- вляютъ уклоненій отъ нормы; в. $t^0 = 38$, 38.3, р. = 70, $t^0 = 37.5$.
- 15-й „ У. $t^0 = 37.4$, р. = 74. Общее состояніе удовлетворительное; в. $t^0 = 38.1$, р. = 74.
- 16-й „ У. $t^0 = 36.9$, р. = 76. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны. Кашель почти совсѣмъ прошелъ; вech. $t^0 = 39.3$ (?), р. = 80.
- 17-й „ У. $t^0 = 37$, р. = 74. Комбинированное изслѣдованіе ничего ненормального не обнаружило; в. $t^0 = 38.1$, р. = 90.
- 18-й „ У. $t^0 = 36.4$, р. = 72; в. $t^0 = 37.4$, р. = 78.
- 19-й „ У. $t^0 = 36.9$, р. = 72; в. $t^0 = 37.4$, р. = 74.
- 20-й „ У. $t^0 = 36.6$, р. = 74. Позволено встать; $t^0 = 37$, р. = 76.
- 21-й „ У. $t^0 = 37$, р. = 60; в. $t^0 = 37.1$, р. = 60.
- 22-й „ У. $t^0 = 36.5$, р. = 68; в. $t^0 = 36.6$, р. = 68.
- 23-й „ $t^0 = 37^0$, р. = 62. Здорова.

№ 20. (№ 207).

Лидія X., 4-е роды. Сильное кровотечение sub graviditate et partu. Тампонация влагалища съ цѣлью остановки кровотечения. При зѣвѣ, открывшемся больше чѣмъ на 2 пальца, въ виду продолжавшагося кровотечения и прекращенія сердечной дѣятельности плода (семимѣсячнаго), произведены perforatio предлежащей головки и извлеченіе плода. Ручное отдѣленіе послѣда. Разрывъ на передней губѣ влагалищной части матки. Тампонация матки и шейки; $t^0 = 38.6$.

Послѣ родовъ:

- 1-й день. В. $t^0 = 37.6$, р. = 92.
- 2-й „ У. $t^0 = 37.3$, р. = 94. Боли внизу живота; в. $t^0 = 37.3$, р. = 72.
- 3-й „ У. $t^0 = 37.4$, р. = 80; в. $t^0 = 37.8$, р. = 74. Вынуты тампоны: пропитаны и съ запахомъ.
- 4-й „ У. $t^0 = 37.7$, р. = 140. Выдѣленія буроватыя съ сильнымъ запахомъ. Endometritis; в. $t^0 = 37.8$, р. = 135, легковозбудимый. Спринцований борнымъ растворомъ.
- 5-й „ У. $t^0 = 37.3$, р. = 80; в. $t^0 = 37.9$, р. = 100.
- 6-й „ У. $t^0 = 38.6$, р. = 120. Больная ни на какія боли не жалуется, состояніе апатичное. Изъ матки вытекаетъ темнобурая съ рѣзкимъ запахомъ жидкость. Матка промыта борнымъ растворомъ сначала 24° R, а по-тому 6° R. Къ кровоточащимъ мѣстамъ на шейкѣ приложенъ тампонъ, не проникавшій въ полость матки; в. $t^0 = 39.1$, р. = 90. Удаленъ тампонъ. Переведена въ лазареть.
- 7-й „ У. $t^0 = 38$, р. = 114. Шейка сформирована, зѣвъ проходитъ для пальца. На передней губѣ справа небольшая трещина. Тѣло маленькое подвижное плотное безболѣзненное, въ нормальномъ наклоненіи впередъ. Своды свободны. Выдѣленія изъ матки чернобурыя съ рѣзкимъ запахомъ. Тампонация; в. $t^0 = 38.5$, р. = 110. Тампонадія.
- 8-й „ У. $t^0 = 37.9$, р. = 100. Удалены тампоны: пропитаны и съ запахомъ; в. $t^0 = 38.1$, р. = 84.
- 9-й „ У. $t^0 = 38$, р. = 86. Выдѣленія изъ матки бурыя съ запахомъ. Тампонация; в. $t^0 = 37.5$, р. = 96. Тампонадія.
- 10-й „ У. $t^0 = 37$, р. = 98. Тампонадія; в. $t^0 = 37.4$, р. = 80. Тампонадія.
- 11-й „ У. $t^0 = 37$. Выдѣленія безъ запаха. Оставлена безъ тампоновъ; в. $t^0 = 37$, р. = 80.
- 12-й „ У. $t^0 = 37.1$, р. = 88; в. $t^0 = 37.3$, р. = 96.
- 13-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 80; в. $t^0 = 36.9$, р. = 80. Халатъ.
- 14-й „ $t^0 = 36.6$, р. = 72; днемъ $t^0 = 37^{\circ}$, р. = 82. Здорова.

№ 21. (№ 284).

Анастасія В., 17 лѣтъ, первородящая. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ 18 часовъ.

Послѣ родовъ:

- 1-й день. У. $t^0 = 36.5$, р. = 65; в. $t^0 = 36.7$, р. = 64.
 2-й „ У. $t^0 = 36.5$, р. = 80; в. $t^0 = 37.6$, р. = 84.
 3-й „ У. $t^0 = 37$, р. = 80; в. $t^0 = 37.5$, р. = 82.
 4-й „ У. $t^0 = 37.7$, р. = 100. Матка довольно большая, нечувствительная. Выдѣленія съ запахомъ. *Endometritis*. *Secale* и спринцованиѣ; в. $t^0 = 38.8$, р. = 110.
 5-й „ У. $t^0 = 38.3$, р. = 100. 12' дня $t^0 = 38^{\circ}$. Матка промыта борнымъ растворомъ; $t^0 = 39.2$, р. = 106; веч. $t^0 = 38$, р. = 94.
 6-й „ У. $t^0 = 38.2$, р. = 90. Матка небольшая плотная нечувствительная, въ нормальному положеніи. Своды свободны. Выдѣленія мутные съ запахомъ. На лѣвой малой губѣ трещина. Тампонація. $t^0 = 37.6$, р. = 92; в. $t^0 = 37.8$, р. = 92. Тампонація.
 7-й „ У. $t^0 = 37.3$, р. = 90. Тампонація; $t^0 = 36.8$; в. $t^0 = 38$, р. = 90. Тампонація.
 8-й „ У. $t^0 = 37.5$, р. = 82. Тампонація; в. $t^0 = 37.1$, р. = 80. Тампонація.
 9-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 88. Матка небольшая плотная нечувствительная. Выдѣленія изъ матки безъ запаха. Оставлена безъ тампоновъ; в. $t^0 = 37$, р. = 70.
 10-й „ У. $t^0 = 36.7$, р. = 72; в. $t^0 = 37.1$, р. = 74.
 11-й „ У. $t^0 = 36.9$, р. = 72; в. $t^0 = 36.5$, р. = 70.
 12-й „ У. $t^0 = 36.7$, р. = 70; в. $t^0 = 37$, р. = 76. Халатъ.
 13-й „ $t^0 = 36.2$, р. = 66. Здорова.

№ 22. (№ 293).

Наталья М., 20 лѣтъ, первородящая. *Colpitis granulosa*. По-перечное положеніе плода; *versio in pedem et extractio*. Сильное кровоточеніе послѣ родовъ: тампонація матки іодоформной марлей. Продолжительность родовъ 24 ч.

Послѣ родовъ:

- 1-й день. У. $t^0 = 36.8$, р. = 90; в. $t^0 = 37.2$, р. = 88. Удалены тамponsы. Крови нѣть.
 2-й „ У. $t^0 = 36.5$, р. = 86; в. $t^0 = 37.7$, р. = 84.
 3-й „ У. $t^0 = 37.7$, р. = 86; в. $t^0 = 37.4$, р. = 85. Матка слегка чувствительная.
 4-й „ У. $t^0 = 39$; 12' дня $t^0 = 40^{\circ}$, р. = 110. 7' веч. $t^0 = 40.2$, р. = 104. Матка слегка чувствительна. Отдѣленія слегка пахнутъ. *Endometritis*.
 5-й „ 12' ночи $t^0 = 40.4$, р. = 100. У. $t^0 = 38.9$. Изслѣдованіе: шейка дряблая; каналъ легко проходимъ для пальца. Въ полости матки ничего особенного не прощупывается;

- матка довольно большая мягкая, въ наклоненіи впередъ. Въ лѣвомъ сводѣ чувствительность. Выдѣленій мало, мутныя, запахъ? Тампонація; в. $t^0 = 38.2$; 8' веч. $t^0 = 38.8$, р.=92. Тампонація.
- 6-й день. У. $t^0 = 37.4$, р.=92. Тампонація; в. $t^0 = 37.8$, р.=74. Тампонація.
- 7-й „ У. $t^0 = 37.9$, р.=100. Тамионація; в. $t^0 = 37.3$, р.=92. Оставлена безъ тампоновъ.
- 8-й „ У. $t^0 = 37^0$, р.=92. Выдѣленія бѣловатыя, безъ запаха; в. $t^0 = 37.5$, р.=90.
- 9-й „ У. $t^0 = 37.4$, р.=90; в. $t^0 = 37.1$, р.=90.
- 10-й „ У. $t^0 = 37.2$, р.=92; в. $t^0 = 36.9$, р.=84.
- 11-й „ У. $t^0 = 36.8$, р.=84; в. $t^0 = 37^0$, р.=78. Халатъ.
- 12-й „ $t^0 = 37^0$, р.=72. Здорова.

Нелишнимъ будетъ отмѣтить, что въ приведенномъ случаѣ явленія эндометрита—мѣстныя слабо выражены; между тѣмъ t^0 и р., особенно на 4-й и 5-й дни, достигали до значительной высоты.

№ 23. (№ 318).

Любовь Р., 26-ти лѣтъ, второродящая. Во время беременности небольшая кровопотери. Роды нормальные; продолжительность ихъ 18 часовъ.

Послѣ родовъ.

- 1—3 дни. У. $t^0 = 36.2-37^0$, р.=58—70; в. $t^0 = 37.1-37.9$, р.=60—76.
- 4-й „ У. $t^0 = 37.3$, р.=86. Чувствительности внизу живота нѣтъ. Выдѣленія бурыя, съ запахомъ. *Endometritis. Спринцованиемъ и secale.* в. $t^0 = 37.9$, р.=86.
- 5-й „ У. $t^0 = 36.5$, р.=72; в. $t^0 = 37.4$, р.=74.
- 6-й „ У. $t^0 = 36.9$, р.=70; в. $t^0 = 37.5$, р.=75.
- 7-й „ У. $t^0 = 36.5$, р.=70; в. $t^0 = 37.6$, р.=60. Выдѣленія съ тѣмъ-же запахомъ.
- 8-й „ У. $t^0 = 37.6$, р.=74; в. $t^0 = 37^0$, р.=80.
- 9-й „ У. $t^0 = 38^0$, р.=100. 2' дня $t^0 = 38.8$, р.=110. в. $t^0 = 38.2$, р.=86. Тѣло матки небольшое, но мягкое; шейка вялая. Выдѣленія бурыя съ очень рѣзкимъ запахомъ. Тампонація. $t^0 = 36.8$.
- 10-й „ У. $t^0 = 37.2$, р.=78. Запахъ значительно меньшій. Тампонація. $t^0 = 36.7$; в. $t^0 = 36.2$, р.=60. Тампонація.
- 11-й „ У. $t^0 = 36.7$, р.=70. Выдѣленія безъ запаха.
- 12-й „ У. $t^0 = 36.6$, р.=62. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны; в. $t^0 = 36.8$, р.=80. Халатъ.
- 13-й „ $t^0 = 36.7$, р.=62. Здорова.

№ 24. (№ 322).

Марія З., 39-ти лѣтъ, первородящая. Беременность нормальная. Роды окончены щипцами вслѣдствіе слабости потугъ. Extractio placentae manualis. Продолжительность родовъ 24 часа.

Послѣ родовъ.

- 1-й день. У. $t^0 = 36.1$, р. = 76; в. $t^0 = 37.7$, р. = 80.
 2-й " У. $t^0 = 36.7$, р. = 82; в. $t^0 = 38.2$, р. = 82.
 3-й " У. $t^0 = 37.9$, р. = 80. Боль внизу живота; в. $t^0 = 39.1$, р. = 72.
 4-й " У. $t^0 = 39.5$, р. = 90; в. $t^0 = 39.5$, р. = 102. Выдѣленія бураго цвѣта. Спринцованиѣ, ледъ на жизнь.
 5-й " У. вѣ 11' сильный зноѣ: $t^0 = 39.5$, р. = 100. Выдѣленія изъ матки желтовато-сѣраго цвѣта съ небольшимъ запахомъ. *Endometritis*. Матка плотная нечувствительная. Тампонациѣ. Черезъ часъ послѣ тампона t^0 съ 39.5 понизилась на 39.1; в. $t^0 = 38.7$, р. = 90. Удалены тампоны.
 6-й " У. $t^0 = 37.5$, р. = 92. Матка небольшая довольно плотная, подвижная, нечувствительная, въ норм. положеніи. Своды свободны. Выдѣленій мало, буроватыя съ небольшимъ запахомъ. Тампонациѣ; в. $t^0 = 37.8$, р. = 92. Тампонациѣ. $t^0 = 37.3$, р. = 90.
 7-й " У. $t^0 = 36.9$, р. = 82. Тампонациѣ. $t^0 = 37.1$, р. = 86; в. $t^0 = 38^0.9'$; в. $t^0 = 37.5$, р. = 82. Тампонациѣ; $t^0 = 37.2$.
 8-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 80. Удалены тампоны. Выдѣленій немногого, по цвѣту и запаху представляются нормальными; в. $t^0 = 38.2$, р. = 82.
 9-й " У. $t^0 = 38.1$, р. = 88. Выдѣленія буроватыя. Тампонациѣ. Черезъ часъ $t^0 = 37.8$, р. = 84; в. $t^0 = 39.2$, р. = 90. Тампонациѣ.
 10-й " 11' у. $t^0 = 37.7$, р. = 82. Тампонациѣ. 1' дня, $t^0 = 37.7$. р. = 82; 3' дня $t^0 = 37.7$, р. = 80; в. $t^0 = 39.4$, р. = 100; Тампонациѣ.
 11-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 80. Тампонациѣ. 1' дня $t^0 = 37.1$ в. $t^0 = 37.9$, 38.9, р. = 96. Тампонациѣ. $t^0 = 39.8$, р. = 100. 12' ночи 38.9.
 12-й " 2' н. $t^0 = 38.1$, затѣмъ $t^0 = 37.6$, 37.3, р. = 86. Удалены тампоны; в. $t^0 = 39.2$, р. = 100.
 13-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 90; в. $t^0 = 39.4$, р. = 100. Шейка маленькая, наружный зѣвъ едва пропускаетъ маленький шарикъ; у внутренняго зѣва, препятствіе отъ anteflexi: при выпрямленіи канала шарикъ легко проникаетъ въ полость матки. Послѣ удаленія шарика, изъ полости вылилось небольшое количество жидкихъ свѣтлобурыхъ выдѣленій безъ запаха. Своды свободны. Тампонациѣ. $t^0 = 38$, р. = 100.
 14-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 86. Тампонациѣ. $t^0 = 37.1$, 37⁰; в. $t^0 = 38.1$, р. = 80. Тампонациѣ.
 15-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 72. Тампонациѣ; в. $t^0 = 37.8$, 37.3, 37.6, 37.8, р. = 100.
 16-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 70. Тампонациѣ. $t^0 = 36.8$; в. $t^0 = 37.2$, р. = 84. Удалены тампоны.

- 17-й день. У. $t^0 = 36.5$, р. = 72. Выдѣленія изъ матки по цвѣту и запаху нормальны; в. $t^0 = 37.6$, р. = 78.
- 18-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 68. Шейка матки маленькая плотная. Тѣло маленькое плотное, подвижное, въ нормальномъ наклоненіи впередъ. Своды свободны. Выдѣленій мало, по цвѣту и запаху нормальны. Общее состояніе хорошее; в. $t^0 = 37.8$, р. = 70.
- 19-й " У. $t^0 = 36.7$, р. = 72; в. $t^0 = 37^0$, р. = 74.
- 20-й " $t^0 = 36.8$, р. = 70. Здорова.

№ 25. (№ 329).

Анна Л., 31 года, второродящая. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ 15 часовъ.

Послѣродовое состояніе:

- 1—5 дни. У. $t^0 = 36.8—37.2$; р. = 60—70; в. $t^0 = 37^0—37.8$; р. = 60—88. Небольшая чувствительность матки.
- 6-й " У. $t^0 = 37.6$, р. = 70; в. $t^0 = 39.8$, р. = 90.
- 7-й " У. $t^0 = 39.5$, р. = 82. Выдѣленія буроватыя съ легкимъ запахомъ. *Endometritis*. В. $t^0 = 39^0$.
- 8-й " У. $t^0 = 37$, р. = 70. Матка средней плотности, подвижная нечувствительная, въ нормальной антeфлексіи-версіи. Своды свободны. Выдѣленія слизисто-гнойные съ небольшимъ запахомъ. Тампонада. $t^0 = 36.8$, р. = 68. Тампонада. $t^0 = 36.4$.
- 9-й " У. $t^0 = 36.7$, р. = 64.
- Удалены тампоны. Запаха выдѣленій не замѣтно; веч. $t^0 = 36.8$, р. = 64.
- 10-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 60. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны. $t^0 = 36.8$, р. = 62. Здорова.

№ 26. (№ 341).

Любовь Г., 25-ти лѣтъ, второродящая. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ 20 часовъ.

Послѣродовое состояніе:

- 1-й день. У. $t^0 = 37.4$, р. = 72; в. $t^0 = 38^0$, р. = 86.
- 2-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 80. 2' дня $t^0 = 39$; в. $t^0 = 37.7$, р. = 76.
- 3-й " У. $t^0 = 37.9$, р. = 80. *Endometritis*. В. $t^0 = 38.9$, р. = 100. Ночью $t^0 = 39.1$.
- 4-й " У. $t^0 = 37.6$, р. = 80. Днемъ $t^0 = 39.1$, р. = 92. Матка довольно большая, плотная, въ нормальномъ наклоненіи впередъ. Тѣло и дно, а также своды немного чувствительны. Выдѣленія изъ полости необильны, буроваты съ небольшимъ запахомъ: *Endometritis*. Тампонада; в. $t^0 = 38.7$, р. = 90.
- 5-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 80. Тампонада. 1' дня $t^0 = 37.5$, р. = 82. 5' веч. $t^0 = 38.1$; 8' веч. $t^0 = 38.7$, р. = 82.

Удалены тампоны. Матка нечувствительная плотная. Сильное переполнение кишечника; при позывѣ на низъ больна не можетъ испражняться. Оставлена безъ тампоновъ. Ol. ricini 20.0 и клизма.

- 6-й день. Больную хорошо прослабило. Вздутіе живота исчезло. У. $t^0 = 37^{\circ}$, р. = 80. Матка плотная, въ антэфлексіи, подвижная, нечувствительная. Выдѣленія изъ матки безъ замѣтнаго запаха; в. $t^0 = 36.7$, р. = 72.
 7-й " У. $t^0 = 36.3$, р. = 60; в. $t^0 = 37.2$, р. = 66.
 8-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 70; в. $t^0 = 38$, р. = 72.
 9-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 70. Здорова.

№ 27. (№ 345).

Ирина М., 20 лѣтъ, первородящая. Беременность и роды нормальные. Продолжительность родовъ 14 часовъ. Задержаніе оболочекъ и внутреннее ихъ отдѣленіе.

Послѣ родовъ.

- 1-й день. У. $t^0 = 36.8$, р. = 68; в. $t^0 = 37^{\circ}$, р. = 72.
 2-й " У. $t^0 = 36.5$, р. = 70; в. $t^0 = 37.7$, р. = 60.
 3-й " У. $t^0 = 37.3$, р. = 72. Выдѣленія съ запахомъ; веч. $t = 39.5$, р. = 85.
 4-й " У. $t^0 = 39.5$, р. = 82. Матка нечувствительная подвижная. Выдѣленія съ запахомъ. *Endometritis*. Матка промыта сначала борнымъ растворомъ, затѣмъ сулемой. t^0 въ 2' д. 40.9, р. = 120. Ознобъ; 8' веч. $t^0 = 40.3$, р. = 104. Шейка плохо сформирована; грязно-сѣрые налеты на обѣихъ ея губахъ по краямъ. Выдѣленія грязно-розовыя; запахъ? Тѣло матки довольно большое, мягкое, нечувствительное. Своды безболѣзны. Головная боль, сильный жаръ, кожа суха, горяча. Самочувствіе плохое. Тампонадія. $t^0 = 40^{\circ}$, 39.7, 39.5, р. = 100.
 5-й " У. $t^0 = 39.1$, р. = 80. Самочувствіе больной лучше. Тампонадія. $t^0 = 39^{\circ}$, р. = 72; в. $t^0 = 39.2$. Тампонадія.
 6-й " У. $t^0 = 38.2$, р. = 68. Тампонадія. $t^0 = 37.8$, р. = 68; веч. $t^0 = 38.3$, р. = 70. Тампонадія. Черезъ 1 часъ $t^0 = 39.4$, затѣмъ $t^0 = 38.6$, 38.4, р. = 90.
 7-й " У. $t^0 = 38^{\circ}$, р. = 92. Изъ полости матки по удалениіи тампоновъ выдѣлилось довольно большое количество желтовато-зеленаго гноя. Тампонадія; в. $t^0 = 37.4$, р. = 70. Тампонадія. Влагалищная часть замѣтно очистилась отъ налета. Ночью $t^0 = 37.5$, р. = 72.
 8-й " У. $t^0 = 37^{\circ}$, р. = 70. 11' у. $t^0 = 37.8$, р. = 72. Тампонадія. $t^0 = 37.3$, р. = 80. В. Тампонадія, $t^0 = 36.8$, р. = 70.
 9-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 70. Удалены тампоны; веч. $t^0 = 36.6$, р. = 68.
 10-й " У. $t^0 = 36.4$, р. = 70. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны. Состояніе хорошее; в. $t^0 = 36.7$, р. = 72.

11-й день. У. $t^0 = 36.5$, р. = 72; в. $t^0 = 36.9$, р. = 70.
12-й " $t^0 = 36.4$, р. = 72. Здорова.

№ 28. (№ 347).

Дарья И., 18 лѣтъ, первородящая. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ 14 часовъ.

Послѣродовое состояніе:

- 1—5 дни. У. $t^0 = 36.8—37.2$, р. = 70—80; в. $t^0 = 37.1—37.8$, р. = 72—96.
6-й " У. $t^0 = 37^{\circ}$, р. = 78. Матка большая, нечувствительная, подвижная; своды свободны; выдѣленія съ запахомъ. *Endometritis*; в. $t^0 = 37.3$, р. = 76. Спринцований и secale.
7-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 70; в. $t^0 = 38^{\circ}$, р. = 74.
8-й " У. $t^0 = 37.6$, р. = 72; в. $t^0 = 38.1$, р. = 100.
9-й " У. $t^0 = 38^{\circ}$, р. = 62. Выдѣленія съ запахомъ. Тампонация; в. $t^0 = 37.5$, р. = 68. Удалены тампоны.
10-й " У. $t^0 = 37.3$, р. = 74. Тампонация; в. $t^0 = 37.5$, р. = 68. Тампонация. Выдѣленія съ меньшимъ запахомъ.
11-й " У. $t^0 = 37^{\circ}$, р. = 68. Тампонация; в. $t^0 = 37.2$, р. = 70. Тампонация.
12-й " У. $t^0 = 37^{\circ}$, р. = 70. Удалены тампоны. Выдѣленія безъ запаха; в. $t^0 = 37^{\circ}$, р. = 62.
13-й " У. $t^0 = 36.9$, р. = 84; в. $t^0 = 37^{\circ}$, р. = 70.
14-й " $t^0 = 36.7$, р. = 60. Здорова.

№ 29. (№ 353).

Варвара Ф., 26 лѣтъ., III-рага. Беременность и роды нормальны. Прежняя беременности и роды тоже нормальны. Продолжительность родовъ 3 часа.

Послѣ родовъ.

- 1-й день. У. $t^0 = 36.8$, р. = 80. Матка чувствительная; замѣтная чувствительность съ боковъ матки. Частыя схваткообразные боли; в. $t^0 = 36.7$, р. = 76.
2-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 76; веч. $t^0 = 36.8$, р. = 72; ol. ricini 25.0.
3-й " У. $t^0 = 36.5$, р. = 70. Въ 2' дня потрясающій ознобъ; $t^0 = 39.5$, р. = 110; веч. $t^0 = 38.8$, р. = 94.
4-й " У. $t^0 = 39.9$, р. = 110; веч. $t^0 = 38.7$, р. = 90. Животъ вздутъ, сильная чувствительность въ области матки и лѣвой широкой связки. Большую тошнило и рвало. Матка довольно большая, мягкая, болѣзnenная. Выдѣленія мутныя, запахъ? *Endometritis et parametritis sin.* По возможности *in situ* (на столѣ) полость матки вычищена шариками и затампонирована. $t^0 = 38.6$, 38.3, р. = 86.

- 5-й день. У. $t^0 = 37.8$, р. = 80. Вздутіє и чувствительность живота замѣтно уменьшились. Тошноты нѣть. Тампонация; $t^0 = 38^0$, р. = 80, $t^0 = 36.5$.
- 6-й „ $t^0 = 36.8$, р. = 80; $t^0 = 37.9$, р. = 74; 11' утра $t^0 = 37.4$. Удалены тампоны; 1' дня $t^0 = 39.4$, р. 120, (ознобъ). 3' дня $t^0 = 40^0$, р. = 100; $t^0 = 39.3$, р. = 90; веч. $t^0 = 38.7$, р. = 90. Тампонация, $t^0 = 38.7$, 39.5, р. = 96; $t^0 = 39.3$, 38.8.
- 7-й „ У. $t^0 = 38^0$, 37.4, р. = 86. Тампонация; веч. $t^0 = 37.8$. Тампонация, $t^0 = 37.5$, р. = 70; $t^0 = 38^0$, р. = 72.
- 8-й „ У. $t^0 = 37^0$, р. = 74. Удалены тампоны, $t^0 = 37.7$, р. = 80; веч. $t^0 = 38.6$, р. = 90.
- 9-й „ У. $t^0 = 39.8$, р. = 120. 9' утра $t^0 = 40^0$, р. = 120; 11' у. Тампонация, $t^0 = 39.6$, 38.6, 38.4; в. $t^0 = 37.5$, р. = 82. Тампонация, $t^0 = 38.5$.
- 10-й „ 1' н. $t^0 = 38.4$, р. = 92; 8' у. $t^0 = 37.8$, р. = 94; 10' у. $t^0 = 39.8$, р. = 98; 12' дня $t^0 = 40^0$, р. = 98. Матка плотная; небольшая чувствительность въ правомъ сводѣ. Тампонация; 1' дня $t^0 = 40.2$, р. = 96; 3' дня $t^0 = 39.5$, вech. $t^0 = 38.2$, р. = 80. Тампоны мало пропитаны. Матка маленькая. Зѣвъ и каналъ едва пропускаютъ маленький шарикъ. Тампонация, $t^0 = 37.5$, р. = 80. $t^0 = 37.8$, р. = 82.
- 11-й „ 4' у. $t^0 = 39^0$, р. = 84; 7' у. $t^0 = 39.5$, р. = 90; 12, дня $t^0 = 39.9$, р. = 92. Удалены тампоны, 2' дня $t^0 = 39.9$, р. = 94. 3' дня. Выдѣленія изъ полости матки необильны, мутны; полость небольшая. Тѣло небольшое немногого чувствительное. Тампонация, 6' вech. $t^0 = 38.8$, р. = 100; 8' вech. $t^0 = 37.1$, р. = 90.
- 12-й „ 3' ночи $t^0 = 38.5$, р. = 90; 7' у. $t^0 = 38.4$, р. = 100; 10' у. $t^0 = 40.5$, р. = 120. Удалены тампоны. 12' дня $t^0 = 40.3$, р. = 120. Тампонация, 1' дня $t^0 = 40.6$, р. = 138, 3' дня $t^0 = 40.5$, р. = 114, 5' вech. Перетампонирована. Прежній тампонъ не весь пропитанъ; по удаленіи его изъ полости матки вылилось довольно большое количество жидкой кровянистой жидкости. Чувствительности внизу живота нѣть. 6' вech. $t^0 = 39.3$, 8' вech. $t^0 = 38^0$, р. = 90. 11' ночи $t^0 = 37.8$.
- 13-й „ У. $t^0 = 37.2$, р. = 80. Тампонация. $t^0 = 37.1$, 37.5, р. = 82; веч. $t^0 = 38^0$, р. = 78. Тампонация $t^0 = 37.3$, р. = 76.
- 14-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 80. Удалены тампоны: мало пропитаны и безъ запаха. Тѣло матки небольшое плотное, нечувствительное, въ нормальномъ наклоненіи впередъ; подвижность его ограничена. Правый сводъ свободенъ; въ лѣвомъ сводѣ въ основаніи широкой связки прощупывается уплотненіе, особенно у края матки; небольшая чувствительность. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны. Веч. $t^0 = 37.1$, р. = 78.

- 15-й день. У. $t^0 = 36.7$, р. = 74; веч. $t^0 = 36.8$, р. = 76.
 16-й " У. $t^0 = 36.5$, р. = 76. Уплотнение въ лѣвомъ сводѣ нѣсколько меньше, нечувствительно. Самочувствіе хорошее; веч. $t^0 = 36.5$, р. = 74.
 17-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 68. Халатъ, веч. $t^0 = 36.8$, р. = 70.
 18-й " $t^0 = 36.5$, р. = 70. Здорова. Выписалась съ небольшимъ напряженіемъ въ лѣвомъ сводѣ.

Изъ 15 тампонаций пять сопровождались повышеніями t^0 : 1) послѣ четвертой тампонации (6-й день) t^0 съ 38.7 поднялась до 39.5, но вскорѣ спустилась до 37.4; 2) восьмая тампонация (9-й день) сопровождалась нѣсколько колебаніями: t^0 съ 37.5 поднялась до 38.5, затѣмъ опять спустилась до 37.8, послѣ чего въ теченіе четырехъ часовъ поднялась до 40°; 3) десятая тампонация дала кратковременное пониженіе t^0 съ 38.2 на 37.5, послѣ чего послѣдовало повышеніе t^0 безъ озноба до 39.9; 4) подобное было и послѣ одинадцатой тампонации (11-й день): t^0 съ 39.9 спустилась до 37.1 послѣ чего она, постепенно подымаясь, дошла до 40.5; 5) наконецъ 12-я тампонация (12-й день) не вызвала пониженія t^0 ; послѣдняя продолжала оставаться приблизительно на той-же высотѣ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ вложенные тампоны повидимому не дренировали полости и не впитывали въ себя выдѣленій, такъ какъ тампоны не оказались пропитанными и по удаленіи ихъ изъ матки вылилось довольно большое количество выдѣленій. Слѣдуетъ обратить вниманіе на шестой и восьмой дни: всякий разъ, какъ больная оставалась безъ тампоновъ, t^0 рѣзко повышалась, съ 37.4 и 37° до 40° оба раза.

№ 30. (№ 354).

Марія Т. 23-хъ лѣтъ, первородящая. Тазъ общесъуженный плоскій. Роды продолжались 33 часа.

Послѣ родовъ.

- 1-й день. У. $t^0 = 36.6$, р. = 72; веч. $t^0 = 37.1$, р. = 76.
 2-й " У. $t^0 = 36.5$, р. = 68; веч. $t^0 = 37.6$, р. = 70. Небольшая чувствительность матки у дна.
 3-й " У. $t^0 = 37.8$, р. = 76; въ 10' у. ознобъ, $t^0 = 39.6$, р. = 102. Матка плотная подвижная слегка болѣзненная. Выдѣленій много со сгустками; схваткообразные боли внизу живота; веч. $t^0 = 39.5$, р. = 102. Выдѣленія краснобурыя, съ запахомъ: *Endometritis*. Тампонация $t^0 = 38.7$.
 4-й " У. $t^0 = 38.8$, р. = 92. Перемѣнены тампоны, $t^0 = 39.4$, р. = 112; $t^0 = 40^0$, р. = 112; t^0 вech. 39.7, р. = 100. До удаленія тампоновъ: матка большая, довольно мягкая, нечувствительная. Кромѣ жара, больная ни на что не жалуется; ознобовъ не было. Тампоны—влагалищный сухъ, внутриматочный пропитанъ бурокрасными выдѣленіями съ запахомъ. Во время спринцовкіи, по удаленіи тампоновъ, матка сократилась, уменьшилась

- и изъ полости вылилось большое количество буро-красныхъ выдѣлений. Рѣзкая anteflexio. Secale. $t^0=39.5$, 38.5 , 37.8 , 37.2 , р. = 90.
- 5-й день. У. $t^0=36.7$, р. = 80; $t^0=38^{\circ}$, р. = 80. Тампонація; веч. $t^0=38^{\circ}$, р. = 70. Тампонація, $t^0=38.7$, 38.2 .
- 6-й " У. $t^0=37.9$, 38.1 , р. = 76. Тампонація, $t^0=37.3$, р. = 72; веч. $t^0=37.5$. Тампонація, $t^0=37.3$, 38° , 37.3 , р. = 72;
- 7-й " У. $t^0=36.7$, р. = 72. Тампоны удалены; веч. $t^0=36.6$, 37.5 , р. = 72.
- 8-й " У. $t^0=37.3$, р. = 70. Выдѣлениа по цвѣту и запаху нормальны. Состояніе хорошее; в. $t^0=37.2$, р. = 72.
- 9-й " У. $t^0=36.6$, р. = 70; веч. $t^0=36.8$, р. = 70.
- 10-й " У. $t^0=36^{\circ}$, р. = 72. Здорова.

№ 31. (№ 413).

Степанида К., 24-хъ лѣтъ, первородящая. Беременность нормальная. Роды преждевременные двойнями. Hydramnion и понеречное положеніе втораго плода: поворотъ и извлечениe. Продолжительность родовъ 24 часа.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0=36.6$, р. = 70; веч. $t^0=38.3$, р. = 82.
- 2-й " У. $t^0=37.2$, р. = 76; веч. $t^0=37.9$, р. = 76.
- 3-й " У. $t^0=37^{\circ}$, р. = 70; веч. $t^0=36.7$, р. = 60.
- 4-й " У. $t^0=37.2$, р. = 72; веч. $t^0=38.3$, р. = 72.
- 5-й " У. $t^0=37.7$, р. = 74; в. $t^0=38.1$, р. = 88. За сутки большую слабило жидкое десять разъ: (Enteritis?). Матка плотная небольшая. Выдѣлениа слегка буроватыя, безъ запаха.
- 6-й " У. $t^0=38^{\circ}$, р. = 72. Изслѣдованіе: матка плотна, въ anteflexi'и. Шейка коротка, зѣвъ свободно пропускаетъ $1\frac{1}{2}$ пальца. Изъ полости матки удалена небольшая отдѣльная долька послѣда, плотно приросшая къ стѣнкѣ матки. Lochia нормального цвѣта безъ запаха. Слабило за сутки шесть разъ. Висмутъ съ салоломъ; веч. $t^0=37.3$, р. = 70.
- 7-й " У. $t^0=37.4$, р. = 70. Слабило за сутки шесть разъ; веч. $t^0=37.7$, р. = 68.
- 8-й " У. $t^0=38^{\circ}$, р. = 72; веч. $t^0=39.6$, р. = 86. Слабило за сутки четыре раза.
- 9-й " У. $t^0=38.1$, р. = 70. Циносъ прекратился. Матка подвижная, довольно большая, вялая, нечувствительная. Выдѣлениа бурыя съ хлопьями, съ рѣзкимъ запахомъ. Endometritis. Тампонація, $t^0=37.7$, р. = 70; веч. $t^0=38.1$, р. = 80. Тампонація, $t^0=38^{\circ}$, р. = 82.
- 10-й " У. $t^0=37.9$, р. = 76; в. $t^0=39.6$, р. = 100. Тампонація, $t^0=38.7$; в. 38.5 , р. = 84. Тампонація, $t^0=37.9$.
- 11-й " У. $t^0=37.3$, р. = 80. Удалены тампоны, веч. $t^0=38.4$, р. = 84. Выдѣлениа изъ полости матки довольно обильны грязно-красного цвѣта. Тампонація, $t^0=38^{\circ}$.

- 12-й день. У. $t^0 = 36.8$, р. = 84. Удалены тампоны; веч. $t^0 = 37.5$, р. = 86. Поноса нетъ.
- 13-й " У. $t^0 = 37.7$, р. = 78. Выдѣленія изъ полости матки буроватыя, безъ запаха, съ небольшими кусочками отпадающей оболочки. Вычищена полость матка ватными шариками; веч. $t^0 = 36.1$, р. 70.
- 14-й " У. $t^0 = 36.7$, р. = 68; веч. $t^0 = 36.6$, р. = 68. Изслѣдованіе ничего ненормального не обнаружило.
- 15-й " $t^0 = 36.4$, р. = 66. Здорова.

№ 32. (№ 439).

Степанида Н., 22-хъ лѣтъ, первородящая. Беременность и роды нормальные. Продолжительность родовъ 24 часа.

Послѣ родовъ.

- 1-й день. У. $t^0 = 36.8$, р. = 68; веч. $t^0 = 36.5$, р. = 68.
- 2-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 70; веч. $t^0 = 38^0$, р. = 88.
- 3-й " У. $t^0 = 36.9$, р. = 72; веч. $t^0 = 39.2$, р. = 100.
- 4-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 78; днемъ $t^0 = 38.5$, р. = 80. вech. $t^0 = 37.8$, р. = 82.
- 5-й " У. $t^0 = 36.5$, р. = 62. Изслѣдованіе: разрывъ на шейкѣ съ лѣвой стороны; грязноватый налетъ у наружного зѣва. Выдѣленія изъ цервикального канала и полости матки бурогрязныя съ замѣтнымъ запахомъ. Полость большая, матка вялая, подвижная: *Endometritis*. Тампонация; веч. $t^0 = 37.5$, р. = 80. Тампонация.
- 6-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 76. Тампонация. В. $t^0 = 37.5$; Тампонация.
- 7-й " У. $t^0 = 36.4$, р. = 68. Удалены тампоны. Шейка очистилась отъ налета. $t^0 = 36.6$, 38.5, р. = 70; веч. $t^0 = 39.5$, р. = 88. Выдѣленія изъ полости матки довольно обильны, грязно-бураго цвета, съ запахомъ. Вычищена полость матки шариками ваты и тампонация. $t^0 = 38.3$, р. = 86.
- 8-й " У. $t^0 = 36.4$, р. = 76. Удалены тампоны; веч. $t^0 = 37.7$, р. = 76.
- 9-й " У. $t^0 = 36.5$, р. = 70. Выдѣленій много, мутные безъ запаха. Вычищена полость шариками: много кусочековъ отпадающей оболочки; веч. $t^0 = 36.4$, р. = 68.
- 10-й " У. $t^0 = 36.5$, р. = 72; веч. $t^0 = 36.6$, р. = 74.
- 11-й " $t^0 = 36.2$, р. = 68. Здорова.

№ 33. (№ 449).

Марія Н., 19-ти лѣтъ, второродящая. Прежніе роды кончились щипцами. Fistula recto-vaginalis, по всей вѣроятности, оставшаяся послѣ неполнаго сращенія зашитаго полнаго разрыва промежности. Настоящая беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ—10 часовъ.

Послѣ родовъ.

- 1—5 дни. У. $t^0 = 36^0 - 37.4$, р. = 72—74; веч. $t^0 = 36.6 - 37.8$, р. = 70—90.
 6-й „ У. $t^0 = 37.4$, р. = 86. Въ 10' у. при сильномъ зноѣ t^0 поднялась до 39.4. Выдѣленія сильно пахнутъ. *Endometritis*. Подъ контролемъ зеркаль матка промыта борнымъ растворомъ и затампонирована юдоформной марлей. 2' для $t^0 = 40.1$, р. = 118; веч. $t^0 = 39.4$, р. = 120; тѣло матки маленькое мягкое въ нормальномъ наклоненіи впередъ, подвижное. Своды свободны. По удаленіи вложеннаго въ нормальномъ послѣродовомъ отдѣленіи тампона—выдѣленія бурыя съ запахомъ. Тампонация.
- 7-й „ У. $t^0 = 36.7$, 36.8, 37⁰, р. = 96. Удалены тампоны. Выдѣленія безъ запаха. В. $t^0 = 36.9$, р. = 96.
 8-й „ У. $t^0 = 36.9$, р. = 90. Веч. $t^0 = 37^0$, р. = 88. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны.
 9-й „ У. $t^0 = 36.5$, р. = 82. Веч. $t^0 = 37.3$, р. = 80.
 10-й „ $t^0 = 36.7$. Здорова.

№ 34. (№ 460).

Екатерина Н. 19-ти лѣтъ, первородящая. Беременность и роды нормальны. Небольшой разрывъ промежности: швы. Продолжительность родовъ 11 часовъ. $t^0 = 37.8$, р. = 54.

Послѣ родовъ.

- 1—6 дни. У. $t^0 = 36.4 - 36.9$, р. = 60—66. Веч. $t^0 = 36.7 - 36.9$, р. = 60—68.
 7-й „ У. $t^0 = 36.7$, р. = 68. Сняты швы: срошеніе получилось неполное.
 8-й „ У. $t^0 = 37.3$, р. = 68. 2' дня $t^0 = 39.9$, р. = 106; веч. $t^0 = 38.4$, р. = 98.
 9-й „ У. $t^0 = 38.6$, р. = 96. Промежность не срослась; раневая поверхность чиста, но сильно гиперемирована. Краснота стѣнокъ влагалища. На шейкѣ по обѣимъ сторонамъ надрывы; съ правой стороны небольшой налетъ. Выдѣленія изъ полости матки кровянисты, кофейного цвѣта, съ клочьями; запахъ? Матка небольшая дряблая нечувствительная. Своды свободны. *Colpitis et endometritis*. Тампонация. $t^0 = 37.8$, р. = 80; веч. $t^0 = 38.1$, р. = 82. Тампонация; $t^0 = 37.5$, р. = 96. $t^0 = 37.2$, р. = 98.
 10-й „ У. $t^0 = 39.5$, р. = 112. Удалены тампоны. 12' дня $t^0 = 36.9$, р. = 100. Выдѣленія изъ полости темнаго шоколадного цвѣта, безъ запаха. Полость вычищена и затампонирована. $t^0 = 36.9$; веч. $t^0 = 37^0$, р. = 80. Удалены тампоны. Краснота влагалища и налетъ на шейкѣ исчезли.

- 11-й день. У. $t^0 = 36.6$, р. = 72. Выдѣленія нормального цвѣта; вѣч. $t^0 = 37^0$, р. = 68.
 12-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 68; вѣч. $t^0 = 36.9$, р. = 68.
 13-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 62. Изслѣдование: шейка хорошо сформировалась; тѣло небольшое плотное подвижное нечувствительное, въ норм. наклоненіи впередъ. Выдѣленія слизистыя, нормальныя. Разрывъ покрытъ свѣжими чистыми грануляціями; в. $t^0 = 37^0$, р. = 68.
 14-й " $t^0 = 36.6$, р. = 66. Здорова.

№ 35. (№ 465).

Александра В., 35-ти лѣтъ, 13-ые роды. Въ anamnesis'ѣ сифилисъ. Изъ прежнихъ двѣнадцати беременностей 5 кончились выкидышами, 5 мертвыми плодами, изъ которыхъ трое мацерированные. Настоящіе роды двойнями. Продолжительность родовъ 40 мин. (?).

Послѣ родовъ:

- 1—2 день. У. $t^0 = 37^0$, 36.5; р. = 70; в. $t^0 = 37^0$, 37.4; р. = 72. Болѣзnenность матки при давлениі.
 3-й день. У. $t^0 = 37^0$, р. = 70. Матка плотная, болѣзnenная, выдѣленія съ запахомъ; в. $t^0 = 38.5$, р. = 80.
 4—9 " У. $t^0 = 36.5—37$, р. = 70—76; в. $t^0 = 37.1—37.3$, р. = 70—80. Спринцованиія влагалища.
 10-й " У. $t^0 = 37.5$, р. = 76; в. $t^0 = 37.9$, р. = 76.
 11-й " У. $t^0 = 38.6$, р. = 98; в. $t^0 = 39.8$, р. = 88. Шейка хорошо сформировалась, зѣвъ пропускаетъ палецъ съ трудомъ. Передняя стѣнка полости матки гладка; на задней — грибовидная разрашенія, плотно прикрепленная къ стѣнкѣ. Матка немного чувствительная. Выдѣленія съ рѣзкимъ запахомъ. *Endometritis*. Тампонаци. $t^0 = 37.7$, 38.4.
 12-й " 1' ночи $t^0 = 39.1$, р. = 94. 10' у. $t^0 = 38.4$. Тампонаци; $t^0 = 38^0$; в. $t^0 = 37.6$. Удалены тамponsы.
 13-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 74; в. $t^0 = 37.7$, р. = 78. Изъ полости матки при вытираніи ея шариками выплыли куски послѣда. Выдѣленія бурья съ запахомъ. На задней стѣнкѣ въ полости матки большія крѣпко приросшія грибовидные разрашенія, которыхъ не удалось отдѣлить безъ риска вызвать кровотеченіе. Тампонаци. $t^0 = 37.4$, р. = 72; $t^0 = 37.2$, р. = 70.
 14-й " У. $t^0 = 37.5$, р. = 74. 10' у. $t^0 = 38.1$, р. = 72. Удалены тамponsы. 12' дня $t^0 = 38.5$. Тампонаци. Черезъ часъ послѣ тампонации ознобъ, послѣ чего t^0 поднялась до 40.1, р. = 120. Сильный схваткообразный боли внизу живота. Животъ не вздутий, слегка чувствителенъ внизу. Вечеромъ вынуты тамponsы, которые оказались пропитаны не цѣликомъ. Изслѣдованіе: матка плотная, подвижная, болѣзnenная, въ антегрексіи. Своды немного чувствительны, но пальцы изслѣдую-

- щихъ рукъ безъ труда сводятся. Выдѣленія съ кусочками измѣненной ткани. Оставлена безъ тампоновъ. Покой, ледъ.
- 15-й день. 4' у. $t^0 = 38.9$, р. = 100. У. $t^0 = 38.4$, р. = 92. Напряженіе въ толще лѣвой широкой связки (при комбинированномъ изслѣдованіи). Больная жалуется на боль и по временамъ иррадіирующую боль въ ногу и задній проходъ; в. $t^0 = 39.2$, р. = 98. *Parametritis sin. incipiens*. Покой, ледъ, вино.
- 16-й " У. $t^0 = 37.6$, р. = 94; в. $t^0 = 37.9$, р. = 98. Боль у дна матки и въ сводахъ нѣсколько меньше.
- 17-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 90; в. $t^0 = 39.4$, р. = 102; $t^0 = 38.8$, р. = 92.
- 18-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 92. Боль значительно меньше. Выдѣленія нѣсколько обильнѣе, буроватаго цвѣта, безъ запаха. В. $t^0 = 38.5$, р. = 92.
- 19-й " У. $t^0 = 38^0$, р. = 72; в. $t^0 = 38.2$, р. = 74. Боль меньше. Самочувствіе хорошее.
- 20-й " У. $t^0 = 37.3$, р. = 70; в. $t^0 = 37.5$, р. = 72. Состояніе хорошее.
- 21-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 68; в. $t^0 = 37.5$, р. = 74.
- 22-й " У. $t^0 = 36.7$, р. = 70. Внутреннее изслѣдованіе. Матка плотная, слегка чувствительная. Шейка сформирована, Своды свободны. Халать. В. $t^0 = 37.2$, р. = 76.
- 23-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 70; в. $t^0 = 37^0$, р. = 70. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны.
- 24-й " $t^0 = 37^0$. Здорова. Ребенокъ съ явленіями наследственнаго сифилиса.

Послѣ послѣдней четвертой тампонаціи (14-й день) черезъ часъ наступилъ ознобъ и t^0 поднялась до 40.1. Вскорѣ послѣ этого обнаружились явленія раздраженія въ лѣвой широкой связкѣ. Очевидно, эти явленія вызваны послѣдней тампонаціей. При покойномъ положеніи, примѣненіи льда на животъ, внутрь *alcoholica* все это быстро исчезло, не оставивъ въ сводахъ замѣтныхъ слѣдовъ

№ 36. (493).

Марія М., 28 лѣтъ, второродящая. Первые роды окончены щипцами. Поступила въ Институтъ съ кровотечениемъ при зѣвѣ открытомъ на 2 пальца. Placenta praevia centralis; тампонація шейки и влагалища. Роды нормальные; продолжительность ихъ 42 часа. Антоническое кровотеченіе въ послѣдовомъ періодѣ, ручное отдѣленіе послѣда. t^0 послѣ родовъ 38.1, р. = 130.

Послѣродовое состояніе.

1-й день. У. $t^0 = 37.2$, р. = 98; в. $t^0 = 38^0$, р. = 102.

2-й " У. $t^0 = 37.9$, р. = 92; в. $t^0 = 38.3$, р. = 102. Матка немного чувствительная. Спринцованиe. Изслѣдованіе: шейка еще не сформирована. Матка довольно большая. Изъ полости удалены кровяные сгустки съ край-

- не рѣзкимъ запахомъ. Выдѣленія съ тѣмъ-же запахомъ. *Endometritis*; в. $t^0=38.5, 38^{\circ}$, р. = 100. Тампонация; $t^0=37.3$, р. = 74.
- 3-й день. У. $t^0=37.2$, р. = 70. Тампонация; в. $t^0=37.3$, р. = 80. Тампонация.
- 4-й „ У. $t^0=36.1$, р. = 72. Удалены тампоны. Выдѣленія безъ запаха; в. $t^0=36.8$, р. = 72.
- 5-й „ У. $t^0=36.4$, р. = 70. Матка довольно большая, въ нормальномъ наклоненіи впередъ, подвижная, безболѣзненная. Своды свободны. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны. В. $t^0=37.5$, р. = 76.
- 6-й „ У. $t^0=36.8$, р. = 82; в. $t^0=37^{\circ}$, р. = 80.
- 7-й „ $t^0=36.7$. Здорова.

№ 37. (№ 507).

Анастасія И., 17 лѣтъ, первородящая. Беременность и роды нормальны; продолжительность родовъ 17 часовъ.

Послѣродовое состояніе:

- 1—4 дни. У. $t^0=36.6—37.2$, р. = 70—72; в. $t^0=36.8—37.8$, р. = 70—90.
- 5-й день. У. $t^0=37.6$, р. = 82; днемъ $t^0=38.7$; в. $t^0=39.5$, р. = 106.
- 6-й „ У. $t^0=37.9$, р. = 100; в. $t^0=38.9$, р. = 104. Частый поносъ. Изслѣдованіе: тѣло матки въ рѣзкой антеградной позиціи. Шейка не сформирована, зѣвъ широко открытъ; въ немъ торчитъ кусокъ послѣда величиною въ куриное яйцо, который удаленъ. Рѣзкий запахъ. Полость матки велика, на задней стѣнкѣ оставшіеся небольшіе кусочки послѣда. Часть ихъ удалена пальцемъ. *Retentio p. placentae et Endometritis*. Тампонация; $t^0=37.9$, р. = 98.
- 7-й „ У. $t^0=37.5$, р. = 92. Удалены тампоны; всѣ пропитаны. Полость матки вычищена влажными шариками; в. $t^0=38^{\circ}$, р. = 90.
- 8-й „ У. $t^0=38^{\circ}$, р. = 72. Выдѣленія, взятая изъ полости матки на шарикахъ ваты, съ запахомъ и съ маленькими кусочками измѣненной ткани. Тампонация; $t^0=37.5$, р. = 72; в. $t^0=38.3$, р. = 90. Тампонация.
- 9-й „ У. $t^0=37.2$, р. = 78. Удалены тампоны. Днемъ $t^0=38.2$, р. = 86; в. $t^0=37.9$, р. = 74.
- 10-й „ У. $t^0=37.4$, р. = 72. Матка маленькая, плотная, подвижная, нечувствительная. Выдѣленія слегка желтоваты, безъ запаха. Вычищена полость матки; в. $t^0=38.1$, р. = 72.
- 11-й „ У. $t^0=37.4$, р. = 76. Выдѣленія слегка пахнутъ и съ кусочками измѣненной ткани. Тампонация; в. $t^0=36.8$, р. = 76. Удалены тампоны.
- 12-й „ У. $t^0=36.9$, р. = 70; в. $t^0=36.6$, р. = 68.

- 13-й день. У. $t^0 = 36.6$; в. $t^0 = 36.3$. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны.
 14-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 60; в. $t^0 = 37$, р. = 70.
 15-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 64; Здорова.

№ 38. (№ 559).

Шелагія М., 18 лѣтъ, первородящая. Беременность нормальная. Роды продолжались 13 часовъ. Въ послѣдовомъ періодѣ кровотеченіе: ручное отдѣленіе послѣда.

Послѣродовое состояніе.

- 1—5 дни. У. $t^0 = 37.3$ — 37.4 , р. = 80—88; веч. $t^0 = 37.2$ — 37.7 , р. = 78—84. Болѣзnenныя схватки.
 6-й день. У. $t^0 = 37.8$, р. = 84. Днемъ $t^0 = 38.5$, р. = 90. Матка велика, зѣвъ пропускаетъ два пальца. Извлечены кусочки послѣда и нѣсколько пристѣночныхъ сгустковъ. Выдѣленія съ запахомъ: *Retentio p. placentae et Endometritis*. Матка промыта растворомъ суплемы; в. $t^0 = 38.1$, р. = 86.
 7-й " У. $t^0 = 39.4$, р. = 120. Матка промыта и удалены кусочки послѣда; веч. $t^0 = 39.7$, р. = 100.
 8-й " У. $t^0 = 38.5$, р. = 100. Выдѣленія гнойнаго характера, цвѣта сливокъ съ красноватой окраской; очень рѣзкій запахъ. Полость матки вытерта шариками и затампонирована. Днемъ $t^0 = 38.4$, р. = 110; веч. $t^0 = 40.3$, р. = 120. Тампонациѣ. $t^0 = 39^0$, р. = 100.
 9-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 90. Тампонациѣ; веч. $t^0 = 37.2$, 37.8 , р. = 88.
 10-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 80. Тампонациѣ; веч. $t^0 = 37.5$, р. = 82.
 11-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 70. Перемѣнены тампоны; веч. $t^0 = 37.1$, р. = 62. Удалены тампоны.
 12-й " У. $t^0 = 36.5$, р. = 62; веч. $t^0 = 37.1$, р. = 68.
 13-й " У. $t^0 = 36.4$. Отдѣленія доброкачественны, безъ запаха, въ незначительномъ количествѣ. Своды свободны. Здорова.

№ 39. (№ 586).

Варвара В., 25-и лѣтъ, первородящая. Беременность нормальная. Роды продолжительны = 39 часовъ: воды прошли при зѣвѣ, открытомъ меньше чѣмъ на палецъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1—3 дни. У. $t^0 = 36.5$, -37^0 , р. 58—78; веч. $t^0 = 37.2$ — 37.8 , р. = 72—82.
 4-й день. У. $t^0 = 36.7$, р. = 66; веч. $t^0 = 39.1$, р. = 90.
 5-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 68. Матка большая, подвижная, безболѣзnenная. Выдѣленія кровянисто-слизистые съ запахомъ. 3' дня $t^0 = 38.6$. *Endometritis*. Тампонациѣ. Въ 8' веч. $t^0 = 38.7$, р. = 78. Ночью $t^0 = 38.2$, р. = 80.

- 6-й день. У. $t^0 = 37.2$; 12' дня $t^0 = 37.9$. Тампонация; тампонъ положенъ неудачно: зѣвъ сократился на столько, что форсировать его не представлялось позволительнымъ. веч. $t^0 = 38.6$, $t^0 = 38.1$, р. = 80.
- 7-й " У. $t^0 = 36.6$, 37.1 . Тамponsы вынуты, они съ запахомъ. Больная чувствуетъ себя хорошо. Сиринцованиe. Днемъ $t^0 = 37.8$; веч. $t^0 = 38.6$, р. = 84. Переведена въ лазаретъ.
- 8-й " У. $t^0 = 37.3$, р. = 80. 2' дня $t^0 = 37.7$, р. = 86. Тампонация. 5' веч. $t^0 = 37.4$, р. = 86; веч. $t^0 = 39^0$, р. = 92.
- 9-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 80. Тампонация. Днемъ $t^0 = 37.8$; 5' в. $t^0 = 38.7$; 9' в. $t^0 = 39.3$. Удалены тамponsы.
- 10-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 76. Матка довольно большая, нечувствительная, въ рѣзкой антейфлексии. Изъ полости выдѣленія бурыя съ рѣзкимъ запахомъ. Тампонация. $t^0 = 37.8$, р. = 78; веч. $t^0 = 38.1$, р. = 80. Удалены тамponsы.
- 11-й " У. $t^0 = 36.5$, р. = 70. Выдѣленія съ значительно меньшимъ запахомъ. Вычищена полость матки сухими и влажными шариками. $t^0 = 36.3$, р. = 68. 5' веч. $t^0 = 36.4$, р. = 66; 8' веч. $t^0 = 37.5$, р. = 76.
- 12-й " Въ 1' ночи на 12-й день потрясающій ознобъ: $t^0 = 40.7$, р. = 132. Больная жалуется на головную боль и чувство недомоганія во всемъ тѣлѣ. У. $t^0 = 39$. 11' у. $t^0 = 40.5$, р. = 128. Чувствительность съ лѣвой стороны матки: *Parametritis sin. incipiens?* Тампонация (по возможности *in situ*). Днемъ $t^0 = 40.6$, р. = 125; веч. $t^0 = 39.5$, р. = 120. Тампонация. $t^0 = 40.1$.
- 13-й " У. $t^0 = 38.8$, р. = 100. Тампонация. $t^0 = 38.3$; веч. $t^0 = 38.2$, р. = 92. Тампонация. $t^0 = 37.6$, р. = 100.
- 14-й " У. $t^0 = 38.8$, р. = 106; 10' утра $t^0 = 40.1$, р. = 110. Внутриматочный тампонъ весь пропитанъ, влагалищный только частью; запахъ? Тампонация. $t^0 = 40.4$, р. = 108. 2' дня: $t^0 = 40.6$, р. = 110. Удалены тамponsы. 5' веч. $t^0 = 40.9$, р. = 120. 8' веч. $t^0 = 40.1$, р. = 120. Изслѣдованиe черезъ наружные покровы: тѣло матки оказывается довольно плотнымъ, на три поперечныхъ пальца выше лонного соединенія. Болѣзnenность у дна и съ лѣвой стороны матки. Животъ не вздути и нечувствителенъ. При внутреннемъ изслѣдованиe—стѣнки влагалища и своды, особенно лѣвый, чувствительны. Выдѣленія изъ полости матки незначительны, жидкo-кровянисты, запаха не замѣтно. Сильная головная боль и жаръ. Больную рвало два раза. Стуль былъ безболѣзnenный. Распространенные сухие свистящіе хрипы въ обоихъ легкихъ. Осторожная тампонация. Коньякъ, вино, ледъ на низъ живота; веч. $t^0 = 38.6$, 38.4 , р. = 110.

- 15-й день. 7' утра $t^0 = 39^0$, р. = 100. Больную разъ вырвало. 11' у. $t^0 = 38.5$, р. = 115. Перемѣнены тампоны, выдѣленій мало. Чувствительность меньше; веч. $t^0 = 39.9$, р. = 120. Удалены тампоны.
- 16-й " У. $t^0 = 38^0$, р. = 92. Ледъ на животъ и спринцовани; веч. $t^0 = 38.2$, р. = 96.
- 17-й " У. $t^0 = 37.3$, р. = 90. Состояніе лучше; веч. $t^0 = 37.8$, р. = 90.
- 18-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 86; веч. $t^0 = 38.6$, р. = 88.
- 19-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 90; 3' дня $t^0 = 38.6$, р. = 120; веч. $t^0 = 40.6$, р. = 120. Изслѣдованіе: шейка хорошо сформирована, нар. зѣвъ едва пропускаетъ палецъ. Тѣло матки немного мягкое, очень чувствительное, въ нормальномъ наклоненіи впередъ. Правый сводъ свободенъ; лѣвый болѣзенъ и напряженъ. Выдѣленія мутные, безъ замѣтного запаха. Ночью $t^0 = 39.7$, р. = 110. Спринцовани, покой, ледъ на животъ, коньякъ.
- 20-й " У. $t^0 = 37.5$, р. = 98; веч. $t^0 = 37.5$, р. = 90.
- 21-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 90; веч. $t^0 = 39.2$, р. = 98.
- 22-й " У. $t^0 = 37.5$, р. = 98; веч. $t^0 = 40^0$, р. = 110. Ночью $t^0 = 39.2$, 38.2, р. = 100.
- 23-й " У. $t^0 = 37.8$, р. = 98; веч. $t^0 = 38.2$, р. = 98. Больная ни на что не жалуется.
- 24-й " У. $t^0 = 38^0$, р. = 90. Изслѣдованіе: шейка матки маленькая, плотная, зѣвъ пропускаетъ кончикъ пальца. Тѣло небольшое плотное въ нормальномъ наклоненіи впередъ, нечувствительное. Подвижность матки ограничена. Въ лѣвомъ сводѣ, соответственно основанию широкой связки—тяжъ толщиною въ два поперечныхъ пальца, идущій по направленію отъ *orificium int. cervicis* къ боковой стѣнкѣ таза слегка только чувствительный: *Parametritis exsudativa sin.* Выдѣленія нормальны по цвѣту, безъ запаха; веч. $t^0 = 39^0$, р. = 90. Покой.
- 25-й " У. $t^0 = 38^0$, р. = 90; веч. $t^0 = 39^0$, р. = 98.
- 26-й " У. $t^0 = 37.5$, р. = 98; веч. $t^0 = 39.7$, р. = 106.
- 27-й " У. $t^0 = 38^0$, р. = 92; веч. $t^0 = 39.7$, р. = 98.
- 28-й " У. $t^0 = 36.9$, р. = 80; веч. 37.9, р. = 80.
- 29-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 92; веч. $t^0 = 38.4$, р. = 100. Чувствуетъ себя удовлетворительно.
- 30-й " У. $t^0 = 38^0$, р. = 96. Внутреннее изслѣдованіе обнаружило то-же, что раньше; в. $t^0 = 38.5$, р. = 100.
- 31-й " У. $t^0 = 36.7$, р. = 88; веч. $t^0 = 38^0$, р. = 90. Ни на что не жалуется.
- 32-й " У. $t^0 = 37.5$, р. = 92; веч. $t^0 = 39^0$, р. = 96. Низъ живота безболѣзенчный.
- 33-й " У. $t^0 = 37.6$, р. = 86; веч. $t^0 = 37.9$, р. = 86.
- 34-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 78; веч. $t^0 = 37.6$; р. = 84. Чувствуетъ себя хорошо.

35-й день. У. $t^0 = 36.8$, р. = 74; веч. $t^0 = 37.4$, р. = 76.
 36-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 62; веч. $t^0 = 37^0$, р. = 60. Халатъ.
 37-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 66; веч. $t^0 = 36.6$, р. = 68. Внутрен-
 нее изслѣдованіе обнаружило нечувствительный тяжъ
 съ лѣвой стороны матки.

Въ приведенномъ случаѣ слѣдуетъ отмѣтить слѣдующее. Первые пять тампонацій, т. е. до 11-го дня включительно, не дали замѣтнаго улучшенія въ смыслѣ возвращенія t^0 къ нормѣ, но и не дали замѣтнаго ухудшенія состоянія. Послѣднее имѣло мѣсто въ ночь на 12-й день: безъ видимой причины, послѣ того какъ въ теченіе сутокъ температура держалась нормальною, появился ознобъ съ t^0 40.7 и пульсомъ 132; вслѣдъ за этимъ стали выступать явленія лѣвосторонняго параметрита. Приписать это осложненіе тампонаціи нѣтъ основанія, такъ какъ въ теченіе предшествовавшихъ сутокъ съ липшимъ болѣніемъ не тампонировалась и t^0 была нормальною. Примѣненная при явленіяхъ параметрита тампонація, не дала опредѣленныхъ результатовъ: первыя 3—4 тампонаціи (12-й и 13-й дни) какъ будто улучшали состояніе, судя по температурѣ; зато послѣднія 3 тампонаціи (14-й и 15-й дни) скорѣе повышали температуру. Въ общемъ теченіе параметрита не было изъ тяжелыхъ: ни нагноенія, ни сильного распространенія процесса не было, и болѣнія, хотя съ остатками инфильтрата, но перестала лихорадить на 34-й день, а встала на 36-й день послѣ родовъ.

№ 40. (№ 593).

Любовь Ж., 35-ти лѣтъ, 8-мъ ребенкомъ. Прежніе роды и настоящая беременность нормальны. Настоящіе роды продолжались 48 часовъ: раннее отхожденіе водъ. Ребенокъ (вѣсъ 4830 grm.) извлеченъ щипцами живой, съ ссадинами на головкѣ.

Послѣ родовъ.

- 1-й день. Веч. $t^0 = 37.2$, р. = 86.
 2-й " У. $t^0 = 37.3$, р. = 88; веч. 37.6, р. = 80. Болѣзnenность
 внизу живота.
 3-й " У. $t^0 = 37.9$, р. = 94. Матка плотная, чувствительная.
 Отдѣленія съ запахомъ и съ кровяными сгустками:
Endometritis; веч. $t^0 = 38.5$, р. = 80.
 4-й " У. $t^0 = 37.6$, р. = 86; веч. $t^0 = 38.7$, р. = 96. Тампонація.
 $t^0 = 38.2$.
 5-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 64. Тампонація; веч. $t^0 = 37.9$.
 6-й " У. $t^0 = 37.3$, р. = 70. 11' у. $t^0 = 38^0$, р. = 76. Тампонація;
 веч. $t^0 = 37.4$, р. = 70.
 7-й " У. $t^0 = 37.5$, р. = 75. Тампонъ вынутъ; 3' дня $t^0 = 38$;
 веч. $t^0 = 37.5$, р. = 80.
 8-й " У. $t^0 = 37.8$, р. = 78. Тампонація; веч. $t^0 = 38.1$, р. = 80.
 9-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 74. 11' у. $t^0 = 37.7$. Тампонація; веч.
 $t^0 = 38.1$, р. = 78. Удалены тампоны.
 10-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 72. Спринцовани; веч. $t^0 = 38$, р. = 80.

- 11-й день. У. $t^0=37.3$, р.=70; веч. $t^0=37.4$, р.=75. Отдѣленія обильны, безъ запаха.
 12-й " У. $t^0=37^{\circ}$, р.=72; веч. $t^0=37.4$, р.=76.
 13-й " У. $t^0=36.5$, р.=70; днемъ $t^0=36.8$, р.=72. Здорова.
 NB. У ребенка развилось на головкѣ рожистое воспаленіе. Умеръ на 12-й день.

№ 41. (№ 643).

Федосія А., 22-хъ лѣтъ, первородящая. Беременность нормальная; роды преждевременные; продолжительность ихъ 23 часа. Ruptura perinei—швы.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0=37.4$, р.=78; веч. $t^0=37.9$, р.=102.
 2-й " У. $t^0=37^{\circ}$, р.=84; веч. $t^0=38.1$, р.=94. Болѣзньность около швовъ.
 3-й " У. $t^0=37^{\circ}$, р.=92; веч. $t^0=39^{\circ}$, р.=104.
 4-й " У. $t^0=36.7$, р.=92. Швы не заросли, нагноились; на мѣстѣ разрыва налетъ, который стерть ватными шариками и смазанъ t-га Jodi; веч. $t^0=38.9$, р.=106. *Ulcera puerper.*
 5-й " У. $t^0=37.2$, р.=80. Рана замѣтно очищается; веч. $t^0=38.3$, р.=84.
 6-й " У. $t^0=37.2$, р.=72. Всѣ швы разошлись; поверхность гранулируетъ. Шейка на своей поверхности около цервикального канала покрыта ссадинами и кровоподтеками. Полость матки небольшая; отдѣленія гнойныхъ, смѣшанныхъ съ кровью: *Endometritis*. Тампонада; веч. $t^0=38^{\circ}$, р.=86; веч. удалены тампоны; запахъ незначительный. Спринцованиі.
 7-й " У. $t^0=36.4$, р.=80. Матка довольно плотная, подвижная, нечувствительная. Своды свободны. Выдѣленія изъ полости матки буро-коричневыя, запаха особенного не замѣтно. Стѣнки рукава менѣе гиперемированы; рана довольно чиста. Тампонада; веч. $t^0=37^{\circ}$, р.=76. Удалены тампоны.
 8-й " У. $t^0=37^{\circ}$, р.=78. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны; вech. $t^0=37^{\circ}$, р.=74.
 9-й " У. $t^0=36.9$, р.=70. Состояніе хорошее. Халатъ; вech. $t^0=37^{\circ}$, р.=76.
 10-й " У. $t^0=36.8$, р.=76; веч. $t^0=37.2$, р.=80.
 11-й " $t^0=36.5$, р.=80. Здорова.

№ 42. (№ 656).

М. Г., 28-ми лѣтъ, первородящая. Беременность нормальная. Роды продолжительные = 57 часовъ: раннее отхожденіе водъ. Endometritis sub partu: Forceps. Ruptura perinei—suturae. Околоплодная вода грязна съ запахомъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0=37^0$, р.=70; вech. $t^0=38.5$, р.=76.
 2-й " У. $t^0=36.8$, р.=80; вech. $t^0=38.4$, р.=100. Жалуется на боли внизу живота.
 3-й " У. $t^0=38^0$, р.=90. Матка нѣсколько болѣзnenная. Выдѣленій не много, съ запахомъ; в. $t^0=39.1$, р.=116.
 4-й " У. $t^0=38.4$, р.=96. Изслѣдованіе: Швы всѣ разошлись. Раневая поверхность покрыта омертвѣлыми клочьями зеленоватаго цвѣта. Шейка матки дряблая, не сформирована, покрыта такими-же омертвѣлыми клочьями. Выдѣленія изъ полости матки грязныя, съ зеленовато-бурыми хлопьями и съ крайне рѣзкимъ запахомъ: *Ulcer a puerperalis et Endometritis*. Тампонациѣ; вech. $t^0=37.8$, р.=80. Тампонациѣ; $t^0=37.6$, р.=80.
 5-й " У. $t^0=36.8$, р.=78. Шейка очистилась, выдѣленія еще съ запахомъ. Тампонациѣ; вech. $t^0=37.6$, р.=76. Тампонациѣ; $t^0=37.5$, р.=72.
 6-й " У. $t^0=37.1$, р.=74. Удалены тампоны. Поверхность разрыва на промежности очищается. Спринцованиѣ; вech. $t^0=37.4$, р.=70.
 7-й " У. $t^0=37.4$, р.=72. Чувствительности нигдѣ нѣть. Выдѣленія, взятые на шарикахъ изъ влагалища, грязноваты, запахъ? Мѣсто разрыва на промежности очистилось и покрылось здоровыми грануляціями; вech. $t^0=37.6$, р.=80.
 8-й " У. $t^0=36.9$, р.=86; вech. $t^0=37.1$, р.=84. Состояніе хорошее.
 9-й " У. $t^0=37.2$, р.=72. Изслѣдованіе: матка плотная, подвижная. Шейка хорошо сформирована; каналъ едва пропускаетъ палецъ. Своды свободны. Выдѣленія нормальны; вech. $t^0=37.6$, р.=78.
 10-й " У. $t^0=36.5$, р.=72; вech. $t^0=37.5$, р.=76.
 11-й " У. $t^0=36.7$, р.=76; вech. $t^0=37.5$, р.=68.
 12-й " У. $t^0=37^0$, р.=80; вech. $t^0=37.6$, р.=80. Халатъ.
 13-й " У. $t^0=36.9$, р.=66; вech. $t^0=36.9$, р.=68.
 14-й " У. $t^0=36.7$, р.=62; Здорова.

№ 43. (№ 661).

Евдокія Н., 20-ти лѣтъ, первородящая. Беременность и роды нормальные. Продолжительность родовъ 14 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1—2 дни. У. $t^0=36.9$, -37^0 , р.=68—70; вech. $t^0=36.8$, р.=68—80.
 3-й " У. $t^0=36.8$, р.=68; вech. $t^0=39.1$, р.=100.
 4-й " У. $t^0=38^0$, р.=96. Матка плотная, средней величины, нечувствительная; выдѣленій мало, съ небольшимъ запахомъ. Веч. $t^0=39.2$, р.=102. Изслѣдованіе: матка довольно большая, вялая; шейка плохо сфор-

- мирована. Въ полости матки выдѣленій довольно много, мутны, красноватаго цвѣта съ небольшимъ запахомъ; своды свободны: *Endometritis*. Тампонація; $t^0 = 38.4$.
- 5-й день. У. $t^0 = 37.7$, р. = 72. Тампоны пропитаны; запахъ выдѣленій небольшой. Во время вычищенія матки шариками оттуда получилось небольшое кровоточеніе, которое прекратилось при тампонації. $t^0 = 38.8 - 38.6$, р. = 76. Веч. $t^0 = 39^0$, р. = 76. Тампонація; матка уменьшилась и стала нѣсколько плотнѣе.
- 6-й „ У. $t^0 = 37.2$, р. = 70. Удалены тампоны. Выдѣленія по цвѣту и запаху не представляютъ уклоненій отъ нормы. Спринцованиѣ; веч. $t^0 = 37.8$, р. = 66.
- 7-й „ У. $t^0 = 37.3$, р. = 66; веч. $t^0 = 37.5$, р. = 68.
- 8-й „ У. $t^0 = 37^0$, р. = 60; веч. $t^0 = 37.3$, р. = 66. Халать.
- 9-й „ У. $t^0 = 37^0$, р. = 62; веч. $t^0 = 37.3$, р. = 68. Здорова.

При вычищеніи полости матки шариками получилось изъ дряблой матки небольшое кровоточеніе, которое прекратилось послѣ вложенія рыхлого тампона (5-й день). Рядомъ съ этимъ слѣдуетъ отмѣтить наступившее послѣ этой тампонаціи повышение t -ы до 39^0 , но постепенное и безъ озноба. На общее теченіе болѣзни это осложненіе вліянія не имѣло.

№ 44. (666).

Марія В., 21 года, первородящая. Беременность и роды нормальные. Продолжительность родовъ 18 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0 = 37.1$, р. = 60; веч. $t^0 = 37.2$, р. = 56.
- 2-й „ У. $t^0 = 37^0$, р. = 56; веч. $t^0 = 37.1$, р. = 60.
- 3-й „ У. $t^0 = 36.9$, р. = 70; веч. $t^0 = 38.2$, р. = 80.
- 4-й „ У. $t^0 = 37.3$, р. = 68; веч. $t^0 = 38.1$, р. = 78. Изслѣдованіе. Матка довольно большая, вялая; шейка открыта и плохо сформирована. Изъ полости матки удалено довольно большое количество плодныхъ оболочекъ. Выдѣленія съ запахомъ. Своды свободны. *Retentio per velamentorum et Endometritis*. Тампонація. $t^0 = 37.7$.
- 5-й „ У. $t^0 = 37.2$, р. = 72. Перемѣнены тампоны. Вмѣстѣ съ внутриматочнымъ тампономъ вышли приставшіе къ послѣднему кусочки оболочекъ. $t^0 = 37.4$; веч. $t^0 = 39^0$, р. = 78. Тампонація, $t^0 = 37.8$.
- 6-й „ У. $t^0 = 37.1$, р. = 70. Удалены тампоны. Выдѣленія безъ запаха; вech. $t^0 = 37.3$, р. = 72.
- 7-й „ У. $t^0 = 36.9$, р. = 70; веч. $t^0 = 37.3$, р. = 70.
- 8-й „ У. $t^0 = 37^0$, р. = 72; веч. $t^0 = 37.3$, р. = 72.
- 9-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 72. Здорова.

№ 45. (690).

Евдокія А., 19 лѣтъ, второродящая. Беременность и роды нормальны; продолжительность послѣднихъ 6 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0 = 36.8$, р.=66; веч. $t^0 = 38.8$, р.=100. Дно матки болѣзненно. Болѣзненные схватки.
- 2-й " У. $t^0 = 37^{\circ}$, р.=76. 2' дня. Ознобъ: $t^0 = 39.9$, р.=120; веч. $t^0 = 39.3$, р.=106. Шейка не сформирована, дрябла; по бокамъ шейки маленькие желтые, довольно твердые пузыречки. По стѣнкамъ влагалища разсѣянная зернистая шероховатость. Тѣло матки плотное, болѣзненное, подвижное, въ антефлексіи. Своды свободны. Выдѣленія мутны, съ небольшимъ запахомъ. Очень болѣзненные схватки. *Endometritis et metritis*. Тампонация. $t^0 = 38.6$.
- 3-й " У. $t^0 = 37.3$, р.=90. Схватки рѣже и не такъ болѣзнены. Тампоны съ рѣзкимъ запахомъ. Тампонация. $t^0 = 39^{\circ}$, р.=96; веч. $t^0 = 39.8$, р.=102. Удалены тампоны, запахъ меньшій. Матка плотная, подвижная, въ антефлексіи, чувствительная. Своды свободны. Рѣзкая гиперестерія въ области внутренняго зѣва: при прощеленіи черезъ него небольшихъ ватныхъ шариковъ, онъ быстро сокращается и закрывается на столько, что не пропускаетъ шарика. Но при медленномъ постепенномъ и осторожномъ надавливаніи зѣвъ медленно раскрывается и пропускаетъ черезъ себя шарикъ и тампонъ. Тампонация; $t^0 = 38$.
- 4-й " У. $t^0 = 36.7$, р.=84. Тампонация. Чувствительность матки нѣсколько меньше; гиперестезія зѣва та-же. $t^0 = 36.8$, р.=82; веч. $t^0 = 37.8$. Тампонация. $t^0 = 38^{\circ}$. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны. Чувствительность матки незначительная. У. $t^0 = 36.8$, р.=70. Оставлена безъ тампоновъ. Согрѣвающій компрессъ на животъ. Днемъ $t^0 = 37^{\circ}$, р.=80; веч. $t^0 = 38.6 - 39^{\circ}$, р.=90. Схватки болѣзненные.
- 5-й " У. $t^0 = 37.1$, р.=76; веч. $t^0 = 37.4$, р.=74.
- 6-й " У. $t^0 = 36.7$, р.=70; веч. $t^0 = 37.2$, р.=72. Жалобъ на боли внизу живота нѣть.
- 7-й " У. $t^0 = 36.2$, р.=68. Состояніе хорошее. Матка небольшая плотная, подвижная, нечувствительная, въ нормальному наклоненіи впередъ. Своды свободны. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны; веч. $t^0 = 37^{\circ}$, р.=68.
- 9-й " У. $t^0 = 36.5$, р.=70; веч. $t^0 = 37^{\circ}$, р.=80.
- 10-й " У. $t^0 = 36.6$, р.=70. Здорова.

№ 46. (699).

Любовь Н., 33-хъ лѣтъ, IV-рага. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ 11 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

1—5 дни. $t^0 = 37.9 - 37.5$, р.=64—84.

- 6-й день У. $t^0 = 37.4$, р. = 86. Внутреннее исследование: шейка формируется хорошо, но канал свободно проходим для пальца. В полости матки довольно большое количество плодовых оболочек и кровяных сгустков, которые въ нѣсколько приемовъ удалены оттуда пальцемъ. Выдѣленія съ запахомъ. *Retentio p. velamentorum et Endometritis*. Днемъ $t^0 = 40.4$, р. = 124 (Ознобъ смѣнившійся потомъ). Веч. $t^0 = 37.6$, р. = 88. Ночью $t^0 = 38.6$, р. = 100.
- 7-й „ У. $t^0 = 38.1$, р. = 90. Днемъ $t^0 = 39^0$; веч. $t^0 = 38.1$, р. = 84. Вн. исследование: шейка довольно большая, не совсѣмъ сформированная; зѣвъ наружный и внутренний легко пропускаютъ палецъ. Въ полости матки старые кровяные сгустки съ рѣзкимъ запахомъ. Тѣло матки довольно большое, средней плотности, подвижное, нечувствительное, въ норм. наклоненіи впередъ. Своды свободны. Тампонация; $t^0 = 39^0 - 39.4$, р. 94.
- 8-й „ У. $t^0 = 38.2$, р. = 78. Тампонация; веч. $t^0 = 38.2$, р. = 70. Шейка большая дряблая, очень кровоточивая. Тѣло матки тоже дряблое; выдѣленія, взятая на шарикахъ изъ полости матки, кровянисты, съ едва замѣтнымъ запахомъ. Оставлена безъ тампоновъ; $t^0 = 38^0$, р. = 74.
- 9-й „ У. $t^0 = 38^0$, р. = 74. Запахъ выдѣленій. Тампонация. Днемъ $t^0 = 38^0$; веч. $t^0 = 38.5$, р. = 90. Небольшая чувствительность и колотье въ правой паховой области. Удалены тампоны. Покой, ледь на животъ, спринцоватъ; $t^0 = 38.5$, р. = 80.
- 10-й „ У. $t^0 = 37.5$, р. = 78. Выдѣленія изъ полости съ запахомъ. Чувствительность въ правомъ сводѣ исчезла. Тампонация. Черезъ 2 часа ознобъ: $t^0 = 39.9$, р. = 100; веч. въ 8': $t^0 = 39.2$, р. = 100. Удалены тампоны. Матка нечувствительна, плотна, подвижна.
- 11-й „ У. $t^0 = 37.5$, р. = 98. Выдѣленія съ запахомъ: вычищена матка шариками. В. $t^0 = 37^0$, р. = 80.
- 12-й „ У. $t^0 = 37^0$, р. = 74; веч. $t^0 = 37^0$, р. = 72. Выдѣленія безъ запаха.
- 13-й „ У. $t^0 = 37.1$, р. = 74. Вычищена матка шариками: веч. $t^0 = 37^0$, р. = 70.
- 14-й „ У. $t^0 = 36.7$, р. = 70; веч. $t^0 = 36.7$, р. = 62.
- 15-й „ $t^0 = 36.9$, р. = 70. Здорова.

№ 47. (№ 849.)

Дарья Л., 33 лѣтъ, девятая беременность. Послѣдніе роды окончены операцией. Въ теченіе настоящей беременности—обильная щекоть бѣли. Тазъ плоскій ракитический; conj. diag. = 9.5. Очень слабы боли; зеленоватыя бѣли съ примѣсью крови. t^0 sub partu = 38.3, р. = 120. *Endometritis sub partu. Forceps. Extractio*

placentae manualis. Атоническое кровотечение—тампонада. Продолжительность родовъ 61 часъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0 = 37,1$, р. = 92; в. $t^0 = 37,1$, р. = 72. Больную рвало нѣсколько разъ.
- 2-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 80; в. $t^0 = 37,5$, р. = 74. Жалуется на одышку, которую страдала и во время беременности.
- 3-й " У. $t^0 = 37,3$, р. = 78; в. $t^0 = 38,7$, р. = 84. Выдѣленія буроватыя, съ запахомъ: *Endometritis*.
- 4-й " У. $t^0 = 39,8$, р. = 102. Изслѣдованіе: полость матки обширна; небольшой запахъ отдѣленій; на шарикѣ куски отпадающей оболочки. Тампонада. $t^0 = 38,2 - 37,9$, р. = 100; в. $t^0 = 39^0$, р. = 100. Ночью $t^0 = 38,2$, р. = 92.
- 5-й " Въ 6 ч. утра—ознобъ: $t^0 = 39,7$, р. = 120. Удалены тампоны; они мало пропитаны; изъ полости матки выдѣлился рыхлый свертокъ. Болѣй внизу живота нѣть. Тампонада. $t^0 = 39,2 - 38,8$, р. = 100 (веч.). Переведена въ лазаретъ. Удалены тампоны. Изслѣдованіе: шейка большая, плотная. Съ обѣихъ сторонъ надрывы, доходящіе до сводовъ; на передней губѣ и нѣсколько спраѣа тоже надрывъ, но менѣе глубокій. Стѣнки рукава дряблы. Тѣло матки большое, плотное, подвижное, въ нормальномъ наклоненіи впередъ, мало чувствительное. Своды свободны. Выдѣленія необильны съ небольшимъ запахомъ. Тампонада. $t^0 = 38,3$.
- 6-й " У. $t^0 = 37,5$. р. = 76. Тампоны всѣ пропитаны. Запаха, особеннаго не замѣтно. Вычищена полость матки шариками. Оставлена безъ тампоновъ; в. $t^0 = 38,5$, р. = 90.
- 7-й " У. $t^0 = 37,9$, р. = 88. Выдѣленія обильны, грязно-бураго цвѣта, съ запахомъ. Тампонада; в. $t^0 = 38,2$, р. = 84. Тампонада. $t^0 = 37,9$, р. = 76.
- 8-й " У. $t^0 = 37,7$, р. = 84. Тампонада; в. $t^0 = 38,3$, р. = 82. Тампонада. $t^0 = 37,9$, р. = 80.
- 9-й " У. $t^0 = 37,6$, р. = 86. Тампонада; в. $t^0 = 37,7$, р. = 80. Удалены тампоны; запаха нѣть.
- 10-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 84. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны; вѣч. $t^0 = 37,6$, р. = 90.
- 11-й " У. $t^0 = 36,8$, р. = 70; в. $t^0 = 37,1$, р. = 86. Ни на что не жалуется. Состояніе хорошее.
- 12-й " $t^0 = 36,6$, р. = 72. Здорова.

№ 48. (№ 860).

Александра Б., 22 лѣтъ, первородящая. Беременность и роды нормальные. Продолжительность родовъ 13 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0 = 37,4$, р. = 78; в. $t^0 = 37,1$, р. = 80.
- 2-й " У. $t^0 = 37,2$, р. = 82; в. $t^0 = 38,1$, р. = 98.

- 3-й день. У. $t^0 = 39.0$, р. = 106. Въ 11' дня $t^0 = 38.6$. Матка немного велика; отдѣленія обильны съ легкимъ запахомъ. *Endometritis*. Матка промыта суперомъ $1/2000$, затѣмъ водою въ 40^0 . 2' дня $t^0 = 39.9$, р. = 112 (ознобъ). В. $t^0 = 40^0$, р. = 110. 12' ночи $t^0 = 40.2$, р. = 120.
- 4-й „ У. $t^0 = 39.1$, р. = 108. Жалуется на головную боль. Отдѣленій немного, слизистыя, съ сильнымъ запахомъ. На лѣвой малой губѣ поверхностная трещина, покрытая желтоватымъ налетомъ. Матка промыта борнымъ растворомъ и затампонирована юдоформной марлей. Днемъ $t^0 = 39.5$, р. = 124; в. $t^0 = 40.2$, р. = 120.
- 5-й „ У. $t^0 = 38.7$, р. = 110. Удалены тампоны. Матка плотная; отдѣленія кровянисты, въ незначительномъ количествѣ, съ примѣсью гноя; поверхность обѣихъ губѣ шейки представляется сгаженной и покрытой омертвѣвающими массами: *Ulcera colli et Endometritis*. Тампонация; в. $t^0 = 38.2-39.4$, р. = 105. Удалены тампоны. Шейка матки разворочена вслѣдствіе надрывовъ по краямъ; съ лѣвой стороны на мѣстѣ разрыва на шейкѣ—язвенная поверхность. Тѣло матки довольно большое и плотное, нечувствительное, подвижное, въ *anteflexi*'и. Своды свободны. Внутренній зѣвъ съ трудомъ пропускаетъ палецъ. Въ полости ничего особенного ощупать не удалось. Вынутые тампоны съ рѣзкимъ запахомъ. Тампонация. $t^0 = 38.2$, р. = 100.
- 6-й „ У. $t^0 = 37.7-38.1$, р. = 86. Ночью спала хорошо; не тошило, не знибило. На губахъ *herpes*. Отдѣленія обильно стекаютъ черезъ тампонъ на простины; отдѣленія кровянисты. Жалобъ нѣть; низъ живота безболѣзенъ. Вычищена полость матки шариками и оставлена безъ тампоновъ. В. $t^0 = 37.3-38.8$, р. = 80—88.
- 7-й „ У. $t^0 = 37.5$, р. = 82. Выдѣленія обильны, желто-гнѣвного характера. Чувствительности нѣть. Тампонация. $t^0 = 37.2$, р. = 86; в. $t^0 = 38.4$, р. = 86. Тампонация. $t^0 = 38^0$.
- 8-й „ У. $t^0 = 38.1$, р. = 96. Тампонация. Днемъ $t^0 = 38.7$, р. = 104; в. $t^0 = 39.2$, р. = 120. Тампоны пропитаны не цѣликомъ. Въ полости матки небольшая задержка выдѣленій. Чувствительности нигдѣ нѣть. Тампонация. $t^0 = 38.7$.
- 9-й „ У. $t^0 = 37.3-37.9$, р. = 96. Тампонадія. $t^0 = 38.9$, р. = 108; в. $t^0 = 37.9$, р. = 90. Удалены тампоны, запаха не замѣтно. Оставлена безъ тампоновъ.
- 10-й „ У. $t^0 = 37.2$, р. = 68. Выдѣленія, взятые на шарикѣ изъ рукава, безъ запаха и по цвѣту не представляютъ ничего ненормального. Днемъ $t^0 = 39.9$; вѣч.

- $t^o = 40.6$, р. = 120. Въ полости матки задержка выдѣленій—Lochiometra. Выдѣленія желтаго цвѣта, густыя. Матка нечувствительна, подвижна, въ антелефсии. Тампонація. $t^o = 40^o$, р. = 110.
- 11-й день. У. $t^o = 38.2$, р. = 90. Изъ полости матки по удаленіи тампоновъ вытекло около 10—15 с.с. желтовато-буроватой жидкости, безъ запаха. Тампонація; в. $t^o = 37.8$, р. = 88.
- 12-й " У. $t^o = 36.6$, р. = 70. Удалены тампоны. Выдѣленія на видъ нормальны; в. $t^o = 36.5$, р. = 74.
- 13-й " У. $t^o = 36.4$, р. = 68; в. $t^o = 37.1$, р. = 86.
- 14-й " 36.6, р. = 72; в. $t^o = 36.7$, р. = 76. Изслѣдованіе ничего ненормального не обнаружило.
- 15-й " $t^o = 36.7—37.8$, р. = 68. Здорова.

Два промыванія матки, примѣненные въ началѣ болѣзни, сопровождались оба повышениемъ t -ы: съ 39.1 до 40.2, при чемъ первое повышение сопровождалось ознобомъ. Оба эти повышения не кратковременные, а продолжали держаться въ теченіе цѣлыхъ сутокъ.—Далѣе слѣдуетъ отмѣтить рѣзкое, хотя постепенное, повышеніе t -ы до 40.6 на 10-й день. Повышеніе это наступило какъ разъ въ то время, когда больная въ теченіе сутокъ оставалась безъ тампоновъ. Констатированная Lochiometra обусловила это повышеніе, и послѣдующія тампонаціи быстро понизили t -у, устранивъ непроходимость канала.

№ 49. (№ 884).

Александра К., 22-хъ лѣтъ, первородящая. Во время беременности страдала бѣлями зелено-желтаго цвѣта. Роды нормальные; продолжительность ихъ 20 ч.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^o = 37.6$, р. = 80; веч. $t^o = 37.8$, р. = 90. Матка слегка чувствительная.
- 2-й " У. $t^o = 37.7$, р. = 80; веч. $t^o = 38.1$, р. = 96. Кашель.
- 3-й " У. $t^o = 37.5$, р. = 80. Днемъ $t^o = 38.8$, р. = 100. Матка немного чувствительная. Шейка еще не сформирована. Тѣло матки довольно плотное, средней величины, подвижное, въ нормальномъ наклоненіи впередъ. Своды свободны. Внутренній зѣвъ пропускаетъ свободно палецъ. Въ полости имѣются кровяные сгустки и маленькие кусочки, въ горошину и больше, послѣдовой ткани, которые по мѣрѣ возможности удалены пальцемъ. Выдѣленія мутныя съ небольшимъ запахомъ. Endometritis. Тампонація.
- 4-й " $U. t^o = 37.5$, р. = 92. Тампонація; $t^o = 40^o$, р. = 128; $t^o = 40.4$, р. = 120; веч. $t^o = 40^o$, р. = 120. Матка плотная, небольшая и нечувствительная. Своды безболѣзны. Тампоны все пропитаны. При вычищении полости шариками, оттуда извлечены небольшой ку-

сокъ тонкихъ плодовыхъ оболочекъ. Кашель. Сухие трескучие хрипы, разсѣянные по обоимъ легкимъ. Въ правой грудной железѣ отдельные болѣзненные узлы. Пульсъ = 120, довольно полный. Тампонадія; $t^0 = 39^{\circ}$.

5-й день. У. $t^0 = 38.1$, р. = 92. 10' у. $t^0 = 39.9$. По удаленіи тампоновъ изъ полости матки вылилось небольшое количество бурой безъ рѣзкаго запаха жидкости. Тампонадія; 1' дня $t^0 = 38^{\circ}$, р. = 100; веч. $t^0 = 40^{\circ}$, р. = 134. Матка плотная совершенно безболѣзненная, подвижная. Своды нечувствительны. Узлы въ правой грудной железѣ нѣсколько менѣе болѣзненны. Тампонадія. $t^0 = 39.6$ —38.9, р. = 100.

6-й " У. $t^0 = 38.6$, р. = 96. 10' у. $t^0 = 39.5$, р. = 120. Правая грудь мягка, безболѣзненна; узлы не прощупываются. Изъ полости матки выдѣленія гноинаго характера. Тампонадія. Общее состояніе напоминаетъ *Influenz'y*: сухой кашель, разсѣянные *ronchi sibilantes*; *herpes labialis*, насморкъ, боль во всѣхъ членахъ. Селезенка выходитъ на $1\frac{1}{2}$ пальца за край ложныхъ реберъ. $t^0 = 40.4$, р. = 140 довольно полный; в. $t^0 = 40.2$, р. = 120. Тампоны пропитаны выдѣленіями; въ полости матки выдѣленій очень мало. Запаха не замѣтно. Общее состояніе то-же. Оставлена безъ тампоновъ.

7-й " У. $t^0 = 38.8$, р. = 108; в. $t^0 = 38.9$, р. = 110.

8-й " У. $t^0 = 36.5$, р. = 105. Выдѣленія изъ полости желтаго цвѣта, довольно густыя, запаха незамѣтно. Чувствительности внизу живота нѣть. Тампонадія. Кашель и общее состояніе по прежнему; в. $t^0 = 38.2$, р. = 96. Удалены тампоны.

9-й " У. $t^0 = 37.6$, р. = 84; в. $t^0 = 38.7$, р. = 86. Выдѣленія по цвѣту нормальны и безъ запаха.

10-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 80; в. $t^0 = 38.7$, р. = 88. Общее состояніе лучше.

11-й " У. $t^0 = 37^{\circ}$, р. = 80; в. $t^0 = 39.3$, р. = 92. У ребенка блenorрея глазъ.

12-й " У. $t^0 = 37.3$, р. = 80; в. $t^0 = 39.3$, р. = 118. (легкое познабливаніе).

13-й " У. $t^0 = 39^{\circ}$, р. = 100; в. $t^0 = 38.7$, р. = 108. Жалобъ на боли въ животѣ нѣть.

14-й " У. $t^0 = 37.6$, р. = 90. Выдѣленія изъ полости матки слизисто-гноинага, запаха незамѣтно. Матка маленькая нечувствительная. Тампонадія; в. $t^0 = 38^{\circ}$, р. = 90. Перемѣнены тампоны. $t^0 = 37.5$, р. = 84.

15-й " $t^0 = 36.6$, р. = 60. Оставлена безъ тампоновъ; вѣч. $t^0 = 37.6$, р. = 80.

16-й " У. $t^0 = 38.1$, р. = 86; в. $t^0 = 38.5$, р. = 92. Тампонадія. 11' н. $t^0 = 40.1$, р. = 124 (легкое познабливаніе).

- 17-й день. У. $t^0 = 37.7 - 36.7$, р. = 70. Тампонация. 2' дня $t^0 = 39.3$, р. = 98. 4' дня $t^0 = 36.8$, р. = 92; в. $t^0 = 39.6$, р. = 100. Удалены тампоны. $t^0 = 38.8$.
- 18-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 80. Ни на что не жалуется. Чувствительности никогда не было; в. $t^0 = 38.3$, р. = 84.
- 19-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 78, в. $t^0 = 37.7$, р. = 80.
- 20-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 78; в. $t^0 = 37.9$, р. = 78.
- 21-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 66; в. $t^0 = 37.7$, р. = 80. Внутреннее исследование ничего ненормального не обнаружено. Выделение очень мало, без запаха. Халатъ.
- 22-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 76; в. $t^0 = 37.4$, р. = 70.
- 23-й " $t^0 = 37.3$, р. = 72. Здорова.

Черезъ некоторое время послѣ выписки изъ Института больная опять забеременѣла. До 8-го мѣсяца беременности, т. е. до тѣхъ поръ пока она находилась подъ нашимъ наблюдениемъ, она чувствовала себя довольно хорошо и ни на какія боли или бѣли не жаловалась.

№ 50. (899).

Агриппина П., 35 лѣтъ, з ребенкомъ. Прежнія беременности и роды нормальны. Въ теченіе настоящей беременности отеки ногъ. Роды нормальны; продолжительность ихъ = 3 часа. Непосредственно послѣ родовъ четыре припадка эклампсіи. $t^0 = 37.7$, р. = 78. (1-й день); в. $t^0 = 36.3$, р. = 60.

Послѣродовое состояніе.

- 2—3 дни. $t^0 = 36.7 - 37.3$, р. = 64—72. Припадковъ не было; сознаніе ясное. Бѣлку въ мочѣ не было.
- 4-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 64; в. $t^0 = 38.3$, р. = 74.
- 5-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 72; в. $t^0 = 38^0$, р. = 70.
- 6-й " У. $t^0 = 37.7$, р. = 76; в. $t^0 = 38.3$, р. = 88.
- 7-й " У. $t^0 = 37.7$, р. = 74. Исследованіе: шейка довольно большая, плотная; ovula Nabothi. Тѣло средней величины и плотности, подвижное, нечувствительное. Своды свободны. Выдѣленія изъ полости матки съ замѣтнымъ запахомъ. *Endometritis*. Тампонация. $t^0 = 37.6 - 39.5 - 38.8$, р. = 96; в. перемѣнены тампоны, которые издавали рѣзкій запахъ. $t^0 = 37.8$, р. = 78.
- 8-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 74. Тампонация; в. $t^0 = 37.9$, р. = 82. Тампонация.
- 9-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 84. Тампонация; в. $t^0 = 37.5$, р. = 80. Тампоны съ сильнымъ запахомъ. Тампонация.
- 10-й " У. = 37.2, р. = 78. Тампонация; в. $t^0 = 37^0$, р. = 64. Тампонация (запахъ тампоновъ рѣзкий).
- 11-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 66. Удалены тампоны; запахъ послѣднихъ сильный. Спринцованиіе; в. $t^0 = 37.3$, р. = 70.
- 12-й " У. $t^0 = 38.2$, р. = 86. Выдѣленія съ рѣзкимъ запахомъ; незначительная lochiometra. Тампонация.
- 13-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 60. Удалены тампоны; в. $t^0 = 37^0$, р. = 62.

- 14-й день. У. $t^0 = 37^0$, р. = 68; в. $t^0 = 37.3$, р. = 64.
 15-й " У. $t^0 = 36.5$, р. = 72; в. $t^0 = 36.8$, р. = 72.
 16-й " $t^0 = 36.5$, р. = 70. Здорова.

До 11-го дня больная матка тампонировалась (для чистоты наблюдений) стериллизованной марлей, смоченной и сильно отжатой; съ 12-го дня послѣднія двѣ тампонации производились юдоформной марлей.

№ 51. (№ 930).

Марія Я., 18-ти лѣтъ, первородящая. Беременность нормальная. Воды прошли при зѣвѣ, открытомъ на 2 cm. Продолжительность родовъ = 15 часовъ. Околоплодныя воды грязны.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. $t^0 = 36.9$, р. = 74.
 2-й " У. $t^0 = 36.9$, р. = 80; в. $t^0 = 38.8$, р. = 86.
 3-й " У. $t^0 = 38.3$, р. = 92; в. $t^0 = 38.5$, р. = 92.
 4-й " У. $t^0 = 37.6$, р. = 60. Изслѣдованіе: шейка матки не совсѣмъ еще сформирована; зѣвъ свободно пропускаетъ палецъ. Въ полости матки ничего особенного не прощупывается. Тѣло матки небольшое, плотное, подвижное, нечувствительное, въ нормальномъ наклоненіи впередъ. Своды свободны. Выдѣленія изъ полости безъ запаха, кровянисты, съ примѣсью небольшихъ старыхъ сгустковъ крови. На шейкѣ язвочка желтоватаго цвѣта. *Ulcera*, которая прижжены юдной настойкой; в. $t^0 = 38.9$, р. = 100.
 5-й " У. $t^0 = 37.9$, р. = 86; в. $t^0 = 39.1$, р. = 96. Язвочка на шейкѣ очистилась; выдѣленія изъ полости матки кровянистые, темного цвѣта, съ замѣтнымъ запахомъ. *Endometritis*. Тампонация стериллизованной марлей. Н. $t^0 = 38.9$.
 6-й " У. $t^0 = 38.5$, р. = 86. Тампонация. Шрежній тампонъ пропитанъ и съ запахомъ; в. $t^0 = 38.9$, р. = 100. Тампонация (стерил.); $t^0 = 38.1$, р. = 100.
 7-й " У. $t^0 = 37.5$, р. = 86. Тампонация (стерил.); в. $t^0 = 38^0$, р. = 86. Рѣзкий запахъ. Тампонация (стер.).
 8-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 80. Удалены тампоны; рѣзкий запахъ; в. $t^0 = 38.2$, р. = 100. Спринцовывать.
 9-й " У. $t^0 = 37.5$, р. = 80. Выдѣленія мутны съ запахомъ; *Lochiometra*. Тампонация (юдоформной марлей); в. $t^0 = 37.1$, р. = 82. Удалены тампоны.
 10-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 58. Выдѣленія нормального цвѣта, безъ запаха; в. $t^0 = 37.3$, р. = 64.
 11-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 72; в. $t^0 = 36.9$, р. = 72.
 12-й " У. $t^0 = 36.4$, р. = 68; в. $t^0 = 36.5$, р. = 62. Здорова.

№ 52. (№ 933).

Екатерина М., 39-ти лѣтъ, 6-ые роды. Предшествовавшія беременности и роды нормальны. Въ теченіе послѣдней беременности сильные отеки ногъ и брюшныхъ стѣнокъ; водянка брюшной полости: *vitium cordis*. Роды двойнями; *hydramnion* 2-го плода. *Extractio placenta manualis*. Продолжительность родовъ 17 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0 = 37.1$, р. = 90; в. $t^0 = 37.1$, р. = 80.
- 2-й „ У. $t^0 = 36.4$, р. = 60; в. $t^0 = 37.4$, р. = 72. Отеки уменьшаются.
- 3-й „ У. $t^0 = 37.1$, р. = 72; в. $t^0 = 38.4$, р. = 90.
- 4-й „ У. $t^0 = 37.6$, р. = 84; в. $t^0 = 38^0$, р. = 84. Изслѣдованіе: шейка матки большая, рыхлая, еще не сформирована; тѣло матки большое, довольно мягкое, подвижное, немного чувствительное. Своды свободны. Небольшая чувствительность всего живота. Выдѣленія изъ полости бурыя, съ рѣзкимъ запахомъ. *Endometritis*. Тампонація стерилизованной марлей, $t^0 = 39.6,-38.5$, р. = 86.
- 5-й „ У. $t^0 = 38.6$, р. = 86. Тампоны пропитаны, съ рѣзкимъ запахомъ. Тампонація (стерил. марлей). Обильное отдѣленіе мочи; отеки значительно уменьшаются. Сильное малокровіе. $t^0 = 37.5$, р. = 82; в. $t^0 = 38.6$, р. = 92. Выдѣленія и тампоны съ рѣзкимъ запахомъ. Тампонація юдоформной марлей. $t^0 = 39.6,-37.6$, р. = 70.
- 6-й „ У. $t^0 = 37.2$, р. = 78. Тампоны пропитаны; запахъ тампоновъ, а равно и выдѣленій, взятыхъ изъ полости матки, значительно меньшій противъ вчерашняго. Тампонація (юдоф.); в. $t^0 = 37.6$, р. = 80. Тампонація (юдоф.); $t^0 = 37.5$, р. = 80.
- 7-й „ У. $t^0 = 37.5$, р. = 82. Удалены тампоны: запахъ значительно меньшій; в. $t^0 = 38.9,-39.7$, р. = 92.
- 8-й „ У. $t^0 = 38.5$, р. = 86. Выдѣленія кофейного цвѣта съ незначительнымъ запахомъ. Матка большая, подвижная. Тампонація (юдоф.); $t^0 = 37.9$; в. $t^0 = 38.5$, р. = 90. Тампонація (юдоф.); запахъ почти незамѣтенъ. $t^0 = 37.7$.
- 9-й „ У. $t^0 = 38.6$, р. = 90. Тампонація (юдоф.); $t^0 = 38^0$. в. $t^0 = 38.2$, р. = 90. Удалены тампоны; выдѣленія изъ полости незначительны, запаха не замѣтно. Спринцовывать.
- 10-й „ У. $t^0 = 37^0$, р. = 90; в. $t^0 = 37.2$, р. = 86.

Больная оставалась въ Институтѣ еще девять дней; въ теченіе этого времени со стороны половой сферы никакихъ уклоненій отъ нормы не наблюдалось и t^0 оставалась все время нормальною.

№ 53. (№ 936).

Екатерина М., 24-хъ лѣтъ; IV—пара. Прежнія беременности и роды нормальны. Настоящіе роды продолжительны = 43 часа. *Endometritis sub partu.* $t^0 = 38.9$, $p. = 106$.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0 = 38^0$, $p. = 96$; в. $t^0 = 38.2$, $p. = 90$. Боли внизу живота.
- 2-й " У. $t^0 = 37.4$, $p. = 76$; в. $t^0 = 38.9$, $p. = 92$.
- 3-й " У. $t^0 = 37.7$, $p. = 90$; в. $t^0 = 38.5$, $p. = 100$. Изслѣдованіе: шейка начинаетъ формироваться; тѣло матки средней величины, слегка дряблое, подвижное, нечувствительное, въ нормальномъ наклоненіи впередъ. Своды свободны. Выдѣленія темно-кровянисты, съ рѣзкимъ запахомъ. *Endometritis*. Тампонажа стерилизованной марлей. $t^0 = 38^0$.
- 4-й " У. $t^0 = 37.9—38.5$, $p. = 90$. Тамponsы пропитаны, съ рѣзкимъ запахомъ. Тампонажа (стерил.); $t^0 = 37^0$. Д. $t^0 = 37^0$, $p. = 96$; в. $t^0 = 39.8$, $p. = 104$. Тампонажа (стерил.); $t^0 = 37.8$.
- 5-й " Н. $t^0 = 39.8$; у. $t^0 = 38.2$. Рѣзкій запахъ. Тампонажа (стерил.) $t^0 = 39^0$, $p. = 90$; в. $t^0 = 38.7$, $p. = 98$. Рѣзкій запахъ. Тампонажа (стерил.); $t^0 = 40.1$ (небольшой ознобъ), $p. = 100$.
- 6-й " Н. $t^0 = 37.5$, $p. = 98$; у. $t^0 = 37.9$, $p. = 88$. Удалены тамponsы: рѣзкій запахъ; в. $t^0 = 38.4$, $p. = 92$.
- 7-й " У. $t^0 = 37.7$, $p. = 80$. Запахъ выдѣленій рѣзкій. Тампонажа (іодооф. марлей); в. $t^0 = 37.5$, $p. = 82$. Удалены тамponsы. Выдѣленія, которыми пропитаны тамponsы, почти безъ запаха. Оставлена безъ тампоновъ. Н. $t^0 = 36.9$, $p. = 70$.
- 8-й " У. $t^0 = 36.7$, $p. = 60$; в. $t^0 = 36.7$, $p. = 66$. Выдѣленій мало, безъ запаха.
- 9-й " У. $t^0 = 36.6$, $p. = 68$; в. $t^0 = 36.8$, $p. = 68$.
- 10-й " У. $t^0 = 36.5$, $p. = 70$; в. $t^0 = 36.6$, $p. = 72$. Здорова.

№ 54. (№ 942).

Ксения Ив., 30-и лѣтъ, IV-пара. Послѣ послѣднихъ родовъ долго хворала. Теченіе настоящей беременности и родовъ нормально. Продолжительность родовъ 15 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0 = 37.3$, $p. = 68$; в. $t^0 = 39.3$, $p. = 90$.
- 2-й " У. $t^0 = 37.7$, $p. = 54$; в. при ознобѣ $t^0 = 39.6$, $p. = 96$. Изслѣдованіе: шейка довольно большая, начинаетъ формироваться. Тѣло матки большое, плотное, мало подвижное, немного чувствительное, въ антегрексіи. Какъ въ лѣвомъ, такъ и въ правомъ сводахъ замѣт-

- ная чувствительность и напряженіе. Въ полости матки кровяные сгустки. Выдѣленій мало, кровянисто-шеколадного цвѣта, запахъ небольшой. *Endometritis et Parametritis incipiens bilateralis.* По возможности *in situ* тампонация стерилizedованной марлей. Ночью $t^0 = 39.3$.
- 3-й день. У. $t^0 = 39$, р. = 86. Тампонация (стерил.); $t^0 = 39.7 - 40.1$, р. = 90; в. $t^0 = 40^0$, р. = 76. Тампонация (стерил.); $t^0 = 39.9$.
- 4-й „ У. $t^0 = 38.7$, р. = 82. Тампоны пропитаны. Матка въ антэфлексіи. Въ лѣвомъ сводѣ нѣсколько меньшая чувствительность; правый сводѣ почти безболѣзенъ. Тампонация (стерил.) $t^0 = 37.5$; днемъ $t^0 = 39.5$, веч. $t^0 = 40.1$, р. = 98. Тампонация (стерил.); $t^0 = 39.7$.
- 5-й „ У. $t^0 = 37.9$, р. = 84. Тампоны пропитаны, рѣзкій запахъ. Тампонация (іодоформн. марлей). $t^0 = 39.7 - 38^0$, р. = 84; в. 38^0 . Тампоны удалены; запахъ значительно меньшій. Тампонация (іодоф.); $t^0 = 40.2$, р. = 92, ночью $t^0 = 39.8$, р. = 94.
- 6-й „ У. $t^0 = 38.2$, р. = 86. Удалены тампоны; запахъ незначительный; в. $t^0 = 40^0$, р. = 90.
- 7-й „ У. $t^0 = 39.4$, р. = 90. Матка нѣсколько меньше прежняго. Выдѣленія мутны, запахъ незначительный. Чувствительность меньшая. Тампонация (іодоформн.). $t^0 = 39.8 - 40^0 - 39.7$, р. = 92; в. Тампонация (іодоф.); $t^0 = 39.2$, р. = 92.
- 8-й „ Больная жаловалась ночью на схваткообразныя боли внизу живота. Матка меньше, плотная, шейка крововызыва. Температура у. = 39^0 , р. = 74. Тампонация (іод.); в. $t^0 = 39.7$, р. = 96. Удалены тампоны; запаха не замѣтно.
- 9-й „ У. = 39.6 , р. = 88; в. $t^0 = 39.8$, р. = 120. Тампонация (іодоф.); $t^0 = 38^0$, р. = 92.
- 10-й „ У. $t^0 = 39.3$, р. = 106. Удалены тампоны. Матка въ положеніи anteflexio. Съ лѣвой стороны матки въ области широкой связки небольшая тѣстоватость и чувствительность. Тѣло матки дрябло и кровоточиво. Выдѣленія съ небольшимъ запахомъ. Тампонация (іодоф.); днемъ $t^0 = 39.7$, р. = 100; в. $t^0 = 40^0$, р. = 100. Удалены тампоны. Покой. Ледъ на животъ, возбуждающія, коньякъ.
- 11-й „ У. $t^0 = 38.7$, р. = 78; в. $t^0 = 38.9$, р. = 88.
- 12-й „ У. $t^0 = 38.1$, р. = 98; в. $t^0 = 39.2$, р. = 102. Чувствительности внизу живота нѣть.
- 13-й „ У. $t^0 = 38^0$, р. = 80; в. $t^0 = 39.1$, р. = 90.
- 14-й „ У. $t^0 = 37.5$, р. = 92; в. $t^0 = 37.8$, р. = 90.
- 15-й „ У. $t^0 = 38.5$, р. = 76; в. $t^0 = 39.2$, р. = 90. Животъ впалый нечувствительный.
- 16-й „ У. $t^0 = 36.5$, р. = 78; в. $t^0 = 38.8$, р. = 80.

- 17-й день. У. $t^0 = 36.6$, р. = 70; в. $t^0 = 38.7$, р. = 72. Чувствуеть себя хорошо.
- 18-й „ У. $t^0 = 37^0$, р. = 68. Изслѣдованіе: Матка небольшая, нечувствительная, въ нормальномъ наклоненіи впередъ. Шейка хорошо сформирована. Правый сводъ свободенъ; въ лѣвомъ—небольшое уплотненіе, нечувствительное при давлениі. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны. в. $t^0 = 37.3$, р. = 64.
- 19-й „ У. $t^0 = 36.4$, р. = 64; в. $t^0 = 37.5$, р. = 78.
- 20-й „ У. $t^0 = 36.9$, р. = 64; в. $t^0 = 37^0$, р. = 62. Здорова.

№ 55. (№ 943).

Анна М., 18-ти лѣтъ, первородящая. Беременность нормальная. При родахъ разрывъ промежности—швы. Продолжительность родовъ—31 часъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0 = 37.5$, р. = 98; в. $t^0 = 37.7$, р. = 92.
- 2-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 84; в. $t^0 = 38.5$, р. = 120.
- 3-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 90; в. $t^0 = 37.7$, р. = 98.
- 4-й „ У. $t^0 = 37.1$, р. = 92; в. $t^0 = 38.4$, р. = 114. Швы сняты; промежность не зажила; края раны разошлись. Очищена поверхность разрыва и юдоформъ.
- 5-й „ У. $t^0 = 37.6$, р. = 80; в. $t^0 = 38.4$, р. = 76. Изслѣдованіе: шейка маленькая, зѣвъ проходимъ для пальца. Тѣло небольшое, средней плотности, нечувствительное, подвижное, въ нормальномъ наклоненіи впередъ. Своды свободны. Выдѣленія изъ полости матки кровянисто-мутныя, съ замѣтнымъ запахомъ. Поверхность разрыва довольно чиста. (*Colpitis*) et *Endometritis*. Тампонація юдоформной марлей; $t^0 = 37.9$.
- 6-й „ У. $t^0 = 37^0$. р. = 80. Удалены тампоны; в. $t^0 = 38.1$, р. = 92.
- 7-й „ У. $t^0 = 37.4$, р. = 82. Тампонація; в. $t^0 = 38^0$, р. = 72. Удалены тампоны. Запаха нѣть.
- 8-й „ У. $t^0 = 36.4$, р. = 70; в. $t^0 = 36.9$, р. = 70. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны.
- 9-й „ У. $t^0 = 36.7$. р. = 64; в. $t^0 = 37.3$, р. = 66.
- 10-й „ У. $t^0 = 36.3$. р. = 62; в. $t^0 = 36.5$, р. = 62. Здорова.

№ 56. (№ 956).

Шелагея Ш., 22 лѣтъ, второродящая. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ 16 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1—5 дни. $t^0 = 36.5—37.5$, р. = 70—88.
- 6-й день. У. $t^0 = 38.3$, р. = 88. Выдѣленія слизисто-кровянистые, съ запахомъ: *Endometritis*. Матка промыта сулемой $1/2000$, затѣмъ горячей водой 40^0R и затампони-

- рована. $t^0 = 39.6$, $p. = 108$. В. удалены тампоны $t^0 = 39.6$, $p. = 100$.
- 7-й день. У. $t^0 = 39^{\circ}$, $p. = 98$. Днемъ $t^0 = 39.7$, $p. = 100$. Изслѣдованіе: тѣло матки большое, мягкое, нечувствительное, подвижное, въ нормальномъ наклоненіи впередь. Своды свободны. Выдѣленія бурыя съ запахомъ. Тампонация. $t^0 = 39.2$, $p. = 104$; в. $t^0 = 39.5$, $p. = 92$. Тампонация.
- 8-й „ У. $t^0 = 37.4$, $p. = 84$. Тампоны пропитаны. Шариками извлечены изъ полости куски оболочекъ: *Retentio velamentorum*. Тампонация. $t^0 = 39.4$, $p. = 96$; в. $t^0 = 38.8$, $p. = 92$. Тампонация. $t^0 = 38.6$.
- 9-й „ У. $t^0 = 38.6$, $p. = 100$. Тампонация. $t^0 = 37.7 - 38.2$, $p. = 84$; в. $t^0 = 38.9$. Удалены тампоны.
- 10-й „ У. $t^0 = 38.6$; $p. = 80$. в. $t^0 = 37.8$, $p. = 84$. Выдѣленія безъ запаха, слизисто-кровянистые.
- 11-й „ У. $t^0 = 39.1$, $p. = 86$; в. $t^0 = 40^{\circ}$, $p. = 110$; головная боль. Запоръ; небольшой кашель.
- 12-й „ У. $t^0 = 36.6$, $p. = 74$; в. $t^0 = 37.7$, $p. = 80$. Выдѣленія изъ рукава и изъ полости матки по цвѣту и запаху нормальны. Болей нигдѣ нѣтъ.
- 13-й „ У. $t^0 = 37.5$, $p. = 84$; в. $t^0 = 39^{\circ}$, $p. = 100$. Въ половой сфере не удается констатировать какія - либо уклоненія отъ нормы.
- 14-й „ У. $t^0 = 37.2$, $p. = 80$; в. $t^0 = 37^{\circ}$, $p. = 60$.
- 15-й „ У. $t^0 = 36^{\circ}$, $p. = 92$; в. $t^0 = 37.1$, $p. = 68$. Здорова.

№ 57. (№ 1008).

Василиса Д., 30-ти лѣтъ, пятые роды. Беременностъ и роды нормальны. Продолжительность родовъ 7 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0 = 37.2$, $p. = 68$; в. $t^0 = 37.4$, $p. = 74$.
- 2-й „ У. $t^0 = 36.8$, $p. = 58$; в. при познабливаніи $t^0 = 38.4$, $p. = 92$.
- 3-й „ У. $t^0 = 37.8$, $p. = 76$; в. $t^0 = 39^{\circ}$, $p. = 98$. Головная боль.
- 4-й „ У. $t^0 = 38.5$, $p. = 96$. Матка плотная безболѣзненная. Выдѣленія буроватаго цвѣта съ запахомъ: *Endometritis*. Матка промыта слабымъ растворомъ сулемы и затампонирована; в. $t^0 = 39.6$, $p. = 98$.
- 5-й „ У. $t^0 = 38^{\circ}$, $p. = 88$. Матка промыта растворомъ сулемы и затампонирована. $t^0 = 39$; в. $t^0 = 39^{\circ}$, $p. = 92$. Тампонъ вынуть. $t^0 = 39.5$. Спринцовывать.
- 6-й „ У. $t^0 = 37.8$, $p. = 90$; в. $t^0 = 37.7$, $p. = 80$.
- 7-й „ У. $t^0 = 36.6$, $p. = 76$; в. $t^0 = 37.9$.
- 8-й „ У. $t^0 = 37^{\circ}$, $p. = 68$. При изслѣдованіи зеркаломъ — при раздвиганіи створокъ его, изъ матки вылилось около 3-хъ столовыхъ ложекъ желтовато-зеленыхъ

- выдѣленій съ рѣзкимъ запахомъ, Тампонацией. $t^0 = 36.5$; в. $t^0 = 37.1$, р. = 64; в. тампонацией. $t^0 = 36.8$, р. = 68.
- 9-й день. У. $t^0 = 36.3$, р. = 68. Удалены тампоны; запаха нѣть; в. $t^0 = 38.2$, р. = 70. Lochiometra; выдѣленія шеко-
ладного цвета, но безъ запаха. Тампонаций. $t^0 = 36.5$.
- 10-й „ У. $t^0 = 36.9$, р. = 74. Тампонаций; в. $t^0 = 37.4$, р. = 56. Тампонаций.
- 11-й „ У. $t^0 = 36.9$, р. = 58. Удалены тампоны; в. $t^0 = 37^0$, р. = 76.
- 12-й „ У. $t^0 = 36.5$, р. = 64. Изслѣдованіе: шейка малень-
кая, зѣвъ съ трудомъ пропускаетъ палецъ. Тѣло матки небольшое, плотное, нечувствительное, въ нормальномъ положеніи. Своды свободны. Выдѣленія кровянисто-слизисты безъ запаха; в. $t^0 = 37.4$, р. = 78.
- 13-й „ $t^0 = 36.8$, р. = 70. Здорова.

№ 58. (№ 1013).

Наталья Б., 26 лѣтъ, первородящая. Беременность нормальная. Роды продолжались 62 часа и окончены наложеніемъ щипцовъ (тазъ плоскій). Ruptura perinei и отрывъ передней губы шейки—швы. Кровотеченіе непосредственно послѣ родовъ. Там-
понація матки и влагалища.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0 = 36.8$, р. = 80; в. $t^0 = 37.7$, р. = 82. Сильная чувствительность матки.
- 2-й „ У. $t^0 = 37.2$, р. = 80; веч. $t^0 = 38.3$, р. = 80.
- 3-й „ У. $t^0 = 37.7$, р. = 72; в. $t^0 = 38.4$, р. = 84. Швы разошлись. Матка чувствительна. Ночью $t^0 = 39^0$.
- 4-й „ У. $t^0 = 37.9$, р. = 76; в. $t^0 = 38.6$, р. = 84.
- 5-й „ У. $t^0 = 38^0$, р. = 82. Изслѣдованіе: промежность слегка отечна, разрывъ не сросся и поверхность довольно чиста. Оставшіеся 4 шва удалены. Задняя губа влагалищной части разорвана въ несколькиихъ мѣстахъ; передняя совсѣмъ отсутствуетъ и на ея мѣстѣ имѣются черные омертвѣвающіе хлопья. Выдѣленія изъ рукава и изъ полости матки грязныя, съ рѣзкимъ запахомъ. Задняя губа кровоточива. Colpitis et Endometritis. Задняя губа фиксирована пулевыми щипцами, тщательно вычищенъ рукавъ, затѣмъ шейка, послѣ чего въ полость матки и во влагалище вложены тампоны. $t^0 = 37.2$; в. $t^0 = 8^0$, р. = 82. Тампонаций.
- 6-й „ У. $t^0 = 36.5$, р. = 72. Тампонаций. Днемъ $t^0 = 37.3$, р. = 80; в. $t^0 = 38^0$, р. = 80. Тампонаций.
- 7-й „ У. $t^0 = 37.6$, р. = 80. Тампоны удалены; в. $t^0 = 38.2$, р. = 88.
- 8-й „ У. $t^0 = 36.9$, р. = 76. Поверхность разрыва на про-
межности покрыта блѣдными, но чистыми грануля-

- діями. Мѣсто бывшей передней губы замѣтно очистилось отъ омертвѣвшихъ массъ. Въ выдѣленіяхъ изъ полости матки запаха не замѣтно; изъ рукава выдѣленія съ небольшимъ запахомъ. Матка нечувствительна, нормальной подвижности; в. $t^0 = 37.5$, р. = 66. Спринцоватъ.
- 9-й день. У. $t^0 = 36.5$, р. = 76; в. $t^0 = 37.5$, р. = 78. Кашель; жесткое везикулярное дыханіе.
- 10-й " У. $t^0 = 36.5$, р. = 70; в. $t^0 = 37.2$, р. = 74.
- 11-й " У. $t^0 = 36.9$, р. = 68; в. $t^0 = 37.3$, р. = 84. Промежность покрыта свѣжими грануляціями. Мѣсто бывшей передней губы шейки совершенно очистилось. Задняя губа нѣсколько стянулась, уменьшилась. Выдѣленія необильны; запахъ? Общее состояніе хорошее.
- 12-й " У. $t^0 = 37.3$, р. = 80. Разрѣшено сидѣть; в. $t^0 = 37.9$, р. = 72.
- 13-й " У. $t^0 = 37.7$, р. = 74. Днемъ $t^0 = 38.5$, р. = 80; веч. $t^0 = 39.4$, р. = 92. Со стороны половой сферы нѣть никакихъ уклоненій отъ нормы, которыми-бы можно объяснить повышеніе t^0 . Кашель и боль въ лѣвомъ боку. Притупленіе тона у верхушекъ легкихъ.
- 14-й " У. $t^0 = 38.5$, р. = 104; в. $t^0 = 38^{\circ}$, р. = 84. Кашель, ослабленіе дыхательныхъ шумовъ.
- 15-й " У. $t^0 = 37.7$, р. = 76; в. $t^0 = 38^{\circ}$, р. = 92.
- 16-й " У. $t^0 = 38.2$, р. = 76; в. $t^0 = 38.9$, р. = 88.
- 17-й " У. $t^0 = 36.9$, р. = 80; в. $t^0 = 39^{\circ}$, р. = 86. Матка подвижна, нечувствительна; своды безболѣзны. На мѣстѣ передней (оторванной) губы—свѣжая гранулирующая поверхность. Выдѣленій немногого. Безъ запаха. Кашель.
- 18-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 72; в. $t^0 = 37.4$, р. = 74.
- 19-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 60; в. $t^0 = 36.7$, р. = 66.
- 20-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 74; в. $t^0 = 36.9$, р. = 70.
- 21-й " $t^0 = 36.5$, р. = 64. Здорова. Выписалась съ кашлемъ, которымъ давно страдаетъ.

№ 59. (№ 1110).

Анна Ю., 25 лѣтъ, первобеременная. Abortus V мѣсяцевъ. Плодъ родился дома; въ Институтъ доставлена съ послѣдомъ, который удаленъ. Продолжительность родовъ 21 часъ. $t^0 = 38.3$, р. = 60.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. В. $t^0 = 37.8$, р. = 62. Сильная боль влѣво отъ матки.
- 2-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 60; в. $t^0 = 38.6$, р. = 78.
- 3-й " У. $t^0 = 37.8$, р. = 64; в. $t^0 = 38.8$, р. = 80.
- 4-й " У. $t^0 = 37.8$, р. = 62; в. $t^0 = 38.6$, р. = 82.
- 5-й " У. Ознобъ, $t^0 = 40.3$, р. = 110. Днемъ $t^0 = 39.6$, р. = 108. Изслѣдованіе: шейка матки довольно боль-

шая, дряблая; наружный зевь широко открытъ, внутренний тоже пропускаетъ палецъ. Тѣло матки довольно мягкое, въ рѣзкой антегрексіи, чувствительное у дна и у лѣваго края, мало подвижное. Правый сводъ болѣзнистъ; въ лѣвомъ сводѣ—тѣстоватая чувствительная опухоль, соответственно основанію широкой связки. Выдѣленія изъ матки необильныя, бурыя, съ небольшимъ запахомъ: *Parametritis sin. et Endometritis* (*Parametritis incip. d.*). Ex consilio: тампонажія. $t^0 = 39.6 - 39.9 - 38.8$, р. = 86; в. тампонажія. $t^0 = 39^{\circ}$, р. = 100. Ночью $t^0 = 39.3$, р. = 108.

6-й день. Въ 4' утра—ознобъ: $t^0 = 40.5$, р. = 120, послѣ чего потъ; у. $t^0 = 38.5$, р. = 90. Удалены тампоны; они оказались пропитанными выдѣленіями, безъ рѣзкаго запаха. Чувствительность внизу живота та-же. Назначены холодная спринцовкія, ледъ на низъ живота, покой, alcoholica; в. $t^0 = 37.6$, р. = 78. Ночью $t^0 = 38.9$, р. = 78.

7-й „ Въ 2' ночи потрясающій ознобъ: $t^0 = 41.3$, р. = 130; у. $t^0 = 37.2$, р. = 72; днемъ, небольшой ознобъ: $t^0 = 40.4$, р. = 120; в. $t^0 = 40.4$, р. = 110.

8-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 72. Матка довольно большая, ткань ея вяла; зевъ проходимъ для пальца. Набухлость въ области лѣвой широкой связки. Матка промыта растворомъ суплемы $1/2000$; в. $t^0 = 37.9$, р. = 80. Слабило пять разъ.

9-й „ У. $t^0 = 37.1$, р. = 78; в. $t^0 = 38.5$, р. = 88. Жалуется на колющія боли влѣво внизу живота.

10-й „ У. $t^0 = 38.6$, р. = 90. Ночью слабило нѣсколько разъ. Отдѣленія гноиняя съ запахомъ. Кашель. Назначены спринцовкія борнымъ растворомъ; в. $t^0 = 38.5$, р. = 96.

11-й „ У. $t^0 = 38^{\circ}$, р. = 90; в. $t^0 = 39.1$, р. = 112. Тампонажія.

12-й „ У. $t^0 = 37.5$, р. = 68. Чувствительность въ лѣвомъ сводѣ почти совсѣмъ исчезла; въ правомъ чувствительность та-же. Тѣло матки маленькое въ рѣзкой антегрексіи. Тампонъ не весь пропитанъ; по удаленніи его изъ полости матки выдѣлилось большое количество гноевидной жидкости. Тампонажія. $t^0 = 37.7 - 38.3 - 39.7$, р. = 88; в. $t^0 = 39^{\circ}$, р. = 90. Тампонажія. $t^0 = 38.6, 38.1$, р. = 80.

13-й „ У. $t^0 = 37.6$, р. = 76. Удалены тампоны. Изслѣдованіе: шейка матки маленькая. У наружного зѣва ссадины. Внутренний едва пропускаетъ маленький ватный шарикъ; въ полости задержки выдѣленій нѣть. Тѣло матки маленькое, почти неподвижное, въ антегрексіи. Въ лѣвомъ сводѣ напряженіе. Въ правомъ—чувствительная неподвижная опухоль величиною нѣ-

сколько меньше куриного яйца. *Parametritis d.* Выдѣленій мало, слегка буроваты, запаха пезамѣтно. Тампонациѣ; в. $t^0 = 39.3$, р. = 80. Удалены тампоны. Выдѣленій очень мало. Внутренній зѣвъ непроходимъ даже для тоненькаго шарика. Оставлена безъ тампоновъ. $t^0 = 39.9$, р. = 100.

Въ дальнѣйшемъ теченіи при постоянной лихорадкѣ непривильного типа развился въ правомъ и отчасти заднемъ сводахъ экссудатъ, перешедшій въ нагноеніе. Въ сороковой день болѣзни, когда впервые констатировано было зыбленіе, аппаратомъ Potain'a выпущено изъ задняго свода около 100 куб. сантиметровъ зловоннаго гноя, послѣ чего полость нарыва промыта растворомъ борной кислоты. Черезъ 11 дней послѣ первой пункции сдѣлана вторая пункция и выпущено до 200 с.с. такого-же гноя. Послѣ этого экссудатъ въ заднемъ и правомъ сводахъ постепенно сталъ уменьшаться. t^0 -та стала нормальною на 57-й день болѣзни. На 80-й день больная выписалась относительно здоровою съ явленіями рубцевавшагося пери-параметрита.

№ 60. (№ 1123).

Марія В., 19 лѣтъ, первородящая. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ = 8 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- | | |
|----------|---|
| 1—5 дни. | $t^0 = 36.7$ — 37.9 , р. = 56—84. |
| 6-й " | У. $t^0 = 37.1$, р. = 74; в. $t^0 = 39.6$, р. = 120. Груди очень нагрубаются и болятъ. |
| 7-й " | У. $t^0 = 38.2$, р. = 88. Матка плотная, средней величины, подвижная, нечувствительная. Выдѣленія кровянисто-слизистыя. Изъ полости матки удалены кусочки плевъ и плаценты. Груди нагрубаются, на соскахъ болѣзненныхъ трещины и кругомъ краснота, особенно на правой груди. <i>Retentio p. velamentorum et Placentae. Erythema маттаe dextrae.</i> Полость матки промыта растворомъ суплемы $1/2000$; матка сокращена массажемъ. Ледъ на низъ живота и secale; в. $t^0 = 40.1$, р. = 100. (ознобъ). |
| 8-й " | У. $t^0 = 38^{\circ}$, р. = 80. Шейка довольно большая, рыхлая. Каналъ легко проходимъ для пальца. Въ полости матки задержка выдѣленій, мутныхъ, водянисто-кровянистыхъ, безъ рѣзкаго запаха. Тѣло небольшое, средней плотности, подвижное, нечувствительное. Своды свободны: <i>Endometritis, lochiometra</i> . Тампонациѣ. Ледъ на правую грудь. $t^0 = 37.5$, р. = 76; в. $t^0 = 38^{\circ}$. Тампонациѣ. $t^0 = 37.8$. |
| 9-й " | У. $t^0 = 39.8$, р. = 120; $t^0 = 39^{\circ}$, р. = 88. Удалены тампоны; в. $t^0 = 38.7$, р. = 96. |
| 10-й " | У. $t^0 = 38.6$, р. = 80. Небольшая задержка въ полости матки выдѣленій бурогрязныхъ, съ небольшимъ |

- запахомъ. Тампонація. $t^0 = 38.8 - 37.9$, р. = 86; в. $t^0 = 40.5$, р. = 138. Внизу живота чувствительности нигдѣ нѣть; матка и своды нечувствительны; выдѣленія необильны. Тампонація. Краснота груди та-же. $t^0 = 40.9$, р. = 120. Ночью $t^0 = 40.2$, р. = 100.
- 11-й день. У. $t^0 = 39.3$, р. = 100. Тампонація. Краснота на груди та-же; в. $t^0 = 38.5$, р. = 100. Тампонація; $t^0 = 38.6$, р. = 98.
- 12-й „ У. $t^0 = 37.8 - 39.3$, р. = 94. Тампонація. $t^0 = 38.2 - 39.4$, р. = 98; в. $t^0 = 38.6$, р. = 102. На соскахъ глубокія трещины, покрытыя гноемъ. Краснота и не-большая чувствительность правой груди. Выдѣленія безъ запаха. Оставлена безъ тампоновъ.
- 13-й „ У. $t^0 = 37.7$, р. = 80. Ночью потѣла. Выдѣленія не-много мутны; запахъ? Тампонація; в. $t^0 = 37.2$, р. = 80. Удалены тампоны. Правая грудь значительно лучше.
- 14-й „ У. $t^0 = 36.9$, р. = 68; в. $t^0 = 37.2$, р. = 82. Выдѣленія безъ запаха по цвѣту нормальны.
- 15-й „ У. $t^0 = 36.4$, р. = 60; в. $t^0 = 37.1$, р. = 70.
- 16-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 82; в. $t^0 = 37$, р. = 70.
- 17-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 72. Здорова.

№ 61. (№ 1132).

Александра Ю., 20 лѣтъ, второродящая. Беременность и роды нормальные. Продолжительность родовъ 9 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0 = 36.9$, р. = 60; в. $t^0 = 37$, р. = 66.
- 2-й „ У. $t^0 = 37.2$, р. = 82; в. $t^0 = 38.5$, р. = 96. Вышли сгустки крови.
- 3-й „ У. $t^0 = 36.6$, р. = 72; в. $t^0 = 36.6$, р. = 60.
- 4-й „ У. $t^0 = 36.9$, р. = 78. Изслѣдованіе: шейка матки довольно большая, дряблая, съ значительными разрывами по бокамъ. Тѣло средней величины и плотности, въ нормальномъ положеніи. Своды свободны. Выдѣленія кровянисто-слизисты, мутны, съ замѣтнымъ запахомъ, съ кусочками измѣненной ткани (оболочки?). *Endometritis levis*. Тампонація; в. $t^0 = 37.3$, р. = 74. Удалены тампоны.
- 5-й „ У. $t^0 = 36.4$, р. = 48; в. $t^0 = 36.7$, р. = 66. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны.
- 6-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 72; в. $t^0 = 37$, р. = 70.
- 7-й „ У. $t^0 = 36.7$, р. = 70; в. $t^0 = 37.1$, р. = 74.
- 8-й „ У. $t^0 = 36.9$, р. = 72. Здорова.

№ 62. (№ 1153.)

Александра К., 37 лѣтъ, треты роды. Прежніе беременность и роды нормальны. Теченіе настоящей беременности правильное. Во время родовъ, въ періодъ изгнанія плода одинъ припадокъ

эклампсії, довольно продолжительный, послѣ чего безсознательное состояніе въ теченіе 18 часовъ и парезъ лѣвой половины тѣла; здѣсь-же анестезія. Продолжительность родовъ = 15 часовъ. $t^0 = 37.9$, р. = 80. *Eclampsia sub partu.*

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0 = 37.3$, р. = 70. Ночью и утромъ на вопросы отвѣчаетъ сознательно. Жалуется на сильную головную боль. Зрачки съужены, плохо реагируютъ на свѣтъ; видитъ хорошо. Парезъ и потеря чувствительности въ лѣвой половинѣ тѣла. Въ сердцѣ ничего патологического. Бѣлку въ мочѣ нѣтъ; в. $t^0 = 36.9$, р. = 60.
- 2-й „ У. $t^0 = 37.2$, р. = 78. Сознаніе полное; жалуется на сильную головную боль; парезъ и анестезія исчезли; осталась слабость въ лѣвой руцѣ и асимметрія въ обѣихъ половинахъ лица; в. $t^0 = 36.9$, р. = 74. Kali iodatî внутрь.
- 3-й „ У. $t^0 = 37.2$, р. = 74; в. $t^0 = 38.1$, р. = 80. Сильные головные боли.
- 4-й „ У. $t^0 = 38.4$, р. = 74; в. $t^0 = 38.9$, р. = 78. Изслѣдованіе: Сознаніе ясное; сонливость; жалуется на сильную головную боль и общую слабость. Шейка большая, немного плотная, съ рубцовыми втягиваніями вокругъ наружнаго зѣва. Каналь проходимъ для пальца. Тѣло средней величины, плотное, подвижное, нечувствительное, въ нормальномъ положеніи. Своды свободны. Выдѣленія необильны, густы, клейки, кровянисто-слизисты, съ запахомъ. *Endometritis*. Вычищена полость сухими и влажными шариками. $t^0 = 37.6$.
- 5-й „ У. $t^0 = 37.5—38.5$, р. = 60; в. $t^0 = 39^0$, р. = 88. Выдѣленія изъ полости стали жидкими; задержка ихъ въ полости матки. Тампонада. Въ 1' н. $t^0 = 38.4$.
- 6-й „ У. $t^0 = 38.4$, р. = 84. Тампонада. Сильная головная боль; в. $t^0 = 39^0$, р. = 72. Тампонада.
- 7-й „ У. $t^0 = 37.7—38$, р. = 88. Тампонада. $t^0 = 38^0—38.8$; в. $t^0 = 39^0$, р. = 80. Удалены тампоны. Выдѣленія кровянисто-слизисты, безъ запаха.
- 8-й „ У. $t^0 = 38.2$, р. = 80; в. $t^0 = 37.6$. Со стороны половой сферы не удается констатировать какихъ либо уклоненій отъ нормы. Головные боли и боль въ членахъ.
- 9-й „ У. $t^0 = 38.1$, р. = 68; в. $t^0 = 37.9$, р. = 70. Боли нѣсколько меньше.
- 10-й „ У. $t^0 = 37.9$, р. = 70; д. $t^0 = 38.6$, р. = 60; в. $t^0 = 36.4$, р. = 60. Боли незначительны.
- 11-й „ У. $t^0 = 37.8$, р. = 70; д. $t^0 = 38.5$, р. = 96; в. $t^0 = 37.6$, р. = 86. Изслѣдованіе половой сферы не обнаружило ничего такого, что-бы могло объяснить повышеніе t^0 .
- 12-й „ У. $t^0 = 37.4$, р. = 72; в. $t^0 = 37.5$, р. = 62.

- 13-й день. У. $t^0 = 36.8$, р. = 62; в. $t^0 = 37.5$, р. = 76.
 14-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 80; в. $t^0 = 37.1$, р. = 84. Халатъ.
 15-й " У. $t^0 = 36.9$, р. = 74; в. $t^0 = 37.2$, р. = 72. Головная
 боль.
 16-й " У. $t^0 = 36.4$, р. = 66; в. $t^0 = 36.8$, р. = 80. Въ отношеніи
 половой сферы здорова.

№ 63. (№ 1162).

Степанида К., 23-хъ лѣтъ, второродящая. Беременность и
 роды нормальны. Продолжительность родовъ = 4 часа.
 Непосредственно передъ родами „захвала лихорадкой“.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0 = 37.5$, р. = 74; в. $t^0 = 37.3$, р. = 80.
 2-й " У. $t^0 = 38.9$, р. = 90; в. $t^0 = 37.5$, р. = 80.
 3-й " У. $t^0 = 38.8$, р. = 76; в. $t^0 = 39^0$, р. = 90.
 4-й " У. $t^0 = 39.4$, р. = 100; в. $t^0 = 39.5$, р. = 100.
 5-й " У. $t^0 = 39.3$, р. = 94; в. $t^0 = 39.9$, р. = 100. Жалуется
 только на головную боль.
 6-й " У. $t^0 = 39.7$, р. = 84. Изслѣдованіе: шейка довольно
 большая, дряблая. Тѣло матки средней величины и
 плотности, нечувствительное, очень подвижное, въ
 нормальномъ положеніи. Своды свободны. Выдѣленія
 кровянисты, съ небольшимъ запахомъ. Въ полости
 матки, довольно объемистой, на задней стѣнкѣ у дна
 и праваго рога имѣются разращенія (куски послѣда?),
 которыя отдѣлены со стѣнки пальцемъ и удалены.
Endometritis. Полость матки вычищена шариками и
 тампонацией. $t^0 = 40.2$, р. = 98; в. $t^0 = 39.6$, р. = 92.
 Тампонация. $t^0 = 37.9$, р. = 80.
 7-й " У. $t^0 = 39.1$, р. = 96. Тампонация; $t^0 = 39^0 - 39.7$, р. =
 98; в. $t^0 = 39.6$, р. = 90. Удалены тамponsы. Матка ма-
 ленькая, не совсѣмъ плотная; шейка довольно большая,
 дряблая. Чувствительности никакой нѣтъ. Выдѣленія
 кровянисты, обильны. Оставлена безъ тампоновъ.
 8-й " У. $t^0 = 38.9$, р. = 96. Выдѣленія бурыя, запахъ? Там-
 понация; в. $t^0 = 39^0$. Тамponsы пропитаны. Выдѣленія
 кровянисто-слизистые, безъ запаха. Матка и своды
 совершенно нечувствительны. Головная боль, тошноты.
 Оставлена безъ тампоновъ.
 9-й " У. $t^0 = 39.6$, р. = 82. Со стороны половой сферы ни-
 чего ненормального. Селезенка увеличена; въ области
 слѣпой кишкѣ при давлѣніи чувствительность и ур-
 чаніе; в. $t^0 = 39.1$, р. = 86.
 10-й " У. $t^0 = 38.5$, 39.8, р. = 64; в. $t^0 = 39.5$, р. = 70.
 11-й " У. $t^0 = 39.2$, р. = 90. Выдѣленія по цвѣту и запаху
 нормальны. Матка небольшая, нечувствительная, по-
 движная, въ нормальномъ положеніи. Боковые и зад-
 ній своды свободны, безболѣзненны. Животъ вздутъ,

въ правой ileocoес'альной области урчаніе и небольшая чувствительность. Запоръ. Селезенка увеличена. Языкъ обложенъ. Больная блѣдна; аппетита нѣтъ.

Ex consilio: *Typhus abdominalis*.

- | | |
|------------|---|
| 12-й день. | У. $t^0 = 39.3$, р. = 82; в. $t^0 = 40^0$, р. = 100. |
| 13-й " | У. $t^0 = 38.7$, р. = 104; в. $t^0 = 39.7$, р. = 96. |
| 14-й " | У. $t^0 = 38.9$, р. = 92; в. $t^0 = 39.2$, р. = 96. |
| 15-й " | Переведена въ Александровскую больницу, какъ больная брюшнымъ тифомъ. |

№ 64. (№ 1178).

Марія А., 27 лѣтъ, IV-para. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ = 9 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- | | |
|----------|---|
| 1—5 дни. | $t^0 = 36.5—37.9$, р. = 52—80. |
| 6-й " | У. $t^0 = 37.4$, р. = 70. При изслѣдованіи изъ полости матки удаленъ кровяной сгустокъ съ остатками пляцентарной ткани; в. $t^0 = 38^0$, р. = 80. |
| 7-й " | У. $t^0 = 37.3$, р. = 76; в. $t^0 = 38.2$, р. = 94. Трещины на соскахъ. |
| 8-й " | У. $t^0 = 37.9$, р. = 72; в. $t^0 = 37.4$, р. = 70. |
| 9-й " | У. $t^0 = 37.8$, р. = 80; в. $t^0 = 38.2$, р. = 88. |
| 10-й " | У. $t^0 = 37.1$, р. = 72; в. $t^0 = 37.9$, р. = 86. |
| 11-й " | У. $t^0 = 37.3$, р. = 76; в. $t^0 = 36.6$, р. = 70. |
| 12-й " | У. $t^0 = 39^0$, р. = 106; д. $t^0 = 39.8$, р. = 108; в. $t^0 = 39.4$, р. = 98. |
| 13-й " | У. $t^0 = 37.8$, р. = 88. Выдѣленія изъ матки гнойнаго характера. <i>Endometritis</i> . Матка промыта растворомъ сулемы, затѣмъ борнымъ растворомъ; в. $t^0 = 38.1$, р. = 72. |
| 14-й " | У. $t^0 = 36.9$, р. = 60; в. $t^0 = 38.4$, р. = 72. |
| 15-й " | У. $t^0 = 37.4$, р. = 68. Выдѣленія съ запахомъ; в. $t^0 = 37.9$, р. = 78. |
| 16-й " | У. $t^0 = 37.8$, р. = 80. Матка маленькая, плотная, подвижная, нечувствительная, въ нормальномъ положеніи. Шейка небольшая, каналъ проходимъ для шарика. Своды свободны. Выдѣленія мутны. Тампонация; в. $t^0 = 36.9$, р. = 68. Тампонация. |
| 17-й " | У. $t^0 = 37.4$, р. = 70. Удалены тампоны. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны; в. $t^0 = 36.9$, р. = 70. |
| 18-й " | У. $t^0 = 36.6$, р. = 62; в. $t^0 = 37^0$, р. = 68. |
| 19-й " | $t^0 = 36.9$, р. = 68. Здорова. |

№ 65 (№ 1214).

Екатерина Н., пятые роды. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ 15 часовъ.

Послѣ родовъ.

- | | |
|----------|---------------------------------|
| 1—3 дни. | $t^0 = 36.7—37.7$, р. = 68—80. |
|----------|---------------------------------|

- 4-й день. У. $t^0 = 37.2$, р. = 72; в. $t^0 = 39^0$, р. = 84.
 5-й " У. $t^0 = 38.8$, р. = 88; в. $t^0 = 40.5$, р. = 94.
 6-й " У. $t^0 = 38.6$, р. = 90. Шейка матки небольшая, плотная; разрывъ съ лѣвой стороны и пѣсколько меныї разрывъ съ правой; небольшая ссадина на стѣнкѣ рукава. Тѣло матки большое, плотное, подвижное, нечувствительное, въ нормальномъ положеніи. Полость матки объемиста; выдѣленія мутны, обильны и съ запахомъ. *Endometritis*. Своды свободны. Тампонада; в. $t^0 = 38.5$, р. = 90. Тампонада.
 7-й " У. $t^0 = 36.9$, р. = 78. Тампонада; в. $t^0 = 37.4$, р. = 80. Тампонада.
 8-й " У. $t^0 = 37^0$, р. = 68. Удалены тампоны. Запаха нѣтъ; в. $t^0 = 37.3$, р. = 82.
 9-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 62; в. $t^0 = 37.3$, р. = 82. Выдѣленія по цвѣту и запаху нормальны.
 10-й " $t^0 = 36.5$, р. = 64. Здорова.

№ 66. (№ 1231).

Елизавета К., 26 лѣтъ, второродящая. Беременность нормальная. Роды продолжались 30 ч. Ручное отдѣленіе послѣда.

- 1—3 дни. $t^0 = 36.6—37.3$, р. = 54—80.
 4-й день. У. $t^0 = 36.9$, р. = 58; в. $t^0 = 38.3$, р. = 82.
 5-й " У. $t^0 = 38.2$, р. = 80; в. $t^0 = 37.7$, р. = 78.
 6-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 94. Шейка матки большая, вялая; каналъ проходитъ для пальца. Тѣло довольно большое, дряблое, подвижное, нечувствительное, лежитъ на позвоночникѣ (выпрямлено). Своды свободны. Задержка выдѣленій въ растянутой полости; выдѣленія густыя, бурыя и съ запахомъ. *Endometritis (lochiometra)*. Тампонада; в. $t^0 = 37.4$, р. = 70. Тампонада.
 7-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 74. Удалены тампоны. Запаха нѣтъ; в. $t^0 = 36.8$, р. = 76.
 8-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 70; в. $t^0 = 36.8$, р. = 76. Ничего ненормального не обнаружено.
 9-й " У. $t^0 = 36.4$, р. = 62; в. $t^0 = 36.6$, р. = 64. Здорова.

№ 67. (№ 1258).

Юлія Л., 24 лѣтъ, первородящая. Беременность и роды нормальны. *Ruptura perinei—suturae*.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0 = 37.6$, р. = 80; в. $t^0 = 38^0$, р. = 96.
 2-й " У. $t^0 = 37.4$, р. = 66; в. $t^0 = 38.1$, р. = 80.
 3-й " У. $t^0 = 37.3$, р. = 76; в. $t^0 = 39.3$, р. = 92.
 4-й " У. $t^0 = 37.9$, р. = 80. Изслѣдованіе: разрывъ промежности; швы на промежности лежатъ хорошо; во влагалищѣ они разошлись. *Colpitis granulosa*. На шейкѣ пѣсколько разрывовъ, изъ которыхъ одинъ, съ

- лѣвой стороны, доходитъ почти до свода. Тѣло матки довольно большое, плотное, немного чувствительное, въ нормальномъ положеніи. Своды нечувствительны. Выдѣленія бурыя и съ рѣзкимъ запахомъ. *Endometritis*. При осторожномъ по возможности раскрываніи зеркала (дабы швы на промежности не разошлись), полость матки затампонирована. $t^0 = 38.3$, р. = 90; в. $t^0 = 38.3$, р. = 90. Тампонациѣ. $t^0 = 37^{\circ}$.
- 5-й день. У. $t^0 = 37.8$, р. = 78. Тампонациѣ. При вычищеніи полости матки шариками, оттуда вышли кусочки послѣдовой ткани; в. $t^0 = 38.7$, р. = 90. Тампонациѣ. $t^0 = 37.9$, р. = 78.
- 6-й " У. $t^0 = 37^{\circ}$, р. = 72. Сняты швы: во влагалищѣ швы разошлись, на промежности хорошо срослись. Чувствуетъ себя хорошо. Оставлена безъ тампоновъ; вѣч. $t^0 = 38.9$, р. = 90.
- 7-й " У. $t^0 = 38^{\circ}$, р. = 80. Тампонациѣ; в. $t^0 = 39.7$, р. = 102. Тампонациѣ. $t^0 = 38.2$, р. = 90.
- 8-й " У. $t^0 = 37.3$, р. = 72. Тампонациѣ; в. $t^0 = 37.8$, р. = 74. Тампонациѣ.
- 9-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 74. Удалены тампоны. Выдѣленія безъ запаха, слизистыя; в. $t^0 = 37.4$, р. = 78.
- 10-й " У. $t^0 = 36.9$, р. = 70; в. $t^0 = 37.4$, р. = 80.
- 11-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 68; в. $t^0 = 36.9$, р. = 70.
- 12-й " У. $t^0 = 36.7$, р. = 66. Небольшая задержка выдѣленій въ маткѣ. Тампонациѣ; в. $t^0 = 37.3$, р. = 68. Удалены тампоны.
- 13-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 60; в. $t^0 = 37.2$, р. = 60.
- 14-й " У. $t^0 = 36.7$, р. = 68; в. $t^0 = 36.4$, р. = 60.
- 15-й " У. $t^0 = 36.5$, р. = 66; в. $t^0 = 37.3$, р. = 64.
- 16-й " У. $t^0 = 37^{\circ}$, р. = 64. Здорова.

№ 68. (№ 1259).

Елена Г., 19 лѣтъ, первородящая. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ 14 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1—2 дни. $t^0 = 36.3—37.2$, р. = 68—90.
- 3-й день. У. $t^0 = 36.8$, р. = 62; в. $t^0 = 38.6$, р. = 100.
- 4-й " У. $t^0 = 36.6$, р. = 96; в. $t^0 = 38.2$, р. = 80.
- 5-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 90; днемъ $t^0 = 38^{\circ}$, р. = 100; в. $t^0 = 37.8$, р. = 74. Отдѣленія гноевидныя, но безъ запаха.
- 6-й " У. $t^0 = 37.3$, р. = 72. Изслѣдованіе: шейка небольшая, довольно плотная, съ разрывами по краямъ наружного зѣва. Каналъ пропускаетъ палецъ. Тѣло небольшое, плотное, подвижное, нечувствительное, въ нормальномъ положеніи. Своды свободны. Выдѣленія гноевидныя, безъ запаха. *Endometritis*. Спринцованія.
- 7-й " У. $t^0 = 37.2$, р. = 68; в. $t^0 = 37.9$, р. = 88.

- 8-й день. У. $t^0 = 36.9$, р. = 74. Выдѣленія гноевидныя; тампоны; в. $t^0 = 36.6$, р. = 58. Тампонада.
 9-й „ У. $t^0 = 37^{\circ}$, р. = 60. Удалены тампоны; в. $t^0 = 36.5$, р. = 68.

№ 69. (№ 1261).

Дарья К., 22 лѣтъ, первородящая. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ 10 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1—4 дни. $t^0 = 36.7—37.8$, р. = 64—72.
 5-й „ У. $t^0 = 37.2$, р. = 70; в. $t^0 = 38.9$, р. = 96 (небольшой ознобъ).
 6-й „ У. $t^0 = 37.4$, р. = 70. Днемъ $t^0 = 39^{\circ}$, р. = 104. Выдѣленія кровянисты, съ небольшимъ запахомъ; веч. $t^0 = 38.6$, р. = 86.
 7-й „ У. $t^0 = 37.7$, р. = 76. Изслѣдованіе: шейка матки небольшая, хорошо сформирована; зѣвъ пропускаетъ палецъ. Полость матки ничего особенного не содержитъ. Выдѣленія кровянисты; запахъ? Тѣло матки въ нормальномъ положеніи, подвижное, нечувствительное. Своды свободны; в. $t^0 = 38.8$, р. = 96.
 8-й „ У. $t^0 = 37.5$, р. = 78. Выдѣленія гноевидны, съ небольшимъ запахомъ. *Endometritis*. Тампонада; веч. $t^0 = 38.7$, р. = 78. Тампонада.
 9-й „ У. $t^0 = 36.5$, р. = 78. Удалены тампоны; в. $t^0 = 36.7$, р. = 70.
 10-й „ У. $t^0 = 36.9$, р. = 80. Выдѣленія по цвету и запаху нормальны; в. $t^0 = 37^{\circ}$, р. = 78.
 11-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 68. Позволено встать; в. $t^0 = 38.3$, р. = 76.
 12-й „ У. $t^0 = 37.1$, р. = 78. Выдѣленія, взятые изъ полости матки, нормальны; в. $t^0 = 36.9$, р. = 68.
 13-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 60; в. $t^0 = 36.7$, р. = 66. Здорова.

№ 70. (№ 1264).

Анна П., 23 лѣтъ, первородящая. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ 10 часовъ. *Ruptura perinei-suturae*.

Послѣродовое состояніе.

- 1—3 дни. $t^0 = 37—37.8$, р. = 70—86.
 4-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 68; в. $t^0 = 38.9$, р. = 90.
 5-й „ У. $t^0 = 37.2$, р. = 68. Днемъ $t^0 = 38.5$, р. = 84; веч. ознобъ: $t^0 = 40.3$, р. = 110.
 6-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 68. Выдѣленія съ сильнымъ запахомъ. *Endometritis*. Полость матки промыта растворомъ суплемы, затѣмъ борнымъ растворомъ. Ознобъ: $t^0 = 39.2$, р. = 104; в. $t^0 = 37.2$, р. = 72.

- 7-й день. У. $t^0 = 38^0$, р. = 76. Небольшой разрывъ промежности; швы прорѣзались и срошенія не получилось. Тѣло матки небольшое, плотное, подвижное, нечувствительное, въ нормальномъ положеніи. Своды свободны. Выдѣленія съ неб. запахомъ. Полость матки вычищена влажными и сухими шариками. Днемъ $t^0 = 39.1$; в. $t^0 = 38.6$, р. = 90.
- 8-й " У. $t^0 = 38^0$, р. = 80. Выдѣленія гноевидныя, съ запахомъ. Тампонація; в. $t^0 = 37.9$, р. = 64. Тампонація.
- 9-й " У. $t^0 = 37.7$, р. = 64. Удалены тампоны; в. $t^0 = 38.3$, р. = 92.
- 10-й " У. $t^0 = 37.9$, р. = 90. Выдѣленія гнойныя, желтаго цвета. Тампонація; в. $t^0 = 37^0$, р. = 72. Удалены тампоны.
- 11-й " У. $t^0 = 36.7$, р. = 68. Задержка выдѣленій въ маткѣ, безъ запаха. Вычищена полость шариками; в. $t^0 = 36.9$, р. = 70.
- 12-й " У. $t^0 = 36.7$, р. = 72; в. $t^0 = 37.3$, р. = 74. Выдѣленія слизистыя.
- 13-й " У. $t^0 = 36.7$, р. = 64. Здорова.

№ 71. (№ 1287).

Наталья К., 21 года, второродящая. Беременность нормальная. Родила мацерированного плода. Продолжительность родовъ 7 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1—4 дни. $t^0 = 36.4—37.3$, р. = 60—70.
- 5-й день. У. $t^0 = 37.4$, р. = 72; в. $t^0 = 39.1$, р. = 90.
- 6-й " У. $t^0 = 39.3$, р. = 88. Днемъ $t^0 = 40.1$, р. = 120; в. $t^0 = 39.9$, р. = 108. Сильный поносъ.
- 7-й " У. $t^0 = 38.4$, р. = 100. Сильный поносъ. Выдѣленія изъ полости матки бурыя, съ запахомъ; небольшая задержка ихъ въ полости. *Endometritis (lochiometra)*. Изъ полости матки удалены при вычищении шариками два кусочка послѣдовой ткани. Въ остаточномъ уклоненій отъ нормы нѣть. Тампонація. В. $t^0 = 38.7$, р. = 108. Испражненія частыя, зудъ и боль въ заднемъ проходѣ; въ испражненіяхъ—кровь. *Enteritis*. Матка дряблая, кровоточивая. Тампонація. Внутрь слизистые отвары, *Bismuthi salicyl. cum opio*. Свѣчи изъ танина. У. $t^0 = 37.7$, р. = 90. Изъ полости матки, по удаленніи тампоновъ, вышли еще два кусочка послѣдовой ткани; выдѣленія безъ запаха. Назначены спринцованія изъ борной кислоты. Внутрь лѣченіе то-же. Веч. $t^0 = 37.1$, р. = 84.
- 8-й " У. $t^0 = 37.6$, р. = 80; в. $t^0 = 37.4$, р. = 76. Поносъ уменьшился. Idem.

- 10-й день. У. $t^0 = 37.3$, р. = 64. Небольшая задержка выдѣленій въ полости матки; они съ небольшимъ запахомъ. Тампонада. В. $t^0 = 36.4$, р. = 70. Удалены тампоны.
- 11-й „ У. $t^0 = 37^0$, р. = 66. Понось прекратился. Со стороны половыхъ органовъ—никакихъ уклоненій отъ нормы. В. $t^0 = 37.4$, р. = 66.
- 12-й „ $t^0 = 37.3$, р. = 64. Здорова.

№ 72. (№ 1305).

Анна Р., 30 лѣтъ, IV-пера. Беременность и роды нормальны. Продолжительность родовъ—30 часовъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1-й день. У. $t^0 = 37^0$, р. = 64; в. $t^0 = 37.1$, р. = 90.
- 2-й „ У. $t^0 = 37.1$, р. = 80; в. $t^0 = 39.3$, р. = 110. Выдѣленія мутные, съ небольшимъ запахомъ.
- 3-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 70; в. $t^0 = 38.5$, р. = 82.
- 4-й „ У. $t^0 = 37^0$, р. = 66; в. $t^0 = 38.2$, р. = 80. Изслѣдованіе: разрывъ шейки съ правой стороны, доходящій до свода; съ лѣвой—несколько меньшій разрывъ. Передняя губа шейки темносиняго цвѣта, размежжена. Выдѣленія изъ влагалища слизисто-гнойныя, съ небольшимъ запахомъ; изъ полости матки—кровянисто-слизистыя, безъ запаха. *Colpitis. Спринцованія.*
- 5-й „ У. $t^0 = 36.9$, р. = 80. Кусокъ оторванной губы очищается. Веч. $t^0 = 37.4$, р. = 80.
- 6-й „ У. $t^0 = 38.7$, р. = 84. Шейка покрыта слегка гноевидными выдѣленіями. Полость матки большая, выдѣленія оттуда кровянисто-слизистыя. В. $t^0 = 38.7$, р. = 80.
- 7-й „ У. $t^0 = 37.7$, р. = 66; в. $t^0 = 39.3$, р. = 90. Влагалищная часть тщательно очищена и дезинфицирована.
- 8-й „ У. $t^0 = 38.7$, р. = 80. Выдѣленія изъ цервикального канала слизисто-гнойныя; изъ полости матки—мало, кровянисто-слизистыя. Шейка очистилась. *Endometritis (cervicalis).* Вычищены суплемованными шариками вначалѣ каналъ шейки, затѣмъ полость матки, и тампонада; $t^0 = 38.5$, р. = 88; в. $t^0 = 39.5$, р. = 90.
- 9-й „ У. $t^0 = 37.3$, р. = 78. Удалены тампоны. В. $t^0 = 37.3$, р. = 72.
- 10-й „ У. $t^0 = 36.7$, р. = 60; в. $t^0 = 37.2$, р. = 82.
- 11-й „ У. $t^0 = 36.8$, р. = 76; в. $t^0 = 36.8$, р. = 74.
- 12-й „ $t^0 = 37.1$, р. = 72. Здорова.

№ 73. (№ 1347).

Марія А., 43 лѣтъ, первородящая. Во время беременности—гнойныя съ запахомъ выдѣленія. Въ началѣ родовой дѣятельности, при зѣвѣ открытомъ меньше чѣмъ на палецъ, прошли воды, грязныя. Роды окончены щипцами. Въ послѣдовомъ періодѣ кропоточеніе. Ручное отдѣленіе послѣда. Матка промыта горячимъ

борнымъ растворомъ и затампонирована іодоформной марлей. Продолжительность родовъ—61 часъ.

Послѣродовое состояніе.

- 1—4 дни. $t^0 = 36^{\circ} - 38.8$, р. = 62—100. Черезъ 20 ч. послѣ родовъ удалены тампоны.
- 5-й " У. $t^0 = 37.5$, р. = 100; в. $t^0 = 38.2$, р. = 110. Изслѣдование: на лѣвой сторонѣ шейки имѣется довольно глубокий надрывъ. Выдѣленія какъ изъ канала шейки, такъ и изъ полости матки кровянисты и съ замѣтнымъ запахомъ. Тѣло матки средней величины, подвижно, нечувствительно. Своды свободны. *Endometritis*. Тампонада; $t^0 = 36.8$.
- 6-й " У. $t^0 = 36.9$, р. = 90. Тампонада. $t^0 = 37.2$, р. = 110; в. $t^0 = 37.7$, р. = 118. Тампонада.
- 7-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 100. Удалены тампоны. Запаха незамѣтно; веч. $t^0 = 37.4$, р. = 94.
- 8-й " У. $t^0 = 37^{\circ}$, р. = 90; в. $t^0 = 37.9$, р. = 94. Спринцованія. Самочувствіе хорошее.
- 9-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 100; в. $t^0 = 37.4$, р. = 94. Выдѣленія безъ запаха.
- 10-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 80; в. $t^0 = 37.2$, р. = 98.
- 11-й " У. $t^0 = 37.1$, р. = 86. Шейка хорошо сформирована; тѣло матки средней величины и плотности, подвижное, нечувствительное, въ нормальному положеніи. Своды свободны. Выдѣленій мало, безъ запаха.
- 12-й " У. $t^0 = 36.8$, р. = 86; в. $t^0 = 37.1$, р. = 86.
- 13-й " У. $t^0 = 37^{\circ}$, р. = 85. Здорова.

(Продолженіе слѣдуетъ).

—тоопищевой кислоты и щавелево-серной кислоты. А также гидроокиси бария и салициловая кислота до концентрации миллиграмм на миллилитр. Капельчатые мазки изъ яичниковъ и матки показываютъ нормальную клеточную структуру. Въ яичникахъ обнаружены нормальные яйца. Въ матке обнаружены нормальные эндометрий и эпендимит. Въ яичникахъ обнаружены нормальные яйца. Въ матке обнаружены нормальные эндометрий и эпендимит.