

31. Schallehn.—Die Zuverlässigkeit der Credéschen Einträufelung.—(Arch. f. Gyn. Bd. 54. Hft. 1).—Дѣйствительность профилактики бленнореи по способу Credé.

Въ Геттингенской клиникѣ проф. *Runge* примѣненіе способа *Credé* дало за послѣдніе 9 лѣтъ слѣдующіе результаты: изъ 917 дѣтей заболѣло бленнореею двое= $0,218\%$; оба эти заболѣванія появились на восьмой день и принадлежать такимъ образомъ къ такъ наз. позднимъ зараженіямъ. Способъ *Credé* имѣетъ лишь тотъ, впрочемъ не существенный, недостатокъ, что вызываетъ очень часто, особенно у недоносковъ, раздраженіе conjunctivae.

С. Ю. Хазанъ.

32. Fellinghaus.—Ueber Uterusrupturen während der Schwangerschaft.—(Arch. f. Gyn. Bd. 54. Hft. 1).—О разрывахъ матки во время беременности.

При скудости нашихъ свѣдѣній относительно патогенеза т. наз. самостоятельнаго разрыва матки во время беременности, наблюденный и подробно описанный авторомъ случай заслуживаетъ особеннаго вниманія. Дѣло идетъ о 38 лѣтней IX рагае, у которой, за исключеніемъ первыхъ самостоятельно, но преждевременно окончившихся родовъ, всякій разъ приходилось удалять мѣсто рукою, причемъ особенно, ощущалась тонкость и слабость маточной стѣнки. Въ концѣ третьяго мѣсяца послѣдней беременности больная выскочила черезъ окно перваго этажа, ничего однако повидимому себѣ не повредивъ, и въ надлежащій срокъ почувствовала движенія плода. Въ началѣ 4 мѣсяца больная вслѣдствіе кровотеченія и сильныхъ болей въ животѣ прибыла въ клинику, гдѣ было установлено слѣдующее: весьма плохое состояніе общаго питанія, t^0 тѣла 38,3 пульсъ 88, довольно удовлетворительнаго качества, явленій коллапса не замѣчается; матка на высотѣ пупка, брюшные покровы мало податливы, нѣсколько учащенное сердцебіе плода слышно между пупкомъ и симфизію; наружный зѣвъ открытъ, кровотеченія нѣтъ, замѣтно лишь выдѣленіе окрашенной кровью и дурно пахнущей слизи. На слѣдующій день, послѣ того какъ больную ночью разъ вырвало и въ продолженіи дня послѣдовало 6 жидкихъ испражнений, изслѣдованіе дало совершенно другую картину: сильная вздутость живота, особенная чувствительность справа надъ пупартовой связкою, ясно выраженная тупость въ отлогихъ частяхъ. На ряду съ плотнымъ тѣломъ, которое прощупывается по средней линіи живота и которое необходимо принять за матку, съ правой стороны замѣчается,