

94. M. Moreau. Kyste multiloculaire de l'ovaire gauche et prolapsus uterin considerable. Extirpation de la tumeur, hysteropexie abdominale. Guérison. (Bulletin de la société Belge de gynec. 1892, № 10). Многополостная киста лѣваго яичника и выпаденіе матки. Удаленіе опухоли, брюшное прикрѣпленіе матки. Выздоровленіе.

Больная В., обратилась за совѣтомъ къ д-ру *Moreau*, жалуясь на различные болѣзненные симптомы: отсутствіе аппетита, сильную слабость обильныя мѣсячныя, затрудненіе при мочеиспусканіи и дефекаціи. Пациентка, малокровная, истощенная женщина, 40 л., начала менструировать съ 16 л., рожала три раза; послѣ послѣднихъ родовъ, два года тому назадъ, образовалось выпаденіе матки. Около года замѣтила постепенное увеличеніе живота. Изслѣдованіе показало: животъ увеличенъ въ объемѣ, прощупывается эластическая опухоль, представляющая, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, уплотненіе. Замѣтна флюктуация. Выпаденіе влагалища и матки; шейка матки гипертрофирована, есть изъязвленія. При внутреннемъ изслѣдованіи, по вправленіи матки, прощупывается флюктуирующая опухоль и въ заднемъ сводѣ шнурокъ, толщиною съ палець, идущій сверху внизъ и слѣва на право. *Moreau* поставилъ діагнозъ многополостной кисты съ перекручиваніемъ ножки и высказался за лапаротомію; въ данномъ случаѣ кромѣ діагносцируемой опухоли, было выпаденіе матки, то рѣшено произвести *ventrofixatio uteri*. Лапаротомія. По вскрытіи брюшины опухоль оказалась многополостною кистою лѣваго яичника: былъ сдѣланъ проколъ большой кисты, причемъ выдѣлилось 10 литровъ свѣтлой жидкости. Опухоль удалена по отдѣленіи многочисленныхъ сращеній съ брюшными стѣнками и тонкими кишками. Ножка кисты, перекрученная вокругъ оси, отдѣлена по предварительномъ наложеніи двойной петли изъ толстаго каучука. По окончаніи этой операціи, *Moreau* произвелъ пришиваніе два матки къ нижней части брюшной раны и матеріаломъ служилъ шелкъ № 2. Туалетъ брюшины и наложеніе на брюшную рану трехэтажнаго шва. Въ послѣопераціонномъ періодѣ t° не превышала 38° . Регулы на 3-й день послѣ операціи. Черезъ 9 дней снята повязка, сращеніе полное. Выздоровленіе. Авторъ видѣлъ пациентку черезъ два мѣсяца. Положеніе матки нормально. Общее состояніе здоровья удовлетворительно.

А. Лапина.

95. А. А. Муратовъ. О пришиваніи матки къ передней брюшной стѣнкѣ при полныхъ выпаденіяхъ матки. (Медицинское обозрѣніе, 1893 г. № 1).

Авторъ произвелъ операцію 7 разъ; операція показана въ старыхъ случаяхъ, гдѣ мѣстное лѣченіе не привело къ существенному улучшенію. Относительно вліянія операціи на послѣдующую беременность авторъ не имѣетъ личныхъ наблюденій, но ему довелось видѣть женщину, которой $1\frac{1}{2}$ года до этого произведена въ Петербургѣ *hysteropexia* ради полного выпаденія, которая вскорѣ послѣ операціи забеременѣла, беременность провела удовлетворительно и родила въ срокъ благополучно. Техники авторъ придерживается слѣдующей: оперируемой придается Тренделенбургское положеніе; разрѣзъ