

кое, ворсистое возвышеніе слизистой; на этомъ мѣстѣ произведено выскабливаніе и подъ микроскопомъ оказался начинающійся ракъ. Послѣ выскабливанія кровотеченія продолжались и даже усилились; черезъ мѣсяць произведено повторное изслѣдованіе, причѣмъ оказалось, что упомянутое возвышеніе сдѣлалось болѣе рельефнымъ, границы его распространились; повторное микроскопическое изслѣдованіе только подтвердило прежній діагнозъ; на основаніи этихъ данныхъ произведена полная экстирпація матки, больная выздоровѣла, чувствуетъ себя превосходно и нѣтъ никакихъ указаній на рецидивъ.

Ф. Краснопольскій.

99. **M. Jacobs. Sarcôme de l'ovaire.** (Bulletin de la société Belge de gynéc. 1892, № 9). Саркома яичника.

Jacobs демонстрировалъ въ засѣданіи «Société Belge de gynéc.» 27-го ноября 1892 г. макроскопическій препаратъ саркомы яичника, которую авторъ удалилъ у больной 18 л.

Пациентка начала менструировать на 14-мъ г.; съ 16 л. возраста замѣтила постепенное увеличеніе живота, уменьшеніе количества менструальной крови; появились боли въ нижней части живота.

На основаніи изслѣдованія *Jacobs* поставилъ діагнозъ «опухоль яичника».

Лапаротомія произведена 14-го ноября 1892 г.

Удалены: лѣвый яичникъ, ножка котораго была перекручена три раза, затѣмъ лѣвая труба, которая была также перекручена вокругъ своей оси.

Опухоль лѣваго яичника оказалась саркомою, что подтвердилось микроскопическимъ изслѣдованіемъ.

А. Лапина.

100. **Pio Masetti. Contributo allo studio dei rapporti fra l'ovariosalpingectomia e l'isterismo** (Annali di ostetricia e ginecologia, 1893, Gennaio 1). Къ вопросу о вліяніи операціи оваро-сальпингектоміи на теченіе истероэпилепсіи.

Показанія къ кастраціи, впервые выработанныя *Hegar*'омъ, далеко, какъ извѣстно, расширились съ тѣхъ поръ, какъ *Charcot* нашелъ способъ прижатіемъ яичниковъ останавливать или вызывать истероэпилептическіе припадки, такъ какъ возникла надежда способствовать удаленіемъ яичниковъ радикальному исцѣленію отъ истеріи. Два случая оваро-сальпингектомій, подробно описываемыхъ д-ромъ *Pio Masetti* (изъ Рима) и вкратцѣ передаваемыхъ нами, могутъ служить еще однимъ доказательствомъ полной неосновательности и тщеты этихъ надеждъ. 1) А. С., 43-хъ лѣтъ, безъ всякой психо-или невропатологической наслѣдственности, всегда страдала неправильными, обильными и болѣзненными регулами, смѣнявшимися періодами аменоррей. 22-хъ лѣтъ вышла замужъ; послѣ замужества потери крови и боли внизу живота усилились. На 34-мъ году жизни былъ выкидышъ 2-хъ мѣсяцевъ, черезъ годъ второй выкидышъ 5-ти мѣсяцевъ, и наконецъ 3-й, потребовавшій ручного извлеченія послѣда, послѣ котораго боли внизу живота и кровотеченія усилились на столько, что больная