

сти, который былъ удачно зашитъ только со стороны кожи. Съ такимъ разрывомъ она рожала дважды. Послѣ каждаго родовъ авторъ собирался дѣлать ей операцію и все откладывалъ. Наконецъ, неподозрѣвая, что больная беременна, авторъ сдѣлалъ ей шиваніе промежности по *Hegar*'у. При слѣдующихъ родахъ (поворотъ и извлеченіе), щадя промежность, авторъ сдѣлалъ надрѣзъ со стороны влагалища по направленію къ лѣвому сѣдалищному бугру. Промежность осталась цѣла.

Н. Какушкинъ.

15. *Geyl.*—*Zur Aetiologie der Vaginalcysten.* (Centralbl. f. Gynäk., 1894 г., № 44). **Къ этиологіи влагалищныхъ кистъ.**

Въ одномъ случаѣ множественныхъ кистъ влагалищной стѣнки удаленная киста была обследована микроскопически. Она оказалась развившеюся на почвѣ влагалищной железы и отличалась тѣмъ, что и въ своей стѣнкѣ содержала скопленія железистой ткани. Авторъ задается вопросомъ, слѣдуетъ ли на влагалищныя кисты смотрѣть, какъ на доброкачественныя новообразованія, или онѣ, подобно яичниковымъ, склонны къ злокачественнымъ измѣненіямъ.

Н. Какушкинъ.

16. *O. Semb.* **Primäres Nierensarcom bei einem todtgeborenen Kinde.** (Centralbl. f. Gynäk., 1894 г., № 44). **Первичная саркома почки у мертворожденнаго.**

Развитіе такихъ опухолей въ утробной жизни рѣдко наблюдается. Въ данномъ случаѣ рѣчь идетъ о мертворожденномъ мальчикѣ, прекрасно сложенномъ и упитанномъ. Еще за 8 дней до родовъ были признаки его жизни. Мать—первородящая, 20 л. Опухоль лѣвой почки выросла въ брюшную полость, смѣстивъ органы. Она съ голову ребенка, 250 грм. вѣсомъ, яйцевидная. По строенію кругло-клеточковая саркома. Почечная ткань сохранилась въ скудномъ количествѣ; мочеточникъ проходимъ. Правая почка здорова.

Н. Какушкинъ.

17. *C. v. Bokitansky.*—*Zu Prof. O. Küstner's „Principien der Prolapsbehandlung“.* (Centr. f. Gynaec., № 25, 1894 г.). **По поводу „основъ лѣченія выпаденій“ Кюстнера.**

По поводу заявленія *Küstner*'а о томъ, что при гипертрофіи шейки вслѣдствіе выпаденія, являются излишними операціи, уменьшающія матку, *R.* указываетъ, что подобное же мнѣніе было выказано имъ и послѣдовательно проводилось уже въ теченіи 15 лѣтъ. Такъ онъ наблюдалъ, что во многихъ случаяхъ выпа-