

ныхъ движеніяхъ, чтобы влеченіе за верхнія конечности и лопатки замѣняло бы дѣйствіе теперь не функционирующей ключицы.

*В. Строгановъ.*

**21. R. Olshausen.**—Объ экстирпаціи влагалища. (Centr. f. Gynaecologie, № 1, 1895 г.).

О. описываетъ способъ, примененный имъ для удаленія рака влагалища, имѣющей, по его мнѣнію, кромѣ другихъ еще и то преимущество, что уменьшаетъ шансы зараженія ракомъ во время операціи. Онъ производитъ операцію слѣдующимъ образомъ: разсѣкаетъ промежность въ поперечномъ направленіи и тупымъ путемъ отдѣляетъ заднюю стѣнку влагалища отъ прямой кишки до Дугласова пространства. При трудномъ отдѣленіи ассистентъ контролируетъ со стороны прямой кишки. Если нужно экстирпировать и матку, то вскрываютъ Дугласъ изъ образованной полости, опрокидываютъ матку назадъ и перевязываютъ широкія связки, начиная съ трубъ. Затѣмъ удаляютъ пораженное ракомъ мѣсто и заканчиваютъ обычнымъ образомъ отдѣленіе шейки матки. Такимъ образомъ онъ оперировалъ 3 раза, въ одномъ случаѣ была удалена и матка. Въ 2-хъ послѣдовалъ рецидивъ, 3-я операція была произведена всего 2 мѣсяца тому назадъ. Вообще ракъ влагалища заслуженно имѣетъ самый тяжелый прогнозъ; изъ 16, оперированныхъ имъ, только у одной рецидивъ не наблюдался по истеченіи 2-хъ лѣтъ.

*В. Строгановъ.*

**22. Graefe.**—Два случая фиброміомъ яичника. (Centr. f. Gynaec., № 1, 1895 г.).

Кромѣ относительной рѣдкости подобныхъ наблюденій, одинъ случай представлялъ еще своеобразную клиническую картину: женщина 54 лѣтъ, нерожавшая, хотя находилась въ замужествѣ, послѣднія 8 лѣтъ, до послѣдняго времени, правильно менструировала съ трехъ недѣльными промежутками. Въ теченіи послѣднихъ четырехъ мѣсяцевъ, имѣетъ все увеличивающееся кровянисто-серозное истеченіе изъ половыхъ органовъ, которое къ сроку мѣсячныхъ смѣняется обильнымъ кровотеченіемъ. Другихъ жалобъ нѣтъ. Чревосѣченіемъ удалена плотная опухоль яичника, состоящая лишь изъ соединительной ткани, остатковъ яичниковой ткани не могли констатировать. Другой яичникъ былъ атрофированъ. *G.* задаетъ вопросъ, какъ объяснить при этомъ существованіе менструацій и даже маточныхъ кровотеченій. (Замѣчу, что послѣ удаленія опухоли и то, и другое прекратилось). Онъ пола-