

119. Н. W. Freund.—Eine Mastitis-Epidemie.—(Zeitschr. f. Geb. Bd. XXXVI Hft. 3).—Эпидемія грудницы.

Авторъ наблюдалъ въ завѣдываемой Страсбургской повивальной школѣ весьма поучительную эпидемію грудницы. Въ продолженіи 17 дней заболѣли грудницею всѣ шесть находившихся въ залѣ родильницъ, при чемъ о простомъ перенесеніи заразы отъ одной родильницы къ другой при данныхъ условіяхъ не могло быть и рѣчи. Только бактериологическое изслѣдованіе гноя, а именно находеніе въ немъ наряду съ *staphylococcus pyogenes albus* также и *micrococcus tetragenus*, который попадаетъ во рту при афтозномъ заболѣваніи, указало на первоначальный источникъ эпидеміи. Оказалось, что за 10 часовъ до заболѣванія второй родильницы она приложила къ груди чужого ребенка, больного афтою. Особаго вниманія достоинъ тотъ фактъ, что у 4 изъ этихъ матерей дѣти заболѣли афтой. С. Ю. Хазанъ.

120. R. Frommel.—Beitrag zur Frage der Wachstumsrichtung der Placenta.—(Zeitschr. f. Geb. Bd. XXXVI Hft. 3).—Къ вопросу о направленіи роста плаценты.

Не оспаривая по существу положенія *v. Herffa* (см. этотъ журн. за 1897 г. стр. 469), будто увеличеніе площади *serotinae* зависитъ главнымъ образомъ отъ направленія роста ворсинокъ, и лишь намекнувъ на то, что для рѣшенія этого спорнаго вопроса необходимы препараты болѣе ранняго срока беременности, авторъ рисуетъ положеніе вещей у летучей мыши, у которой ростъ плаценты, происходитъ такимъ образомъ, что она раздвигается по периферіи вмѣстѣ съ податливымъ основаніемъ, на которомъ она покоится. С. Ю. Хазанъ.

121. Olshausen.—Carcinom des Uterus und Schwangerschaft.—(Zeitschr. f. Geb. Bd. XXXVII Hft. 1).—Ракъ матки и беременность.

Статистика *Cohnstein*'а и *Theilhaber*'а несомнѣнно указываютъ на частое осложненіе беременности ракомъ. Вслѣдствіе неправильныхъ кровотеченій существованіе беременности при ракѣ часто просматривается, хотя увеличеніе и мягкая консистенція тѣла матки дѣлаютъ діагнозъ очень легкимъ. Такъ какъ беременность способствуетъ болѣе скорому росту и распространенію новообразованія, прогнозъ въ общемъ неблагоприятный. Лѣченіе можетъ быть весьма разнообразнымъ въ зависимости отъ срока беременности, распространенія новообразованія и т. п. Пока