

дѣленіе происходитъ, по крайней мѣрѣ въ большинствѣ случаевъ, лишь благодаря послѣродовыи болямъ. До наступленія же этихъ послѣднихъ плаценты остается обыкновенно въ связи съ маточной стѣнкою и послѣ удаленія плода. При наступленіи же послѣродовыхъ болей прежде всего отдѣляется нижний край плаценты, вотъ почему отдѣленная плацента въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ вступаетъ въ шейку нижнимъ краемъ, т. е. именно такъ, какъ это рисуетъ *Duncan*. Но вслѣдствіе того, что та часть оболочекъ, которая находится въ нижнемъ отрѣзкѣ матки, обыкновенно труднѣе отдѣляется чѣмъ верхняя, дальнѣйшее движение нижняго края плаценты очень часто на нѣкоторое время останавливается, между тѣмъ какъ мимо него маточныя сокращенія прогоняютъ остальную часть плаценты, которая такимъ образомъ оказывается во влагалищѣ вывороченной, т. е. такъ, какъ это описываетъ *Schultze*. Впрочемъ въ исключительныхъ случаяхъ, какъ напр. при частичномъ отдѣленіи плаценты уже во время акта родовъ, при прикрѣплѣніи плаценты къ основанію матки и т. п. механизмъ *Schultze* можетъ разыграться уже въ самой маткѣ.

*C. Ю. Хазанъ.*

123. *Gebhard*.—Ueber das *Bacterium coli commune* und seine Bedeutung in der Geburtshilfe.—(Zeitschr. f. Geb. Bd. XXXVII Hft).—О *bacterium coli commune* и его значеніи въ акушерствѣ.

На основаніи своихъ бактериологическихъ изслѣдований авторъ приходитъ къ тому заключенію, что при *tympania uteri bacterium coli commune* играетъ, можетъ быть, не маловажную роль, но что въ случаяхъ общаго путриднаго зараженія значеніе анаэробовъ особенно велико.

*C. Ю. Хазанъ.*

124. v. *Franqué*.—Ueber histologische Veränderungen in der Placenta und ihre Beziehungen zum Tode der Frucht.—(Zeitschr. f. Geb. Bd. XXXVII Hft. 2).—О гистологическихъ измѣненіяхъ въ плацентѣ и обѣ ихъ отношеніи къ смерти плода.

Несомнѣнно существуютъ заболѣванія плаценты, которыя ведутъ къ разстройству кровообращенія и смерти плода, наступающей при этомъ или до начала родовъ, или во время ихъ, или, наконецъ, скоро послѣ родовъ. Но если смерть плода послѣдовала еще до родовъ, то видѣть въ заболѣваніи плаценты несомнѣнную причину смерти можно лишь тогда, когда клиническимъ наблюдениемъ и данными секціи установлено, что смерть