

эта наступила лишь незадолго до родовъ. Когда же плодъ умеръ уже долго до родовъ, то уже нѣтъ возможности опредѣлить, что здѣсь является причиною и что слѣдствіемъ, ибо въ плацентахъ, которыя долго остаются въ маткѣ послѣ смерти плода, независимо отъ того, какой причиною была вызвана смерть, всегда замѣчаются одни и тѣ-же измѣненія, а именно: разращеніе *intimae* и *adventitiae*, развитіе соединительной ткани въ *media*, частичная или даже полная облитерація сосудовъ и порою мелкоклѣтчатая инфильтрація ворсинокъ, *chorion'a* и *amnion'a*. Сифилитическая инфекция не только является однимъ изъ моментовъ вызывающихъ преждевременное отдѣленіе послѣда, поможетъ обнаружиться также измѣненіями, характерными съ одной стороны для *choriitis* и *amniotitis*, а съ другой стороны для *endovasculitis* стволонъ ворсинокъ. Воспалительныя измѣненія на *placenta materna* могутъ перейти и на *placenta foetalis*. Наконецъ случаи, въ которыхъ дѣти рождаются въ плохомъ состояніи питанія и въ которыхъ помимо измѣненій въ плацентѣ нѣтъ другихъ причинъ для объясненія этого явленія, наглядно доказываютъ справедливость давно уже высказаннаго Hofmeier'омъ мнѣнія, что развитіе плода находится въ зависимости отъ состоянія плаценты.

С. Ю. Хазанъ.

125. **Brutzer.**—**Ein Beitrag zur Wochenbettsdiätetik.**—(Zeitschr. f. Geb. Bd. XXXVII Hft. 3).—**Къ діететикѣ родильнаго періода.**

Принципъ, что родильницу не слѣдуетъ разсматривать какъ больную, сталъ теперь всеобщимъ и потому въ послѣднее время существенно измѣнился также взглядъ на діететику родильнаго періода. Но въ то время какъ относительно всѣхъ прочихъ пунктовъ господствуетъ согласіе между авторами, вопросъ о необходимости спокойнаго лежанія родильницы и продолжительности срока этого лежанія до сихъ поръ остается открытымъ. Это обстоятельство и побудило автора предпринять цѣлую серію наблюдений, которыя привели его къ тому заключенію, что раннее вставаніе въ послѣродовомъ періодѣ не только не оказываетъ дурного вліянія на температуру, пульсъ, обратную инволюцію половыхъ органовъ и т. п., но даже оказывается во многихъ отношеніяхъ прямо благотворнымъ. Хотя вставанье на 2—3 день не причиняло родильницамъ вреда, авторъ совѣтуетъ тѣмъ же не менѣе подымать ихъ на ноги не раньше пятаго дня и то лишь обстоятельно взвѣсивъ каждый случай.

С. Ю. Хазанъ.