

126. Schottlaender.—Casuistischer Beitrag zur Lehre von der Osteomalacie.—(Zeitschr. f. Bd. XXXVII Hft. 3).—**Къ казуистикѣ и къ ученію объ остеомалакіи.**

Въ этой работѣ мы находимъ оригинальную гипотезу, которая лучше всѣхъ прочихъ до сихъ поръ высказанныхъ теорій объясняетъ намъ характеръ взаимныхъ отношеній между яичниками и остеомалакіею. Авторъ вмѣстѣ съ *Kehrer*'омъ именно того мнѣнія, что причиною какъ остеомалакіи такъ и послѣдовательныхъ измѣненій въ яичникахъ является измѣнившійся подъ вліяніемъ неправильной жизнедѣятельности яичниковъ составъ крови.

С. Ю. Хазанъ.

127. Gebhard.—Ueber das sogen. Syncytioma malignum.—(Zeitschr. f. Gsb. Bd. XXXVII Hft. 3).—**О такъ наз. syncytioma malignum.**

На основаніи весьма тщательнаго изслѣдованія трехъ новыхъ препаратовъ авторъ высказывается относительно гистогенеза разбираемыхъ опухолей въ томъ смыслѣ, что исходною точкою новообразованія является не только syncytium, т. е. наружный слой эпителиа хоріальныхъ ворсинокъ, но и такъ наз. слой *Langhans*'а. Въ заключеніе своей работы авторъ указываетъ на основаніи одного наблюденія на одно въ діагностическомъ отношеніи весьма важное обстоятельство, а именно на возможность синциціального превращенія эпителиальныхъ элементовъ рака, ничего общаго съ беременностью не имѣющаго.

С. Ю. Хазанъ.

128. Olshausen.—Ueber den Kaiserschnitt und seine Indicationen bei Beckenverengung.—(Zeitschr. f. Geb. Bd. XXXVII Hft. 3).—**О кесарскомъ сѣченіи и о показаніяхъ къ нему при узкомъ тазѣ.**

Авторъ горячо ратуетъ за широкое примѣненіе кесарскаго сѣченія и при относительномъ показаніи.

С. Ю. Хазанъ.

129. Rostowzew.—Ueber die Uebertragung von Milzbrandbazillen beim Menschen von der Mutter auf die Frucht bei Pustula maligna.—(Zeitschr. f. Geb. Bd. XXXVII Hft. 3).—**О переходѣ у человѣка палочекъ сибирской язвы отъ матери къ плоду.**

Въ трехъ случаяхъ сибирской язвы, наблюденныхъ въ Обуховской больницѣ у беременныхъ, автору удалось найти палочки *pustulae malignae* въ плацентѣ и въ органахъ плода, и такимъ

образомъ впервые доказать возможность перехода у человѣка виновниковъ разбираемой болѣзни отъ матери къ плоду. При этомъ достойно вниманія то, что и количество встрѣчаемыхъ у плода палочекъ меньше и количество ихъ другое, чѣмъ у матери, обстоятельство, указывающее на то, что микробы при прохожденіи своемъ черезъ плаценту отчасти встрѣчаютъ плохія условія для своего размноженія, отчасти совершенно погибаютъ. Какъ на одну изъ возможныхъ причинъ этого явленія авторъ указываетъ на извѣстное свойство крови пріобрѣтать во время болѣзни микробоубивающее дѣйствіе. Авторъ именно склоненъ думать, что когда микробы достигаютъ плаценты, кровь плода уже настолько успѣла измѣниться, что попадающіе туда микробы встрѣчаютъ препятствія для своего развитія. Сопоставляя въ заключеніе упомянутые три случая сибирской язвы, окончившихся летально, съ тремя случаями той-же болѣзни, наблюдавшимися одновременно у небеременныхъ и окончившимися выздоровленіемъ, авторъ указываетъ на несомнѣнно плохой прогнозъ этого страданія у беременных

С. Ю. Хазанъ.

б) А н г л и й с к о й.

130. 1. Prof. Murray (Edinburgh).—**Forceps with adjustable axis-Traction.**—(Edinburgh med. Journal, Septemb., 1896, p. 229).—**Осевые щипцы съ передвижнымъ аппаратомъ для влеченія.**

2. Dr. Owen Mackness (Edinburgh).—**Some Modification of Midwifery Forceps.**—(Ibidem p. 237).—**Новыя измѣненія акушерскихъ щипцовъ.**

3. Dr. Schultz.—**Version or high Forceps.**—(Americ J. of Obst etc, 1896, X, p. 586).—**Поворотъ или высокіе щипцы.**

I. Щипцы *Murray*'я—видоизмѣненіе особыхъ щипцовъ *Tarnier—Simpson*'а Въ нихъ прутики для влеченія, начинаясь у самыхъ оконъ щипцевыхъ ложекъ, идутъ вдоль рукоятки, потомъ направляются подъ прямымъ угломъ книзу на $4\frac{1}{2}$ дюйма; блокъ посредствомъ особаго винта можетъ прикрѣпляться къ любой точкѣ этой части прутиковъ, на которой черезъ каждыя $\frac{1}{2}$ " отмѣчены цифры отъ 0 до 7. Къ блоку прикрѣпляются ручки на шарнирѣ, допускающемъ ихъ передвиженіе въ параллельномъ прутикамъ направленіи съ цѣлю перемѣщенія ручекъ при тракціяхъ, соотвѣтственно положенію прутиковъ влеченія. На мѣстѣ соединенія послѣднихъ съ блокомъ находится стрѣлка, а на блокѣ—дугообразная линія точекъ съ отмѣткою на ея серединѣ „Nor-